

<i>Standardy ošetrovatelské péče - anesteziologické</i>			
č. 03	PŘÍPRAVA A ASISTENCE U CELKOVÉ ANESTEZIE U PERIFERNÍ NERVOVÉ BLOKÁDY		
Autor: Martina Reitzová		Platnost od: 20. 9. 2005	Schválila: Rada kvality
Určeno pro: Všeobecné sestry			
Poslední revize: č. 4 6/2014		Důvod revize: Periodická kontrola	
Poslední revize: č. 5 4/2017		Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: Martina Reitzová
Poslední revize: č. 6 6/2019		Důvod revize: Periodická kontrola	Přezkoumal: Iveta Popková
Poslední revize: č. 7 10/2021		Důvod revize: Periodická kontrola	Kontrolu provedl: Z. Gabzdyllová
Poslední revize: č. 8		Důvod revize:	Přezkoumal: Iveta Popková
Termín další revize: 10/2023			
Identifikace výtisku: Výtisk jediný – originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)			

Definice:

Periferní nervová blokáda se aplikuje za účelem anestezie, nebo pooperační analgezie. Nejčastěji se používá kořenový blok axilární, suprascalenický (infraclaviculární) a Foot blok.

Pomůcky:

- sterilní stolek s jednorázovým setem k regionální anestezii
- sterilní rukavice
- jehla pro periferní blokádu
- stimulátor periferních nervů, k tomu nutná 1 EKG elektroda
- anestetika (Marcain 0,5 %, Mesocain 1 %, Supracain 2 %) - určí anesteziologický lékař
- v pohotovosti jsou zdravotnické prostředky a léčiva ke KPR včetně defibrilátoru

Proces:

Před zahájením anestézie probíhá:

- cílené vyšetření anesteziologem
- zahájení Perioperačního bezpečnostního procesu
- kontrola Informovaných souhlasů
- kontrola Verifikačního protokolu

Zahájení a asistence u periferní nervové blokády během operačního výkonu:

- **změř a zapiš** základní vitální funkce
- **zajisti** periferní žílu, fixuj kanylu a napoj infuzní roztok dle ordinace lékaře zahřátý na fyziologickou teplotu
- **asistuj** lékaři při aplikaci periferní blokády
- **sleduj:**
 - nástup účinku anestezie
 - stav pacienta v průběhu výkonu
 - sleduj základní vitální funkce
- **nahlas** ihned lékaři jakékoli změny stavu pacienta
- **aplikuj** ordinovaná léčiva, vše zaznamenávej řádně do dokumentace
- **používej** polohovací pomůcky k zajištění bezpečnosti pacienta

Po celou dobu anestezie dbej na:

- prevenci dekubitů
- prevenci popálenin
- prevenci podchlazení
- prevenci nozokomiálních nákaz
- na správnou evidenci návykových látek
- řádně vedenou dokumentaci dle platných standardů
- evidenci zdravotnických prostředků třídy IIb a III.

Možné komplikace:

- krvácení v místě vpichu
- toxická či alergická reakce na podávané anestetikum
- mechanické porušení nervu
- infekce v místě vpichu "

Úklid:

- **proved'** likvidaci jednorázového materiálu
- **dezinfikuj** všechny použité přístroje včetně zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci
- **ulož** vše na určené místo
- **doplň** všechny použité léčiva a zdravotnické prostředky použité při anestezii