

Standardy ošetřovatelské péče - anesteziologické								
č. 02 PŘÍPRAVA A ASISTENCE U CELKOVÉ ANESTEZIE U OPERACE PÁTEŘE								
Autor:			Platnost od: S		Schválil	Schválila:		
	Monika Tom	oszková		1. 4. 2004		Rada kvality		
Určeno pro:								
Všeobecná sestra, sanitářka								
			od revize: Periodická kontrola					
6/2014								
Poslední revize: č. 5		Důvod revize:		Kontrolu	provedl:	Přezkoumal:		
4/2017		Periodická kontrola		Věra Zádra	apová	Iveta Popková		
Poslední revize: č. 6		Důvod revize:		Kontrolu	provedl:	Přezkoumal:		
6/2019		Periodická kontrola		Věra Zádra	apová	Iveta Popková		
Poslední revize: č. 7		Důvod revize:		Kontrolu	provedl:	Přezkoumal:		
10/2021		Periodická kontrola		Martina R	eitzová	Iveta Popková		
Poslední revize: č. 8 Dů		Důvod re	Důvod revize:					
Termín	Termín další revize:							
10/2023								
Identifikace výtisku: Výtisk jediný – orig						·		
(výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)								

Definice:

Celková anestezie je řízené, přechodně navozené bezvědomí. Zajišťuje pacientovi nejen spánek, ale i dostatečnou analgezii a pokud možno i vegetativní stabilitu. Operatérovi poskytuje dobré operační podmínky (svalová relaxace).

Pomůcky:

- > k měření vitálních funkcí
- > k zajištění periferního žilního katétru
- pomůcky k zajištění centrálního žilního katétru /dle lékaře/
- ➤ k měření CVP /pokud je zaveden CŽK /
- k zavedení nasogastrické sondy
- k zajištění arterie
- k zavedení PMK
- k aplikaci léčiv, transfuzních přípravků /přetlakové manžety, inj. dávkovače/
- k ohřevu pacienta /tepelný generátor, termopokrývka/
- k endotracheální intubaci
- > anesteziologický přístroj



V pohotovosti jsou všechny zdravotnické prostředky a léčiva určené ke kardiopulmonální resuscitaci (KPR) včetně defibrilátoru.

Poloha pacienta:

- 1. u operací páteře zadním přístupem na břiše
- 2. u operací krční páteře na zádech

Proces: "

Před zahájením anestézie probíhá:

- > cílené vyšetření anesteziologem
- > zahájení Perioperačního bezpečnostního procesu
- kontrola Informovaných souhlasů
- > kontrola Verifikačního protokolu

Zahájení a asistence u celkové anestézie během operačního výkonu:

	změř	a zapiš do dokumentace základní vitální funkce			
	zajisti	periferní žílu, fixuj kanylu a napoj infuzní roztok dle ordinace lékaře			
	asistuj	lékaři při kanylaci centrální žíly			
	aplikuj	léčiva dle ordinace lékaře			
	asistuj	lékaři u endotracheální intubace			
	zaveď	NGS, zkontroluj, zda je dobře zavedena			
	připoj	komůrku pro měření CŽK k monitoru a katétru / pokud je zaveden CŽK/			
	asistuj	lékaři při punkci a kanylaci artérie			
	připoj	komůrku k měření invazivního TK k monitoru a kanyle			
	podlož	při polohování predilekční místa			
uprav a sleduj po celou dobu operace polohu pacienta, aby nedošlo k poškození					
		kůže			
	podlož	při polohování predilekční místa			
	zaveď	teplotní čidlo a měř TT pacienta			
	zajisti	dostatečný ohřev pacienta (termopřikrývka, přístroj k ohřevu pacienta),			
		podávej ohřáté infuzní i transfuzní roztoky			
	asistuj	lékaři po celou dobu anestézie			
	aplikuj	ordinovaná léčiva, transfuzní přípravky vše zaznamenávej řádně			
		do dokumentace			
	sleduj	celkový stav pacienta (periferní prokrvení, polohu pacienta)			
	monitoruj	vitální funkce pacienta v průběhu anestezie, jakékoliv změny hlas ihned lékaři			
	sleduj	diurézu, krevní ztráty			
	prováděj	asepticky odsávání z dýchacích cest při potřebě udržet dokonalou			
		průchodnost DC			
	připrav a asistuj při sestavení a napojení rekuperačního přístroje HEMONETICS				
	prováděj	dle ordinace bezpečný odběr biologického materiálu (krev, moč)			



Po celou dobu anestezie dbej na:

- > prevenci dekubitů
- > prevenci popálení, podchlazení
- > prevenci nemocničních nákaz
- > na správnou evidenci návykových látek
- řádně vedenou dokumentaci dle platných standardů, včetně evidence zdravotnických přístrojů třídy II. b a III. používané při anestézii

Možné komplikace:

- > obtížná intubace
- > laryngospasmus při extubaci
- ➤ hypertenze, hypotenze
- > pokles TT pod 36°C
- > poruchy srdečního rytmu

<u>Úklid:</u>

proved' likvidaci jednorázového materiálu

dezinfikuj všechny použité přístroje včetně zdravotnických prostředků

určených ke sterilizaci

> ulož vše na určené místo

doplň všechny použité léčiva a zdravotnické prostředky použité při anestézii