

+ Exercice (01): (Étude globale d'une courbe paramétrée):

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad g(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$$

1°/ Montrer que la courbe est définie et de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

Définition sur  $\mathbb{R}$

Les fonctions  $(t, \sin t, \cos t)$  sont définies sur  $\mathbb{R}$  donc les fonctions  $x(t) = t - \sin t$ ;  $y(t) = 1 - \cos t$  sont définies sur  $\mathbb{R}$ .  
Ainsi, la courbe  $g$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .

classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$

Les fonctions  $(t, \sin t, \cos t)$  sont de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  donc les fonctions  $x(t)$  et  $y(t)$  qui sont des combinaisons de fonctions  $C^\infty$  sont de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

En effet:  $x'(t) = 1 - \cos t$ ,  $y'(t) = \sin t$   
ces dérivées existent et sont continues sur  $\mathbb{R}$ .

2°/ Calculer  $g'(t)$  et étudier la régularité de la courbe.

$$x'(t) = 1 - \cos t, \quad y'(t) = \sin t$$

$$\text{Donc: } g'(t) = (1 - \cos t, \sin t)$$

• la courbe est régulière si  $g'(t) \neq (0, 0)$

$$\begin{cases} 1 - \cos t = 0 \\ \sin t = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos t = 1 \\ \sin t = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 2k\pi, & k \in \mathbb{Z} \\ t = k\pi, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\text{ona: } g'(t) = (0, 0) \Leftrightarrow t = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

donc: la courbe n'est régulière en  $t = 2k\pi$

la courbe est régulière sur  $\mathbb{R} / 2k\pi$

3°/ Déterminer les points où la tangente est horizontale  
on résout:  $\sin t = 0$ , on sait que:  $t = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

Maintenant on vérifie que  $x'(t) \neq 0$ ,  $x'(t) = 1 - \cos(k\pi)$

• Si  $k$  pair:  $x'(t) = 0$ , pas horizontal

• Si  $k$  impair:  $x'(t) = 2 \neq 0$

$$\cos k\pi = (-1)^k$$



• Tangente horizontale pour ,  $t = (2K + 1)\pi$  ,  $K \in \mathbb{Z}$   
 Les points correspondants sont  $g((2K+1)\pi) = ((2K+1)\pi, 2)$

4° Étudier les Variations de  $x(t)$  et  $y(t)$  sur  $[0, 2\pi]$

Variation de  $x(t)$

ona :  $x'(t) = 1 - \cos t$

$-1 < \cos t < 1$

donc :  $1 - \cos t > 0$

$x'(t) > 0$  sur  $[0, 2\pi]$

Donc :  $x(t)$  est croissante sur  $[0, 2\pi]$

• calcul des Valeurs aux bornes

$x(0) = 0 - \sin 0 = 0$

$x(2\pi) = 2\pi - \sin(2\pi) = 2\pi$

t	0	$2\pi$
x(t)	0	$2\pi$

$x(t)$  croît de 0 à  $2\pi$

Variation de  $y(t)$

ona  $y'(t) = \sin t$

$\sin t > 0$  sur  $]0, \pi[$

$\sin t < 0$  sur  $] \pi, 2\pi [$

Donc :

$y(t)$  est croissant sur  $[0, \pi]$

$y(t)$  est décroissante sur  $[\pi, 2\pi]$

$y(0) = 1 - \cos(0) = 0$

$y(\pi) = 1 - \cos(\pi) = 2$

$y(2\pi) = 1 - \cos(2\pi) = 0$

t	0	$\pi$	$2\pi$
y(t)	0	2	0

$y(t)$  croît de 0 à 2 puis décroît de 2 à 0

5° Décrire l'allure de la courbe et proposer un tracé qualitatif points importants :

$g(0) = (0 - \sin 0, 1 - \cos 0) = (0, 0) = A$

$g(\pi) = (\pi - \sin \pi, 1 - \cos \pi) = (\pi, 2) = B$


$g(2\pi) = (2\pi - \sin 2\pi, 1 - \cos 2\pi) = (2\pi, 0) = C$

• La courbe passe par les points A, B, C .

• La tangente est horizontale en  $(\pi, 2)$  .

• la courbe a la forme d'un arche .





« la courbe a la forme d'un arche »

### \* Exercice 02 B

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad h(t) = (t^2, t^4)$$

1°/ Déterminer le support géométrique de la courbe

Possant:  $x = t^2$  et  $y = t^4$ , Alors

$$y = t^4 = (t^2)^2 = (x)^2$$

Donc:  $h(\mathbb{R}) \subset \{(x, y) : x \geq 0, y = x^2\}$

les point est atteint par g

Ainsi  $T = h(\mathbb{R}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y = x^2\}$

Le support géométrique de la courbe est la parabole:

2°/ Étudier la régularité et localiser les points singuliers.

$$g'(t) = (2t, 4t^3) = 2t(1, 2t^2)$$

Donc  $g'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 0$ : non régulière en 0, régulière ailleurs

elle est régulière sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . donc point singuliers:  $t = 0$

3°/ Étudier l'existence d'un tangente en  $t = 0$

$$\frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{4t^3}{2t} = 2t^2$$

au point  $t = 0 \Rightarrow 2t^2 = 0$  et  $\lim_{t \rightarrow 0} 2t^2 = 0$

la limite existe donc la tangente existe au point  $t = 0$

leur équations  $y = 0$  < 03 >



4°/ Décrire le comportement de la courbe au voisinage de l'origine.

- Au voisinage de l'origine, la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses et elle admet la tangente horizontale  $y=0$   
elle approche l'origine en s'aplatissant et reste du même côté de la tangente

5°/ Identifier le type de singularité.

- Comme + la tangente existe  
+ la courbe reste du même côté  
+ pas d'auto-intersection

On a : Point de rebroussement de première espèce.

+ Exercice (03) :

$$\gamma(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t), t \in \mathbb{R}$$

1°/ Montrer que la courbe est régulière sur  $\mathbb{R}$ .

$$\gamma'(t) = \left( \frac{d}{dt} (e^t \cos t), \frac{d}{dt} (e^t \sin t) \right)$$

$$\gamma'(t) = (e^t \cos t - e^t \sin t, e^t \sin t + e^t \cos t)$$

$$\gamma'(t) = (e^t (\cos t - \sin t), e^t (\sin t + \cos t))$$

• Calculons la norme :

$$\begin{aligned} \|\gamma'(t)\| &= \sqrt{e^{2t} (\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2} \\ &= e^t \sqrt{(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2} \end{aligned}$$

$$\text{Or : } (\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2 = 2$$

$$\text{donc : } \|\gamma'(t)\| = \sqrt{2} e^t > 0, \gamma'(t) \neq (0, 0)$$

Ainsi : la courbe est régulière sur  $\mathbb{R}$



2°/ Déterminer le Support géométrique.

On pose :  $x = e^t \cos t$  et  $y = e^t \sin t$

Calculons de la distance à l'origine (rayon polaire  $r$ )

Calculons  $x^2 + y^2$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (e^t \cos t)^2 + (e^t \sin t)^2 \\ &= e^{2t} \cos^2 t + e^{2t} \sin^2 t = e^{2t} (\underbrace{\cos^2 t + \sin^2 t}_{1}) \end{aligned}$$

donc :  $x^2 + y^2 = e^{2t} \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = e^t$

on calculon  $\frac{y}{x}$  (pour  $x \neq 0$ )

$$\frac{y}{x} = \frac{e^t \sin t}{e^t \cos t} = \tan t ; \text{ D'où l'angle } \theta : \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = t$$

En substituant  $t = \theta$  dans l'équation du rayon, nous obtenons la relation polaire  $r = e^\theta$

le Support géométrique est la spirale logarithmique d'équation polaire  $r = e^\theta$

3°/ Montrer que la courbe est une spirale plane.

Comme on a  $r = e^\theta$

cette relation, définit classiquement une spirale logarithmique dans le plan.

Ainsi : la courbe est celle d'une spirale logarithmique

4°/ Trouver une nouvelle paramétrisation de la courbe en fonction de l'angle polaire

L'angle polaire est  $\theta$ , comme  $\theta = t$ , la nouvelle paramétrisation  $\gamma(\theta)$  est simplement

$$\gamma(\theta) = (e^\theta \cos \theta, e^\theta \sin \theta), \theta \in \mathbb{R}$$



5° Comparer les Vitesse de parcours selon les deux paramétrisations.

La Vitesse est la norme du Vecteur dérivé

$$\text{Pour } g(t), V_g = \|g'(t)\| = \sqrt{2e^{2t}} = e^t \sqrt{2}$$

$$\text{Pour } \gamma(t), V_\gamma = \|\gamma'(t)\| = \sqrt{2e^{2\theta}} = e^\theta \sqrt{2}$$

Les Vitesses sont identiques car  $t$  et  $\theta$  parcourent le même intervalle  $(\mathbb{R})$  et sont liés par  $\theta = t$

+ Exercice (04) :

$$g_1(t) = (t, t^2), \quad g_2(t) = (t^2, t) \quad \text{Sur : } [0, 1]$$

1° Vérifier que les deux arcs sont réguliers Sur  $[0, 1]$   
on calcule les dérivées

$$g_1' = (1, 2t)$$

Sa norme :

$$\|g_1'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}$$

$$\sqrt{1 + 4t^2} > 0, \quad \forall t \in [0, 1]$$

Donc  $g_1$  est régulier

Donc :  $g_1$  et  $g_2$  sont réguliers sur  $[0, 1]$

2° Calculer les longueurs  $L_1$  et  $L_2$ .

$$\text{on a : } L = \int_0^1 \|g'(t)\| dt$$

Longueur  $L_1$

$$L_1 = \int_0^1 \|g_1'(t)\| dt = \int_0^1 \sqrt{1 + 4t^2} dt$$



En Utilisant la formule

$$\int \sqrt{1+U^2} dU = \frac{1}{2} U \sqrt{1+U^2} + \frac{1}{2} \ln(U + \sqrt{1+U^2})$$

avec :  $U = 2t$  ,  $dU = 2 dt$

$$L_1 = \left[ \frac{1}{2} t \sqrt{1+4t^2} + \frac{1}{4} \ln(2t + \sqrt{1+4t^2}) \right]_0^1$$

$$L_1 = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(2 + \sqrt{5})$$

+ Longueur  $L_2$  +

$$L_2 = \int_0^1 \|g'_2(t)\| dt = \int_0^1 \sqrt{4t^2 + 1} dt$$

par Symétrie :  $L_2 = L_1 = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(2 + \sqrt{5})$

3°/ Comparer  $L_1$  et  $L_2$ .

on a  $L_1 = L_2$

4°/ Donner Une interprétation géométrique du résultat.

On remarque que les coordonnées sont échangées donc, ils représentent la même courbe géométriques

la longueur d'un arc ne dépend pas de la paramétrisation mais seulement de la forme de la courbe

Donc : Les deux arcs ont la même longueur car ils représentent la même courbe