

# 4302305 - Lista de Exercícios VIII

Louis Bergamo Radial  
8992822

9 de junho de 2024

## Exercício 3

### Exercício 3: Espalhamento por uma esfera dura

Determine a seção de choque diferencial do espalhamento de partículas por uma esfera dura de raio  $R$ , isto é, a energia potencial de interação é  $U = \infty$  para  $r < R$  e  $U = 0$  para  $r > R$ .

*Resolução.* Para que haja colisão, a distância de visada deve ser tal que  $|\rho| < R$ . Neste caso, o ângulo  $\varphi$  dado pela distância de maior aproximação é

$$\begin{aligned}\varphi &= \int_R^\infty dr \frac{\rho}{r^2 \sqrt{1 - \frac{\rho^2}{r^2}}} \\ &= \int_0^{\frac{\rho}{R}} \frac{d\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \\ &= \arcsin\left(\frac{\rho}{R}\right).\end{aligned}$$

Dessa forma, o ângulo de espalhamento  $\chi = \pi - 2\varphi$  satisfaz

$$\rho = R \sin\left(\frac{\pi - \chi}{2}\right) = R \cos\left(\frac{\chi}{2}\right).$$

Diferenciando em relação à  $\chi$ , temos

$$\frac{d\rho}{d\chi} = -\frac{R}{2} \sin\left(\frac{\chi}{2}\right) \implies \frac{\rho}{\sin \chi} \left| \frac{d\rho}{d\chi} \right| = \frac{R^2 \sin\left(\frac{\chi}{2}\right) \cos\left(\frac{\chi}{2}\right)}{2 \sin \chi} = \frac{R^2}{4}.$$

Logo,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{R^2}{4}$$

é a seção de choque diferencial. □

## Exercício 5

### Exercício 5: Espalhamento por um potencial repulsivo $U = \alpha r^{-2}$

Determinar a seção de choque diferencial do espalhamento por um potencial repulsivo  $U(r) = \alpha r^{-2}$ , com  $\alpha > 0$ .

*Resolução.* O ângulo  $\varphi$  dado pela distância de maior aproximação  $r_{\min}$  é

$$\varphi = \int_{r_{\min}}^{\infty} dr \frac{\rho}{r^2 \sqrt{1 - \frac{\rho^2}{r^2} - \frac{2\alpha}{mv_{\infty}^2 r^2}}},$$

para uma partícula de massa  $m$  com distância de visada  $\rho$  e velocidade inicial  $v_{\infty}$ . Da conservação de energia, a distância de maior aproximação satisfaz

$$1 = \frac{2\alpha}{mr_{\min}^2 v_{\infty}^2} + \frac{\rho^2}{r_{\min}^2} \implies r_{\min} = \sqrt{\rho^2 + \frac{2\alpha}{mv_{\infty}^2}}.$$

Logo, com a substituição de variáveis  $\xi = \frac{r_{\min}}{r}$ , temos

$$\varphi = \frac{\rho}{r_{\min}} \int_0^1 \frac{d\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} = \frac{\pi\rho}{2r_{\min}}.$$

Assim, o ângulo de espalhamento  $\chi = \pi - 2\varphi$  é tal que

$$\frac{\pi - \chi}{\pi} = \frac{\rho}{\sqrt{\rho^2 + \frac{2\alpha}{mv_{\infty}^2}}} \implies \rho^2 = \frac{2\alpha}{mv_{\infty}^2} \frac{(\chi - \pi)^2}{\chi(2\pi - \chi)}.$$

Derivando em relação a  $\chi$ ,

$$\begin{aligned} \rho \frac{d\rho}{d\chi} &= \frac{\alpha}{mv_{\infty}^2} \left[ \frac{2(\chi - \pi)}{\chi(2\pi - \chi)} - \frac{(\chi - \pi)^2}{\chi^2(2\pi - \chi)} + \frac{(\chi - \pi)^2}{\chi(2\pi - \chi)^2} \right] \\ &= \frac{\alpha}{mv_{\infty}^2} \frac{(\chi - \pi) [2\chi(2\pi - \chi) - (\chi - \pi)(2\pi - \chi) + \chi(\chi - \pi)]}{\chi^2(2\pi - \chi)^2} \\ &= \frac{2\alpha}{mv_{\infty}^2} \frac{(\chi - \pi) [2\pi\chi - \chi^2 + (\chi - \pi)^2]}{\chi^2(2\pi - \chi)^2} \\ &= \frac{2\pi^2\alpha}{mv_{\infty}^2} \frac{\chi - \pi}{\chi^2(2\pi - \chi)^2}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{2\pi^2\alpha}{mv_{\infty}^2} \frac{|\chi - \pi|}{\chi^2(2\pi - \chi)^2 \sin \chi}$$

é a seção de choque diferencial para este espalhamento. □