

4302305 - Lista de Exercícios VI

Louis Bergamo Radial
8992822

5 de maio de 2024

Exercício 1

Exercício 1: Movimento de uma partícula sujeita a um sistema de vínculos

Considere o movimento de uma partícula em três dimensões que está sujeita aos vínculos

$$(a) \quad (x^2 + y^2) dx + xy dz = 0 \quad \text{e} \quad (x^2 + y^2) dy + yz dz = 0;$$

$$(b) \quad (x^2 + y^2) dx + xz dz = 0 \quad \text{e} \quad (x^2 + y^2) dy + yz dz = 0.$$

Decida se cada um dos sistemas é holonômico.

Resolução do item (a). Dividindo os vínculos por dt obtemos

$$a_{11}\dot{x} + a_{13}\dot{z} = 0 \quad \text{e} \quad a_{22}\dot{y} + a_{23}\dot{z} = 0,$$

onde $a_{11} = a_{22} = x^2 + y^2$, $a_{13} = xy$, e $a_{23} = yz$. Utilizando a lagrangiana $L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$, obtemos as equações de movimento

$$\begin{cases} m\ddot{x} = \lambda^1 a_{11} \\ m\ddot{y} = \lambda^2 a_{22} \\ m\ddot{z} = \lambda^1 a_{13} + \lambda^2 a_{23} \\ a_{11}\dot{x} + a_{13}\dot{z} = 0 \\ a_{22}\dot{y} + a_{23}\dot{z} = 0, \end{cases}$$

para multiplicadores de Lagrange λ^1 e λ^2 .

Multiplicando as duas últimas equações por λ^1 e λ^2 e somando-as, obtemos

$$\lambda^1 a_{11}\dot{x} + \lambda^2 a_{22}\dot{y} + (\lambda^1 a_{13} + \lambda^2 a_{23})\dot{z} = 0.$$

Substituindo as três primeiras equações temos

$$m(\dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y} + \dot{z}\ddot{z}) = 0 \implies \frac{d}{dt}mv^2 = 0.$$

Isto é, a energia cinética é uma integral de movimento deste sistema, logo as forças não realizam trabalho. Dessa forma, as forças são de vínculo, portanto o sistema é holonômico. \square

Resolução do item (b). Integremos diretamente o sistema, notando que podemos isolar $z dz$ em ambas equações. Temos então a equação diferencial ordinária a variáveis separáveis

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y},$$

cuja solução é $y = kx$, para alguma constante de integração $k \in \mathbb{R}$. Substituindo na primeira equação de vínculo, obtemos

$$z \, dz = -(1 + k^2)x \, dx \implies x^2(1 + k^2) + z^2 = \ell^2 \implies x^2 + y^2 + z^2 = \ell^2,$$

para uma constante de integração $\ell \in \mathbb{R}$. Deste modo, concluímos que este vínculo é equivalente ao vínculo holonômico da interseção do plano $y - kx = 0$ com a esfera de raio ℓ centrada na origem $x^2 + y^2 + z^2 = \ell^2$, portanto o sistema é holonômico. \square

Exercício 2