

# Математический анализ — 1.

Лектор — Юрий Сергеевич Белов

Создатель конспекта — Глеб Минаев \*

## TODOs

Тут нужно рассказать про функции $\exp$ , $\sin$ , $\cos$ и $(1+x)^\alpha$ и их ряды . . . . .	19
Название раздела? . . . . .	20
Картиночки! . . . . .	20
Тем более картиночки!!! . . . . .	20

## Содержание

<b>1 Множества, аксиоматика и вещественные числа.</b>	<b>2</b>
<b>2 Топология прямой, пределы и непрерывность.</b>	<b>4</b>
2.1 Последовательности, пределы и ряды . . . . .	4
2.2 Топология . . . . .	9
2.3 Пределы функций, непрерывность . . . . .	11
2.4 Гладкость (дифференцируемость) . . . . .	14
2.5 Стандартные функции, ряды Тейлора и их сходимость . . . . .	19
<b>3 Примеры и контрпримеры</b>	<b>20</b>
<b>4 Интегрирование</b>	<b>22</b>
4.1 Первообразная . . . . .	22
4.2 Суммы Дарбу и интеграл Римана . . . . .	23
4.3 У чего есть выражаемая первообразная? . . . . .	32
<b>5 Логарифм? Полезности?? Что???</b>	<b>34</b>

Литература:

- В. А. Зорич “Математический анализ”
- О. Л. Виноградов “Математический анализ”
- (подходит попозже) Г. М. Фихтенгельц “Курс дифференциального и интегрального исчисления”
- У. Рудин “Основы анализа”

---

\*Оригинал конспекта расположен на GitHub. Также на GitHub доступен репозиторий с другими конспектами.

- М. Спивак “Математический анализ на многообразиях”
- В. М. Тихомиров “Рассказы о максимумах и минимумах”

# 1 Множества, аксиоматика и вещественные числа.

Мы начинаем с теории множеств.

## Определение 1.

- Множества и элементы — понятно.
- $a \in B$  — понятно.
- $A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$  — объединение.
- $A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$  — пересечение.
- $A \setminus B := \{x \mid x \in A \vee x \notin B\}$  — разность.
- $A \triangle B := A \setminus B \cup B \setminus A$  — симметрическая разница.
- $A^C := X \setminus A$  — дополнение, где  $X$  — некоторое фиксированное рассматриваемое множество.
- $A \subset B$  — “ $A$  — подмножество  $B$ ”, т.е.  $\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B)$ .

## Следствие.

- (первое правило Моргана)  $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$ .

$$x \in (A \cup B)^C \Leftrightarrow x \notin A \cup B \Leftrightarrow \begin{cases} x \notin A \\ x \notin B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A^C \\ x \in B^C \end{cases} \Leftrightarrow x \in A^C \cap B^C$$

- (второе правило Моргана)  $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$ . Аналогично.

**Определение 2.** (Аксиома индукции.) Пусть есть функция  $A : \mathbb{N} \rightarrow \text{true}; \text{false}$ , что:

1.  $A(1) = \text{true}$ ;
2.  $\forall n (A(n) \rightarrow A(n+1))$ .

Тогда  $\forall n A(n)$ .

Определение натуральных чисел сложно, рассматривать его не будем. Важно также иметь в виду натуральные числа с операциями сложения и умножения.

**Определение 3.** Пусть есть кольцо без делителей нуля  $R$ . Рассмотрим отношение эквивалентности  $\sim$  на  $R \times (R \setminus \{0\})$ , что  $(a; b) \sim (c; d) \Leftrightarrow ad = bc$ . Тогда  $\text{Quot}(R)$  — фактор-множество по  $\sim$  и поле.

**Определение 4.** Рациональные числа —  $\mathbb{Q} := \text{Quot}(\mathbb{Z})$ .

**Теорема 1.**  $\nexists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$ .

**Доказательство.** Предположим противное, т.е. существуют взаимно простые  $m \in \mathbb{Z}$  и  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ , что  $(\frac{m}{n})^2 = 2$ . Тогда  $m^2 = 2n^2$ . Очевидно, что тогда  $m^2 : 2$ , значит  $m : 2$ , значит  $m : 4$ , значит  $n^2 : 2$ , значит  $n : 2$ , значит  $n$  и  $m$  не взаимно просты, так как делятся на 2 — противоречие.  $\square$

Теперь мы хотим понять, что есть вещественные числа. Тут есть несколько подходов.

**Определение 5** (аксиоматический подход). Вещественные числа — это полное упорядоченное поле  $\mathbb{R}$ , состоящее не из одного элемента.

Здесь “поле” значит, что на множестве (вместе с его операциями и выделенными элементами) верны аксиомы поля  $A_1, A_2, A_3, A_4, M_1, M_2, M_3, M_4$  и  $D$  (т.е. сложение и умножение ассоциативны, коммутативны имеют нейтральные элементы и удовлетворяют условию существованию обратных (по умножению — для всех кроме нуля), а также дистрибутивности).

Упорядоченность значит, что есть рефлексивное транзитивное антисимметричное отношение  $\preceq$ , что все элементы сравнимы, согласованное с операциями, т.е.:

$$A) a \preceq b \Rightarrow a + x \preceq b + x.$$

$$M) 0 \preceq a \wedge 0 \preceq b \Rightarrow 0 \preceq ab.$$

Полнота поля значит любое из следующих утверждений (они равносильны):

- любое ограниченное сверху (снизу) подмножество поля имеет точную верхнюю (нижнюю) грань;
- (аксиома Кантора-Дедекинда) для любых двух множеств  $A$  и  $B$ , что  $A \preceq B$ , есть разделяющий их элемент.

Итого мы имеем 9 аксиом поля, 2 аксиомы упорядоченности и 1 аксиома полноты упорядоченности.

**Утверждение.** Над  $\mathbb{Q}$  нет элемента разделяющего  $A := \{a > 0 \mid a^2 < 2\}$  и  $B := \{b > 0 \mid b^2 > 2\}$ .

**Доказательство.** Предположим противное, т.е. есть  $c > 0$ , что  $A < c < B$ .

Если  $c^2 < 2$ , то найдём  $\varepsilon$ , что  $\varepsilon \in (0; 1)$  и  $(c + \varepsilon)^2 < 2$ . Заметим, что  $(c + \varepsilon)^2 = c^2 + 2c\varepsilon + \varepsilon^2 < c^2 + (2c + 1)\varepsilon$ . Пусть  $\varepsilon < \frac{2-c^2}{2c+1}$ , тогда такое  $\varepsilon$  точно подойдёт, ну а поскольку  $\frac{2-c^2}{2c+1} > 0$ , то такое  $\varepsilon$  есть. Значит  $c^2 \geq 2$ .

Аналогично имеем, что  $\varepsilon \leq 2$ . А значит  $c^2 = 2$ , что не бывает над  $\mathbb{Q}$ .  $\square$

**Следствие.**  $\mathbb{Q}$  не полно.

**Определение 6.** Значение  $t$  является *верхней (нижней) гранью* непустого множества  $X \in \mathbb{R}$  тогда и только тогда, когда  $t \geq X$ , т.е. любой элемент  $x$  множества  $X$  не более  $t$ .

*Точная верхняя (нижняя) грань* или *супремум (инфимум)* непустого множества  $X \subseteq \mathbb{R}$  — минимальная верхняя (нижняя) грань множества  $X$ . Он же является элементом разделяющим  $X$  и множество всех его верхних (нижних) граней. Обозначение:  $\sup(X)$  и  $\inf(X)$  соответственно.

*Осцелляцией* множества  $X$  называется значение  $\text{osc } X := \sup X - \inf X$ .

**Определение 7.**

- *Закрытый интервал* или *отрезок*  $[a; b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ .
- *Открытый интервал* или просто *интервал*  $(a; b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ .

- Полукоткрытый интервал или полуинтервал  $(a; b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ ,  $[a; b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ .

**Теорема 2** (Лемма о вложенных отрезках). Пусть имеется  $\{I_i\}_{i=1}^{\infty}$  — множество вложенных (непустых) отрезков, т.е.  $\forall n > 1 \ I_{n+1} \subset I_n$ . Тогда  $\bigcap_{i=1}^{\infty} I_i \neq \emptyset$ .

**Доказательство.** Заметим, что для любых натуральных  $n < m$  верно, что  $a_n \leq a_m \leq b_m \leq b_n$ , где  $I_n = [a_n; b_n]$ . Тогда для  $A := \{a_i\}_{i=1}^{\infty}$  и  $B := \{b_i\}_{i=1}^{\infty}$  верно, что  $A \leq B$ . Значит есть разделяющий их элемент  $t$ , значит  $A \leq t \leq B$ , значит  $t \in I_i$  для всех  $i$ , значит  $t \in \bigcap_{i=1}^{\infty} I_i$ .  $\square$

*Замечание 1.* Теорема 2 не верна для не отрезков.

*Замечание 2.* Если в теореме 2  $b_i - a_i$  “сходится к 0”, т.е.  $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : \forall i > n \ b_i - a_i < \varepsilon$ , то пересечение всех отрезков состоит из ровно одного элемента.

**Теорема 3** (индукция на вещественных числах). Пусть дано множество  $X \subseteq [0; 1]$ , что

1.  $0 \in X$ ;
2.  $\forall x \in X \exists \varepsilon > 0 : U_{\varepsilon}(x) \cap [0; 1] \subseteq X$ ;
3.  $\forall Y \subseteq X \sup(Y) \in X$ .

Тогда  $X = [0; 1]$ .

**Доказательство.** Предположим противное:  $X \neq [0; 1]$ . Рассмотрим  $Z := [0; 1] \setminus X$  ( $Z \neq \emptyset$ !) и  $Y := \{y \in [0; 1] \mid y < Z\}$  ( $Y \neq \emptyset$ !). Заметим, что  $Y \subseteq X$  и  $\sup(Y) = \inf(Z) = t$ . Тогда  $t \in X$  по второму условию. Значит для некоторого  $\varepsilon > 0$  верно, что  $U_{\varepsilon}(t) \cap [0; 1] \in X$ , а т.е.  $(U_{\varepsilon}(t) \cap [0; 1]) \cap Z = \emptyset$ , а тогда  $t \neq \inf(Z)$  — противоречие. Значит  $X = [0; 1]$ .  $\square$

## 2 Топология прямой, пределы и непрерывность.

### 2.1 Последовательности, пределы и ряды

**Определение 8.** Предел последовательности  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  — такое число  $x$ , что для любой окрестности  $x$  эта последовательность с некоторого момента будет лежать в этой окрестности:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \quad x_n \in U_{\varepsilon}(x)$$

Обозначение:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \{x_n\}_{n=0}^{\infty} = x$ .

*Пределная точка последовательности*  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  — такое число  $x$ , что в любой его окрестности после любого момента появится элемент данной последовательности:

$$\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n > N : \quad x_n \in U_{\varepsilon}(x)$$

**Определение 9.** Последовательность  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  называется *фундаментальной*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n_1, n_2 > N \quad |x_{n_1} - x_{n_2}| < \varepsilon$$

**Теорема 4.** Последовательность сходится тогда и только тогда, когда фундаментальна.

**Доказательство.**

1. Пусть последовательность  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  сходится к некоторому значению  $X$ , тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \quad |x_n - X| < \varepsilon/2 \Rightarrow$$

$$\forall n_1, n_2 > N \quad |x_{n_1} - x_{n_2}| = |x_{n_1} - X + X - x_{n_2}| \leq |x_{n_1} - X| + |X - x_{n_2}| < \varepsilon$$

2. Пусть последовательность  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  фундаментальна. Мы знаем, что для каждого  $\varepsilon > 0$  все члены, начиная с некоторого различаются менее чем на  $\varepsilon$ . Тогда возьмём какой-нибудь такой член  $y_0$  для некоторого  $\varepsilon$ , затем какой-нибудь такой член  $y_1$  для  $\varepsilon/2$ , который идёт после  $y_0$  и так далее. Получим последовательность, что все члены, начиная с  $n$ -ого лежат в  $\varepsilon/2^n$ -окрестности  $y_n$ . Тогда рассмотрим последовательность  $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$ , где  $I_n = [y_n - \varepsilon/2^{n-1}; y_n + \varepsilon/2^{n-1}]$ . Несложно понять, что  $I_n \supseteq I_{n+1}$ , поэтому в пересечении  $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$  лежит некоторый  $X$ . Несложно понять, что все члены начальной последовательности, начиная с  $y_{n+2}$ , лежат в  $\varepsilon/2^{n+2}$ -окрестности  $y_{n+2}$ . При этом  $|y_{n+2} - X| \leq \varepsilon/2^{n+1}$ , что значит, что все члены главной последовательности, начиная с  $y_{n+2}$  лежат в  $3\varepsilon/2^{n+2}$ -окрестности  $X$ , а значит и в  $\varepsilon/2^n$ .

□

**Утверждение 5.** Для последовательностей  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  и  $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$  верно (если определено), что

1.  $\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty} + \lim\{y_n\}_{n=0}^{\infty} = \lim\{x_n + y_n\}_{n=0}^{\infty}$
2.  $-\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty} = \lim\{-x_n\}_{n=0}^{\infty}$
3.  $\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \cdot \lim\{y_n\}_{n=0}^{\infty} = \lim\{x_n y_n\}_{n=0}^{\infty}$
4.  $\frac{1}{\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty}} = \lim\{\frac{1}{x_n}\}_{n=0}^{\infty}$  (если  $\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \neq 0$ )

и всегда, когда определена левая сторона определена, правая тоже определена.

**Доказательство.**

1. Пусть  $\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty} = X$ ,  $\lim\{y_n\}_{n=0}^{\infty} = Y$ . Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N, M \in \mathbb{N} : \quad \forall n > N \quad |x_n - X| < \varepsilon/2 \quad \wedge \quad \forall m > M \quad |y_m - Y| < \varepsilon/2,$$

тогда

$$\forall n > \max(N, M) \quad |(x_n + y_n) - (X + Y)| \leq |x_n - X| + |y_n - Y| < \varepsilon,$$

что означает, что  $\{x_n + y_n\}_{n=0}^{\infty}$  сходится и сходится к  $X + Y$ .

2. Пусть  $\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty} = X$ . Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \quad \forall n > N \quad |x_n - X| < \varepsilon,$$

тогда

$$\forall n > N \quad |(-x_n) - (-X)| = |X - x_n| = |x_n - X| < \varepsilon,$$

что означает, что  $\{-x_n\}_{n=0}^{\infty}$  сходится и сходится к  $-X$ .

3. Пусть  $\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty} = X$ ,  $\lim\{y_n\}_{n=0}^{\infty} = Y$ . Определим также

$$\delta : (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \varepsilon \mapsto \frac{\varepsilon}{\sqrt{\left(\frac{|x|+|y|}{2}\right)^2 + \varepsilon} + \frac{|x|+|y|}{2}} = \sqrt{\left(\frac{|x|+|y|}{2}\right)^2 + \varepsilon} - \frac{|x|+|y|}{2}$$

Несложно видеть, что  $\delta(\varepsilon)$  всегда определено и всегда положительно. Также несложно видеть, что  $\delta(\varepsilon)$  есть корень уравнения  $t^2 + t(|X| + |Y|) = \varepsilon$ . Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N, M \in \mathbb{N} : \quad \forall n > N \quad |x_n - X| < \delta(\varepsilon) \quad \wedge \quad \forall m > M \quad |y_m - Y| < \delta(\varepsilon),$$

тогда

$$\begin{aligned}
\forall n > \max(N, M) \quad |x_n \cdot y_n - X \cdot Y| &= |x_n \cdot y_n - x_n \cdot Y + x_n \cdot Y - X \cdot Y| \\
&\leq |x_n \cdot (y_n - Y)| + |(x_n - X) \cdot Y| \\
&< |x_n| \cdot \delta(\varepsilon) + \delta(\varepsilon) \cdot |Y| \\
&< (|X| + \delta(\varepsilon)) \cdot \delta(\varepsilon) + |Y| \cdot \delta(\varepsilon) \\
&= \delta(\varepsilon)^2 + (|X| + |Y|)\delta(\varepsilon) \\
&= \varepsilon,
\end{aligned}$$

что означает, что  $\{x_n \cdot y_n\}_{n=0}^{\infty}$  сходится и сходится к  $X \cdot Y$ .

4. Пусть  $\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty} = X$ . Определим также

$$\delta : (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \varepsilon \mapsto \frac{\varepsilon|X|^2}{1 + \varepsilon|X|}$$

Несложно видеть, что  $\delta(\varepsilon)$  всегда определено и всегда меньше  $|X|$ . Также несложно видеть, что  $\delta(\varepsilon)$  есть корень уравнения  $\frac{t}{|X|(|X|-t)} = \varepsilon$ . Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \quad \forall n > N \quad |x_n - X| < \delta(\varepsilon),$$

тогда

$$\forall n > N \quad \left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{X} \right| = \left| \frac{X - x_n}{X \cdot x_n} \right| < \frac{\delta(\varepsilon)}{|X| \cdot |x_n|} < \frac{\delta(\varepsilon)}{|X|(|X| - \delta(\varepsilon))} = \varepsilon,$$

что означает, что  $\{\frac{1}{x_n}\}_{n=0}^{\infty}$  сходится и сходится к  $1/X$ .

□

**Определение 10.** Последовательность  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  *асимптотически больше* последовательности  $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ , если  $x_n > y_n$  для всех натуральных  $n$ , начиная с некоторого. Обозначение:  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \succ \{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ .

Аналогично определяются *асимптотически меньше* ( $\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \prec \{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ ), *асимптотически не больше* ( $\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \preccurlyeq \{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ ) и *асимптотически не меньше* ( $\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \succcurlyeq \{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ ).

**Утверждение 6.** Если  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \succcurlyeq \{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ , то  $\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \geq \lim\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ .

**Доказательство.** Предположим противное, т.е.  $Y > X$ , где  $X := \lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ ,  $Y := \lim\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ . Тогда пусть  $\varepsilon = \frac{|X-Y|}{2}$ . С каких-то моментов  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  и  $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$  находятся в  $\varepsilon$ -окрестностях  $X$  и  $Y$  соответственно. Тогда начиная с позднего из этих моментов,  $y_n > Y - \varepsilon = X + \varepsilon > x_n$ , т.е.  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \prec \{y_n\}_{n=0}^{\infty}$  — противоречие. Значит  $X \geq Y$ . □

**Утверждение 7.** Если  $\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty} > \lim\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ , то  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \succ \{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ .

**Доказательство.** Пусть  $X := \lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ ,  $Y := \lim\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ . Тогда пусть  $\varepsilon = \frac{|X-Y|}{2}$ . С каких-то моментов  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  и  $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$  находятся в  $\varepsilon$ -окрестностях  $X$  и  $Y$  соответственно. Тогда начиная с позднего из этих моментов,  $x_n > X - \varepsilon = Y + \varepsilon > y_n$ , т.е.  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \succ \{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ . □

**Утверждение 8** (лемма о двух полицейских). Если

$$\{x_n\}_{n=0}^{\infty} \succcurlyeq \{y_n\}_{n=0}^{\infty} \succcurlyeq \{z_n\}_{n=0}^{\infty}$$

и

$$\lim\{x_n\}_{n=0}^{\infty} = \lim\{z_n\}_{n=0}^{\infty} = A,$$

то предел  $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$  определён и равен  $A$ .

**Доказательство.** Для каждого  $\varepsilon > 0$  есть  $N, M \in \mathbb{N}$ , что

$$\forall n > N \quad |x_n - A| < \varepsilon \quad \wedge \quad \forall m > M \quad |z_m - A| < \varepsilon,$$

значит

$$\forall n > \max(N, M) \quad A + \varepsilon > x_n \geq y_n \geq z_n > A - \varepsilon \quad \text{т.е.} \quad |y_n - A| < \varepsilon,$$

что означает, что  $\{y_n\}_{n=0}^\infty$  сходится и сходится к  $A$ .  $\square$

**Утверждение 9.** Если  $\{x_n\}_{n=0}^\infty \succcurlyeq \{y_n\}_{n=0}^\infty$ ,  $\lim\{x_n\}_{n=0}^\infty = A$ , а  $\{y_n\}_{n=0}^\infty$  не убывает (с некоторого момента), то предел  $\{y_n\}_{n=0}^\infty$  существует и не превосходит  $A$ .

**Доказательство.** Если последовательность  $\{y_n\}_{n=0}^\infty$  возрастает не с самого начала, то отрезем её начало с до момента начала возрастания. Заметим, что она ограничена сверху (из-за последовательности  $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ ), тогда определим  $B := \sup(\{y_n\}_{n=0}^\infty)$ . Тогда  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : |B - x_N| < \varepsilon$ , тогда  $\forall n > N \quad |B - x_n| < \varepsilon$ , что означает, что  $\{y_n\}_{n=0}^\infty$  сходится и сходится к  $B$ . По утверждению 6  $A \geq B$ .  $\square$

**Определение 11.** Сумма ряда  $\{a_k\}_{k=0}^\infty$  есть значение  $\sum_{k=0}^\infty a_k := \lim \left\{ \sum_{i=0}^k \right\}_{k=0}^\infty$ . Частичной же суммой  $s_k$  этого ряда называется просто  $\sum_{i=0}^k a_i$ .

**Определение 12.** Ряд  $\sum_{i=0}^\infty a_i$  сильно сходится, если  $\sum_{i=0}^\infty |a_i|$  сходится.

**Теорема 10.** Если ряд сильно сходится, то он сходится.

**Доказательство.**

**Лемма 10.1.** Пусть ряд  $\sum_{i=0}^\infty a_i$  сходится, тогда сходится любой его “хвост” (суффикс), и для любого  $\varepsilon > 0$  есть такой хвост, сумма которого меньше  $\varepsilon$ .

**Доказательство.** Пусть  $A = \sum_{i=0}^\infty a_i$ . Это значит, что для каждого  $\varepsilon > 0$  существует  $N \in \mathbb{N}$ , что для всех  $n \geq N$  верно, что  $\sum_{i=0}^n |a_i| \in U_\varepsilon(A)$ . Тогда заметим, что

$$\sum_{i=N+1}^\infty |a_i| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=N+1}^n |a_i| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{i=0}^n |a_i| - \sum_{i=0}^N |a_i| \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n |a_i| - \sum_{i=0}^N |a_i| = A - \sum_{i=0}^N |a_i| \in U_\varepsilon(0)$$

Это и означает, что любой хвост сходится. И так мы для каждого  $\varepsilon$  нашли такой хвост, что его сумма меньше  $\varepsilon$ .  $\square$

Пусть дан сильно сходящийся ряд  $\sum_{i=0}^\infty a_i$ . Пусть  $\varepsilon_n := \sum_{i=n}^\infty |a_i|$ . Несложно видеть, что  $\{\varepsilon_n\}_{n=0}^\infty$  монотонно уменьшается, сходясь к 0 (последнее следует из леммы 10.1). Также несложно видеть по рассуждениям леммы 10.1, что  $\varepsilon_n - \varepsilon_{n+1} = |a_n|$ . Тогда определим

$$S_n := \overline{U}_{\varepsilon_{n+1}} \left( \sum_{i=0}^n a_i \right),$$

где  $\overline{U}_\varepsilon(x)$  — закрытая  $\varepsilon$ -окрестность точки  $x$ . Тогда несложно видеть, что

$$\left| \sum_{i=0}^{n+m} a_i - \sum_{i=0}^n a_i \right| = \left| \sum_{i=n+1}^{n+m} a_i \right| \leq \sum_{i=n+1}^{n+m} |a_i| \leq \varepsilon_{n+1}$$

Тем самым сумма любого префикса длины хотя бы  $n+1$  лежит в  $\overline{U}_{\varepsilon_{n+1}}(\sum_{i=0}^n a_i) = S_n$ . Также несложно видеть, что  $S_{n+1} \subseteq S_n$ . А также понятно, что  $S_i$  замкнуто и ограничено (“компактно”).

Пусть  $A := \bigcap_{i=0}^\infty S_i$  (поскольку диаметры шаров сходятся к нулю, то в пересечении лежит не более одной точки). Тогда мы видим, что  $|\sum_{i=0}^n a_i - A| \leq \varepsilon_{n+1} \rightarrow 0$ , поэтому  $\sum_{i=0}^\infty a_i$  сходится и сходится к  $A$ .  $\square$

**Следствие 10.1.** Если  $\{b_i\}_{i=0}^{\infty} \succcurlyeq \{|a_i|\}_{i=0}^n$  и  $\sum_{i=0}^{\infty} |b_i|$  существует, то и  $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$  существует.

**Теорема 11** (признак Лейбница). Пусть дана последовательность  $\{a_n\}$ , монотонно сверху сходящаяся к 0. Тогда ряд  $\sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i a_i$  сходится.

**Доказательство.** Рассмотрим последовательности

$$\{P_n\}_{n=0}^{\infty} := \{S_{2n}\}_{n=0}^{\infty} = \left\{ \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i a_i \right\}_{n=0}^{\infty} \quad \{Q_n\}_{n=0}^{\infty} := \{S_{2n+1}\}_{n=0}^{\infty} = \left\{ \sum_{i=0}^{2n+1} (-1)^i a_i \right\}_{n=0}^{\infty}$$

Несложно видеть, что

$$\begin{aligned} P_{n+1} - P_n &= -a_{2n+1} + a_{2n+2} \leq 0 & Q_{n+1} - Q_n &= a_{2n+2} - a_{2n+3} \geq 0 \\ Q_n - P_n &= -a_{2n+1} \leq 0 & P_{n+1} - Q_n &= a_{2n+2} \geq 0 \end{aligned}$$

Тогда имеем, что  $\{P_n\}_{n=0}^{\infty}$  монотонно убывает,  $\{Q_n\}_{n=0}^{\infty}$  монотонно возрастает, а также

$$\{P_n\}_{n=0}^{\infty} \geq \{Q_n\}_{n=0}^{\infty}.$$

Тогда последовательности  $\{P_n\}_{n=0}^{\infty}$  и  $\{Q_n\}_{n=0}^{\infty}$  сходятся и сходятся к  $P$  и  $Q$  соответственно. При этом последовательность

$$\{P_n\}_{n=0}^{\infty} - \{Q_n\}_{n=0}^{\infty} = \{P_n - Q_n\}_{n=0}^{\infty} = a_{2n+1}$$

тоже сходится по условию и сходится к 0. Поэтому

$$P - Q = \lim\{P_n\}_{n=0}^{\infty} - \lim\{Q_n\}_{n=0}^{\infty} = 0$$

значит  $P = Q$ . Значит и последовательность префиксных сумм тоже сходится к  $P = Q$ .  $\square$

**Лемма 12** (преобразование Абеля).

$$\sum_{k=0}^n a_k b_k = \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k + a_n B_n$$

где  $B_n := \sum_{i=0}^n b_i$ .

**Теорема 13** (признак Дирихле). Если даны  $\{a_i\}_{i=0}^{\infty}$  и  $\{b_i\}_{i=0}^{\infty}$ , что  $\{a_i\}_{i=0}^{\infty} \searrow 0$ , а  $\{B_n\}_{n=0}^{\infty} = \{\sum_{i=0}^n b_i\}_{i=0}^{\infty}$  ограничена, то ряд  $\sum_{i=0}^{\infty} a_i b_i$  сходится.

**Доказательство.**

$$S_n = \sum_{i=0}^n a_i b_i = \sum_{i=0}^n (a_i - a_{i+1}) B_i + a_n B_n$$

Пусть  $|B_n| < C$  для всех  $n$ . Несложно видеть, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n B_n| \leq \lim a_n C = C \lim a_n = 0,$$

поэтому  $\lim a_n B_n = 0$ . Также

$$|(a_k - a_{k+1}) B_k| < C |a_k - a_{k+1}| = C(a_k - a_{k+1}),$$

поэтому

$$|S_n - a_n B_n| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |(a_k - a_{k+1}) B_k| < C \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) = C(a_0 - a_n),$$

что тоже сходится. Поэтому  $\{S_n\}_{n=0}^{\infty}$  сходится, т.е. и ряд сходится.  $\square$



## 2.2 Топология

**Определение 13.**  $\varepsilon$ -окрестность точки  $x$  (для  $\varepsilon > 0$ ) —  $(x - \varepsilon; x + \varepsilon)$ . Обозначение:  $U_\varepsilon(x)$ .  
Проколотая  $\varepsilon$ -окрестность точки  $x$  —  $(x - \varepsilon; x) \cup (x; x + \varepsilon)$ . Обозначение:  $V_\varepsilon(x)$ .

**Определение 14.** Пусть дано некоторое множество  $X \subseteq \mathbb{R}$ . Тогда точка  $x \in X$  называется *внутренней точкой* множества  $X$ , если она содержится в  $X$  вместе со своей окрестностью.

Само множество  $X$  называется *открытым*, если все его точки внутренние.

*Пример 1.* Следующие множества открыты:

- $(a; b)$ ;
- $(a; +\infty)$ ;
- $\mathbb{R}$ ;
- $\emptyset$ ;
- $\bigcup_{i=0}^{\infty} (a_i; b_i)$  (интервалы не обязательно не должны пересекаться).

**Определение 15.** Пусть дано множество  $X \subseteq \mathbb{R}$ . Точка  $x \in \mathbb{R}$  называется *предельной точкой* множества, если в любой проколотой окрестности  $x$  будет какая-либо точка  $X$ .

Множество предельных точек  $X$  называется *производным множеством* множества  $X$  и обозначается как  $X'$ .

Множество  $X$  называется *замкнутым*, если  $X \supseteq X'$ .

**Определение 16.** Пусть дано множество  $X \subseteq \mathbb{R}$ . Если у любой последовательности его точек есть предельная точка из самого множества  $X$ , то  $X$  называется *компактным*.

**Теорема 14.** Подмножество  $\mathbb{R}$  компактно тогда и только тогда, когда замкнуто и ограничено.

**Доказательство.**

1. Пусть  $X \subseteq \mathbb{R}$  компактно. Если  $X$  неограниченно, то несложно построить последовательность элементов  $X$ , которая монотонно возрастает или убывает, а разность между членами не меньше любой фиксированной константы (например, не меньше 1); такая последовательность не имеет предельных точек, что противоречит определению  $X$ , а значит  $X$  ограничено. Если  $X$  не замкнуто, то можно рассмотреть предельную точку  $x$ , не лежащую в  $X$ , и построить последовательность, сходящуюся к ней, а значит никаких других точек у последовательности быть не может, а значит опять получаем противоречие с определением  $X$ ; значит  $X$  ещё и замкнуто.
2. Пусть  $X$  замкнуто и ограничено. Пусть также дана некоторая последовательность  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  элементов  $X$ . Поскольку  $X$  ограничено, то значит лежит внутри некоторого отрезка  $I_0$ . Определим последовательность  $\{I_n\}_{n=0}^{\infty}$  рекуррентно следующим образом. Пусть  $I_n$  определено; разделим  $I_n$  на две половины и определим  $I_{n+1}$  как любую из половин, в которой находится бесконечное количество членов последовательности  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ . после этого определим последовательность  $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$  как подпоследовательность  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ , что  $y_n \in I_n$  для любого  $n \in \mathbb{N}$  (это можно сделать рекуррентно: если определён член  $y_n$ , то найдётся ещё бесконечное количество членов начальной последовательности в  $I_{n+1}$ , которые идут после  $y_n$ , так как отброшено конечное количество, а значит можно взять любой). Несложно видеть, что  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n =: y$ . Из-за замкнутости  $y \in X$ , а значит  $y$  — предельная точка  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$  — лежит в  $X$  и доказывает компактность  $X$ .

□

**Лемма 15.** Пусть  $\Sigma$  — семейство интервалов длины больше некоторого  $d > 0$ , покрывающее отрезок  $[a; b]$ . Тогда у  $\Sigma$  есть конечное подсемейство  $\Sigma'$ , покрывающее  $[a; b]$ .

**Доказательство.** Давайте вести индукцию по  $\lceil (b - a)/d \rceil$ .

**База.**  $\lceil (b - a)/d \rceil = 0$ . В таком случае  $a = b$ , а значит, можно взять любой интервал, покрывающий единственную точку и получить всё искомое семейство  $\Sigma'$ .

**Шаг.** Рассмотрим  $\Omega := \{I \in \Sigma \mid a \in I\}$ . Заметим, что если у правых концов интервалов из  $\Omega$  нет верхних граней (т.е. их множество не ограничено сверху), то значит найдётся интервал, покрывающий и  $a$ , и  $b$ , а значит его как единственный элемент семейства  $\Sigma'$  будет достаточно. Иначе определим  $a'$  как супремум правых концов интервалов из  $\Omega$ .

Тогда мы имеем, что есть интервалы из  $\Omega$ , подбирающиеся сколь угодно близко к  $a'$ , а также что все интервалы из  $\Sigma$ , покрывающие  $a'$  не покрывают  $a$ . Если  $a' > b$ , то можно опять же взять интервал, который покроет весь  $[a; b]$ , и остановится. Иначе рассмотрим любой интервал  $I$ , покрывающий  $a'$  и любой интервал  $J$  из  $\Omega$ , перекрывающийся с  $I$ . Пусть  $a''$  — правый конец  $J$ .

Заметим, что  $I$  и  $J$  покрывают  $[a; a'']$ . При этом  $a < J < a''$ , значит  $a'' - a \geq \text{osc}(J) > d$ . Если  $a'' > b$ , то  $\Sigma = \{I, J\}$  будет достаточно. Иначе заметим, что

$$\left\lceil \frac{b - a''}{d} \right\rceil = \left\lceil \frac{b - a}{d} - \frac{a'' - a}{d} \right\rceil \leq \left\lceil \frac{b - a}{d} - 1 \right\rceil = \left\lceil \frac{b - a}{d} \right\rceil - 1 < \left\lceil \frac{b - a}{d} \right\rceil$$

Тогда по предположению индукции есть конечное подпокрытие  $\Sigma''$  покрытия  $\Sigma$  отрезка  $[a''; b]$ . Значит  $\Sigma' := \Sigma'' \cup \{I, J\}$  является конечным подпокрытием покрытия  $\Sigma$  множества  $[a; b]$ . □

**Лемма 16.** Пусть  $\Sigma$  — семейство интервалов длины больше некоторого  $d > 0$ . Тогда найдётся не более чем счётное подсемейство  $\Sigma'$ , имеющее такое же объединение, т.е.  $|\Sigma'| \leq |\mathbb{N}|$ ,  $a \cup \Sigma = \cup \Sigma'$ .

**Доказательство.** Несложно видеть, что  $A := \cup \Sigma$  представляется в виде дизъюнктного объединения интервалов. Каждый из них можно представить как объединение не более чем счётного отрезков. Итого мы получим не более чем счётное семейство  $\Omega$  отрезков, что  $\cup \Omega = A$ . Для каждого отрезка из  $\Omega$  построим по лемме 15 конечное подпокрытие покрытия  $\Sigma$ , а затем объединив их, получим не более чем счётное семейство  $\Sigma'$ , покрывающее любой из них, а значит и  $\cup \Omega = A = \cup \Sigma$ . С другой стороны  $\Sigma'$  — подмножество  $\Sigma$ , значит и  $\cup \Sigma'$  — подмножество  $\cup \Sigma$ .

В итоге  $\cup \Sigma' = \cup \Sigma$ , и при этом  $\Sigma'$  — не более чем счётное подмножество  $\Sigma$ . □

**Лемма 17.** Пусть дано семейство  $\Sigma$  интервалов. Тогда из него можно выделить не более чем счётное подсемейство  $\Sigma'$  с тем же объединением, т.е.  $|\Sigma'| \leq |\mathbb{N}|$ ,  $a \cup \Sigma = \cup \Sigma'$ .

**Доказательство.** Рассмотрим для каждого  $n \in \mathbb{Z}$  семейство

$$\Sigma_n = \{I \in \Sigma \mid \text{osc}(I) \in [2^n; 2^{n+1})\}$$

Применим лемму к  $\Sigma_n$  и получим  $\Sigma'_n$ . Тогда  $\Sigma' := \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \Sigma'_n$  является подмножеством  $\Sigma$ , даёт в объединении то же, что и  $\Sigma$ , и при этом имеет мощность не более  $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ . □

**Теорема 18.** Подмножество  $\mathbb{R}$  компактно тогда и только тогда, когда из любого его покрытия интервалами можно выделить конечное подпокрытие.

**Доказательство.**

1. Пусть  $X$  компактно, а  $\Sigma$  — некоторое его покрытие интервалами. Определим для каждого  $d > 0$

$$\Sigma_d := \{I \in \Sigma \mid \text{osc}(I) > d\}$$

Если никакое из  $\Sigma_d$  не является подпокрытием множества  $X$ , то рассмотрим последовательность  $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ , где  $x_n$  — любой элемент  $X \setminus \Sigma_{1/2^n}$ . У  $\{x_n\}_{n=0}^\infty$  есть предельная точка  $x \in X$ . Значит должен быть интервал, покрывающий  $x$ , но тогда он же покрывает весь некоторый хвост нашей последовательности, а сам лежит в некотором  $\Sigma_{1/2^n}$  — противоречие. Значит некоторое  $\Sigma_d$  является подпокрытием, а значит далее можно рассматривать его в качестве  $\Sigma$ .

$\bigcup \Sigma$  — открытое множество, поэтому является дизъюнктивным объединением семейства  $\Omega$  интервалов. Поскольку в  $\Sigma$  длины всех интервалов больше  $d$ , то в  $\Omega$  тоже. Но также  $X$  ограничено, поэтому  $\Omega$  конечно, да и все интервалы в нём ограничены. Заметим, что  $X \cap I$ , где  $I$  — любой интервал из  $\Omega$ , является замкнутым множеством, поэтому его можно накрыть некоторым отрезком  $S \subseteq I$  (для этого можно взять отрезок  $[\inf(X \cap I); \sup(X \cap I)]$ ). Значит из накрытия  $\Sigma$  выделить  $|\Omega|$  конечных подпокрытий для каждого отрезка (по лемме 16), а их объединение даст конечное покрытие  $X$ .

2. Пусть  $X$  таково, что из любого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие.

Если  $X$  неограничено, то тогда несложно будет видеть, что покрытие  $\{(n; n+2) \mid n \in \mathbb{Z}\}$  нельзя уменьшить до конечного. Значит  $X$  конечно.

Если  $X$  не замкнуто, то значит есть точка  $x \notin X$ , что в любой окрестности  $x$  будет точка. Тогда рассмотрим покрытие  $\{(x+2^n; x^{n+2}) \mid n \in \mathbb{Z}\} \cup \{(x-2^{n+2}; x^n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ . Несложно видеть, что если взять любое конечное подсемейство интервалов, то оно не накроет некоторую окрестность  $x$ , а значит и  $X$ . Значит  $X$  замкнуто.

Итого получаем, что  $X$  компактно.

□

## 2.3 Пределы функций, непрерывность

**Определение 17** (по Коши). *Предел* функции  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  в точке  $x$  — такое значение  $y$ , что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : f(V_\delta(x) \cap X) = U_\varepsilon(y)$$

Обозначение:  $\lim_{t \rightarrow x} f(t) = y$ .

**Определение 18** (по Гейне). *Предел* функции  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  в точке  $x$  — такое значение  $y$ , что для любой последовательности  $\{x_n\}_{n=0}^\infty$  элементов  $X \setminus \{x\}$  последовательность  $\{f(x_n)\}_{n=0}^\infty$  сходится к  $y$ . Обозначение:  $\lim_{t \rightarrow x} f(t) = y$ .

**Теорема 19.** *Определения пределов по Коши и по Гейне равносильны.*

**Доказательство.** Будем доказывать равносильность отрицаний утверждений, ставимых в определениях.

1. Пусть функция  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  не сходится по Коши в  $x$  к значению  $y$ . Значит есть такое  $\varepsilon > 0$ , что в любой проколотой окрестности  $x$  (в множестве  $X$ ) есть точка, значение  $f$  в которой не лежит в  $\varepsilon$ -окрестности. Рассмотрев любую такую проколотую окрестность  $I_0 = V_{\delta_0}(x)$ , берём в ней любую такую точку  $x_0$ . Далее рассмотрев  $I_1 = V_{\delta_1}(x)$ , где  $\delta_1 = \min(\delta_0/2, |x - x_0|)$ , берём там любую точку  $x_1$ , где значение  $f$  вылетает вне  $\varepsilon$ -окрестности

$y$ . Так далее строим последовательность  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ , сходящуюся к  $x$ , значения  $f$  в которой не лежат в  $\varepsilon$ -окрестности  $y$ , что означает, что  $\{f(x_n)\}_{n=0}^{\infty}$  не сходится к  $y$ , что означает, что  $f$  не сходится по Гейне в  $x$  к значению  $y$ .

2. Пусть функция  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  не сходится по Гейне в  $x$  к значению  $y$ . Значит есть последовательность  $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ , сходящаяся к  $x$ , что последовательность её значений не сходится к  $y$ . Значит есть  $\varepsilon > 0$ , что после любого момента в последовательности будет член, значение в котором вылезает вне  $\varepsilon$ -окрестности  $y$ . Поскольку для любой проколотой окрестности  $x$  есть момент, начиная с которого вся последовательность лежит в этой окрестности, то в любой проколотой окрестности  $x$  есть член, значение которого вылезает вне  $\varepsilon$ -окрестности  $y$ , что означает, что  $f$  не сходится по Коши в  $x$  к  $y$ .

□

**Утверждение 20.** Функция  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  имеет в  $x$  предел тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in V_\delta(x) \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

**Доказательство.** Такое же как для последовательностей: см. теорему 4.

□

**Утверждение 21.** Для функций  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  и  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  верно, что

1.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x)$
2.  $\lim_{x \rightarrow a} (-f)(x) = -\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
3.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x)$
4.  $\frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f}\right)(x)$  (если  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$ )
5.  $\lim_{y \rightarrow \lim_{x \rightarrow a} g(x)} f(y) = \lim_{x \rightarrow a} (f \circ g)(x)$

и всегда, когда определена левая сторона определена, правая тоже определена.

**Замечание 3.** Утверждения 6, 7 и 8 верны, если заменить последовательности на функции, пределы последовательностей на пределы функций в некоторой точке  $x$ , а асимптотические неравенства на неравенства на окрестности  $x$ .

**Определение 19.** Верхним пределом функции  $f$  в точке  $x_0$  называется

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \inf_{\delta > 0} \left( \sup_{V_\delta(x_0)} f \right)$$

Нижним пределом функции  $f$  в точке  $x_0$  называется

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \sup_{\delta > 0} \left( \inf_{V_\delta(x_0)} f \right)$$

**Утверждение 22.** Функция  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  имеет в  $x$  предел тогда и только тогда, когда  $\overline{\lim}_{t \rightarrow x} f(t) = \underline{\lim}_{t \rightarrow x} f(t)$ .

**Определение 20.** Функция  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  называется непрерывной в точке  $x$ , если  $\lim_{t \rightarrow x} f(t) = f(x)$ . В изолированных точках  $f$  всегда непрерывна.

**Определение 21.** Функция  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  называется *непрерывной на множестве*  $Y \subseteq X$ , если она непрерывна во всех точках  $Y$ .

**Утверждение 23.** Для непрерывных на  $X$  функций  $f$  и  $g$  верно, что

- $f + g$  непрерывна на  $X$ ;
- $fg$  непрерывна на  $X$ ;
- $\frac{1}{f}$  непрерывна на  $X$  (если  $f \neq 0$ ).

**Утверждение 24.** Для  $f$ , непрерывной в  $x_0$ , и  $g$ , непрерывной в  $f(x_0)$ ,  $g \circ f$  непрерывна в  $x_0$ .

**Теорема 25** (Вейерштрасса). Непрерывная функция на компакте ограничена на нём и принимает на нём свои минимум и максимум.

**Доказательство.** Докажем утверждение для ограниченности сверху и максимума; для ограниченности снизу и минимума рассуждения аналогичны.

Пусть множество неограниченно сверху. Тогда есть  $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ , что  $\{f(x_n)\}_{n=0}^\infty \rightarrow +\infty$ . Тогда рассмотрим подпоследовательность  $\{y_n\}_{n=0}^\infty$  последовательности  $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ , сходящуюся к  $y$ . Тогда

$$f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = +\infty$$

— противоречие.

Тогда существует последовательность  $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ , что  $\{f(x_n)\}_{n=0}^\infty$  сходится к супремуму  $S$  функции. Рассмотрим подпоследовательность  $\{y_n\}_{n=0}^\infty$  последовательности  $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ , сходящуюся к  $y$ . Тогда

$$f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = S$$

□

**Следствие 25.1.** Так как отрезок компактен, то любая непрерывная на нём функция ограничена и принимает на нём свои максимум и минимум.

**Теорема 26** (о промежуточном значении). Пусть  $f$  непрерывна на  $[a; b]$ , а  $f(a) < f(b)$ . Тогда  $\forall y \in [f(a); f(b)]$  найдётся  $c \in [a; b]$ , что  $f(c) = y$ .

**Доказательство.** Рассмотрим последовательность  $\{(a_n; b_n)\}_{n=0}^\infty$ , что  $(a; b) = (a_0; b_0)$ , а следующие пары определяются так: если  $f(\frac{a_n+b_n}{2}) < y$ , то  $(a_{n+1}; b_{n+1}) = (\frac{a_n+b_n}{2}; b_n)$ , иначе  $(a_{n+1}; b_{n+1}) = (a_n; \frac{a_n+b_n}{2})$ . Тогда  $c = \lim\{a_n\}_{n=0}^\infty = \lim\{b_n\}_{n=0}^\infty$ . Тогда

$$f(c) = \lim\{f(a_n)\}_{n=0}^\infty = \lim\{f(b_n)\}_{n=0}^\infty,$$

откуда получаем, что  $f(c) \geq y$  и  $f(c) \leq y$ , т.е.  $f(c) = y$ .

□

**Определение 22.** Функция  $f$  *равномерно непрерывна* на  $X$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in X \quad f(U_\delta(x)) \subseteq U_\varepsilon(f(x))$$

**Теорема 27** (Кантор). Непрерывная на компакте функция равномерно непрерывна.

**Доказательство.** Предположим противное. Тогда

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \exists x, y : |x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| > \varepsilon$$

Тогда рассмотрим последовательность пар  $x$  и  $y$  построенных так для  $\delta$ , сходящихся к 0. Из неё выделим подпоследовательность, что  $x$  сходится к некоторому  $a$ . Тогда  $y$  сойдутся к нему же. Тогда в любой окрестности  $a$  будет пара точек  $(x'; y')$ , что  $|f(x') - f(y')| > \varepsilon$ , значит будет в любой окрестности  $x$  будет точка, выбивающаяся из  $\varepsilon/2$ -окрестности — противоречие с непрерывностью.

□

**Определение 23.** Пусть есть функции  $f$  и  $g$ , что  $|f| \leq C|g|$  в окрестности  $x$  для некоторого  $C \in \mathbb{R}$ , тогда пишут, что  $f = O(g)$  (при  $t \rightarrow x$ ).

Если же  $\forall \varepsilon > 0$  будет такая окрестность  $x_0$ , что  $|f| \leq \varepsilon|g|$  в этой окрестности, тогда пишут, что  $f = o(g)$  (при  $t \rightarrow x$ ).

## 2.4 Гладкость (дифференцируемость)

**Определение 24.** Функция  $f$  называется *гладкой (дифференцируемой)* в  $x$ , если  $f(x + \delta) = f(x) + A\delta + o(\delta)$  для некоторого  $A \in \mathbb{R}$ . В таком случае  $A$  называется *дифференциалом (производной)*  $f$  в точке  $x$ .

Обозначение:  $f'(x) = A$ .

**Определение 25.** Функция  $f$  называется *гладкой (дифференцируемой)* в  $x$ , если предел

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f(x + \delta) - f(x)}{\delta}$$

определён. В таком случае его значение называется *дифференциалом (производной)*  $f$  в точке  $x$ .

**Утверждение 28.** Определения 24 и 25 равносильны.

**Утверждение 29.** Непрерывная в некоторой точке функция там же непрерывна.

**Определение 26.** Функция, значения которой равны производным функции  $f$  в тех же точках называется *производной функцией* (или просто *производной*) функции  $f$ . Обозначение:  $f'$ .

**Лемма 30.** Для дифференцируемых в  $x$  функций  $f$  и  $g$

1.  $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$ ;
2.  $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$  (правило Лейбница);
3.  $(\frac{1}{f})'(x) = \frac{-f'(x)}{f(x)^2}$ ;
4.  $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ .

**Лемма 31.** Пусть дана  $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$  — непрерывная монотонно возрастающая (убывающая) функция. Тогда существует  $g : [f(a); f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$  — непрерывная монотонно возрастающая (убывающая) функция, что  $g \circ f = Id$ .

**Доказательство.** Заметим, что  $f$  — монотонно возрастающая (убывающая) биекция из  $[a; b]$  в  $[f(a); f(b)]$ . Тогда существует монотонно возрастающая (убывающая) биекция  $g : [f(a); f(b)] \rightarrow [a; b]$ , что  $g \circ f = id$ . Осталось показать, что  $g$  непрерывна.

Предположим противное, тогда в любой окрестности некоторой точки  $f(x)$  из  $[f(a); f(b)]$  есть точки вылетающие вне  $\varepsilon$ -окрестности. Значит все точки из либо  $(x - \varepsilon; x)$ , либо  $(x; x + \varepsilon)$  не принимаются, значит  $g$  не биекция — противоречие. Значит  $g$  непрерывна.  $\square$

**Лемма 32.**

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

**Доказательство.** Пусть  $g := f^{-1}$ . Тогда

$$1 = Id' = (f \circ g)' = f' \circ g \cdot g'$$

Откуда следует, что

$$(f^{-1})' = g' = \frac{1}{f' \circ g} = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

□

**Определение 27.** Функция  $f$  *возрастает в точке  $y$* , если есть  $\varepsilon > 0$ , что  $f(x) \leq f(y)$  для любого  $x \in (y - \varepsilon; y)$  и  $f(x) \geq f(y)$  для любого  $x \in (y; y + \varepsilon)$ .

Аналогично определяется убываемость функции в точке.

**Лемма 33.** Если  $f$  *возрастает в любой точке на  $[a; b]$* , то  $f(a) \leq f(b)$ .

**Доказательство.**

1. Можно рассмотреть для каждой точки  $[a; b]$  окрестность, для которой верна её возрастательность, и из покрытия, ими образуемого, выделить конечное. А тогда перебираясь между общими точками окрестностей, получим искомое.
2. Также можно предположить противное, рассмотреть последовательность вложенных отрезков, у которых левый конец выше правого, и тогда для точки пересечения отрезков будет противоречие.

□

**Следствие 33.1.**  $f$  *возрастает на всём отрезке.*

**Теорема 34.** Если  $f$  *гладка, а  $f'$  положительна на  $[a; b]$* , то  $f$  *строго возрастает на  $[a; b]$* .

**Доказательство.** Несложно видеть, что в любой точке на  $[a; b]$  у функции есть окрестность, где она строго возрастает, так как если  $t \in [a; b]$ , а  $f'(t) = \lambda > 0$ , то в некоторой окрестности

$$\frac{f(x) - f(t)}{x - t} \in (0; 2\lambda) \quad \implies \quad f(x) \in (f(t); f(t) + 2\lambda(x - t))$$

что значит, что эта окрестность — подтверждение для возрастания  $f$  в  $t$ . Тогда по предыдущему следствию  $f$  возрастает на  $[a; b]$ . Если вдруг функция возрастает не строго, то тогда найдётся подотрезок на  $[a; b]$ , на котором функция константа, а значит на интервале с теми же концами производная тождественна равна нулю.

□

**Теорема 35.** Если  $f$  *возрастает, то  $f'$  в своей области определения неотрицательно.*

**Доказательство.** Если функция в точке  $t$  равна  $\lambda < 0$ , то в некоторой окрестности  $t$

$$\frac{f(x) - f(t)}{x - t} \in \left(\frac{3}{2}\lambda; \frac{1}{2}\lambda\right) \quad \implies \quad f(x) \in \left(f(t) + \frac{3}{2}\lambda(x - t); f(t) + \frac{1}{2}\lambda(x - t)\right)$$

что значит, что  $f$  в точке  $t$  "строго" убывает — противоречие. Значит  $f'(t) \geq 0$ .

□

**Определение 28.**  $f$  *имеет локальный максимум в  $x$* , если для некоторого  $\varepsilon > 0$  верно, что  $f(x) \geq f(y)$  для любого  $y \in (x - \varepsilon; x + \varepsilon)$ .

Аналогично определяется точка локального минимума.

**Теорема 36.** В точках локальных максимумов и минимумов функции  $f$  функция  $f'$  принимает нули (если определена).

**Доказательство.** Слева от точки максимума функция возрастает в данной точке, значит производная в данной точке  $\geq 0$ , а справа — убывает, значит производная  $\leq 0$ , значит производная равна 0. Аналогично для точки минимума.  $\square$

**Теорема 37** (Ролль). Если  $f$  — гладкая функция на  $[a; b]$ , и  $f(a) = f(b)$ , то существует  $c \in (a; b)$ , что  $f'(c) = 0$ .

**Доказательство.** В точке максимума или минимума  $f$  на  $[a; b]$  достигается ноль производной. Если они обе совпадают с концами отрезка, то значит функция константа, а тогда в любой точке отрезка производная равна нулю.  $\square$

**Теорема 38.** Если  $f$  и  $g$  непрерывные на  $[a; b]$  и гладкие на  $(a; b)$  функции, а  $g' \neq 0$ , то существует  $c \in (a; b)$ , что

$$\frac{f(a) - f(b)}{g(a) - g(b)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

**Доказательство.** Пусть

$$\lambda := \frac{f(a) - f(b)}{g(a) - g(b)}$$

а  $\tau(x) := f(x) - \lambda g(x)$ . В таком случае

$$\frac{\tau(a) - \tau(b)}{g(a) - g(b)} = \frac{(f(a) - f(b) - \lambda(g(a) - g(b)))}{g(a) - g(b)} = \lambda - \lambda = 0$$

значит  $\tau(a) = \tau(b)$ , значит есть  $c \in [a; b]$ , что  $\tau(c) = 0$ . Тогда

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{(\tau + \lambda g)'(c)}{g'(c)} = \frac{\tau'(c)}{g'(c)} + \lambda = \lambda = \frac{f(a) - f(b)}{g(a) - g(b)}$$

$\square$

**Теорема 39** (Лагранж). Если  $f$  непрерывна на  $[a; b]$  и гладка на  $(a; b)$ , то существует  $c \in (a; b)$ , что

$$\frac{f(a) - f(b)}{a - b} = f'(c)$$

**Доказательство.** Очевидно следует из предыдущей теоремы с помощью подстановки  $g(x) = x$ .  $\square$

**Теорема 40.** Пусть  $f$  — гладкая на  $(a; b)$  функция.

1. Если  $f' \geq 0$ , то  $f$  возрастающая функция.
2. Если  $f' > 0$ , то  $f$  строго возрастающая функция.
3. Если  $f$  возрастающая функция, то  $f' > 0$ .

**Теорема 41.** Пусть  $f$  — гладкая на  $[a; b]$  функция. Если  $f'(x) = 0$  для всех  $x \in [a; b]$ , то  $f \equiv \text{const}$  на том же отрезке.

**Замечание 4.** Функция  $f(x) := x^2 \sin(1/x)$  (доопределённая в нуле) имеет производную  $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$  в случае ненулевых  $x$  и производную  $f'(0) = 0$ . При этом легко видно, что  $f'$  не является непрерывной функцией (она имеет разрыв в том же нуле).



**Теорема 42.** Если  $f$  гладка на  $(a; b)$ , а  $f'$  не равна нулю, то  $f'$  либо положительна, либо отрицательна.

**Доказательство.**  $f$  не принимает никакого значения на  $(a; b)$  дважды (т.к. иначе у производной был бы корень), значит она либо строго возрастает, либо строго убывает, а значит  $f'$  либо неотрицательна, либо неположительна соответственно. Но ноль принимать не может, поэтому последнее утверждение равносильно тому, что  $f$  либо строго положительна, либо строго отрицательна.  $\square$

**Теорема 43.** Пусть  $f$  гладка на  $(a; b)$  и для некоторых  $u, v \in (a; b)$  верно, что  $f'(u) < \alpha < f'(v)$ . Тогда существует  $c \in (u; v)$ , что  $f'(c) = \alpha$ .

**Доказательство.** Пусть  $g(x) := f(x) - \alpha x$ . Тогда  $g'(u) < 0 < g'(v)$ , значит  $g$  не может строго возрасть или убывать на  $(u; v)$ , значит  $\exists c \in (u; v)$ , что  $g'(c) = 0$ , а значит  $f'(c) = \alpha$ .  $\square$

*Замечание 5.* Данная теорема по сути является теоремой о промежуточном значении для производной.

**Теорема 44.** Пусть  $f$  непрерывна на  $[a; b)$  и гладка на  $(a; b)$ . Пусть также  $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$  существует и равен  $d$ . Тогда  $f'(a)$  тоже существует и равна  $d$ .

**Доказательство.** Есть несколько способов:

1. Несложно видеть, что для любого  $\varepsilon > 0$  есть некоторая правая окрестность  $a$ , в которой функция  $f'$  лежит в  $\varepsilon$ -окрестности  $d$ . Тогда  $f(x) - (d - \varepsilon)x$  убывает в данной окрестности, а  $f(x) - (d + \varepsilon)x$  возрастает, значит  $f(x) - f(a) \in ((d + \varepsilon)(x - a); (d - \varepsilon)(x - a))$ . В таком случае  $f'(a)$  определена и равна  $d$ .
2. По теореме Лагранжа для любого  $x \in [a; b)$  найдётся  $\xi \in (a; x)$ , что

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\xi)$$

Значит

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(\xi) = d$$

что буквально значит, что  $f'(a) = d$ .  $\square$

**Теорема 45** (правило Лопиталя). Пусть  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$ . Пусть также  $f$  и  $g$  гладки и  $g' \neq 0$  на  $(a; b)$ . Тогда

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

если второй предел определён.

**Доказательство.** Пусть дано  $\varepsilon > 0$ , а

$$d := \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

. Тогда есть  $\delta > 0$ , что для любого  $t \in (a; a + \delta)$  значение  $f'(t)/g'(t)$  лежит в  $U_\varepsilon(d)$ . Легко видеть, что для любых  $x, y \in (a; a + \delta)$  существует  $\xi \in (x; y) \subseteq (a; a + \delta)$ , что

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = f'(\xi) \in U_\varepsilon(d)$$

Устремляя  $x$  к  $a$ , получаем, что  $f(y)/g(y)$  тоже лежит в  $U_\varepsilon(d)$ . Тогда по определению предела

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = d = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

□

**Определение 29.**  $f''$  — вторая производная  $f$ , т.е.  $(f')'$ , а  $f^{(n)}$  —  $n$ -ая производная  $f$ , т.е.  $f^{(n)} := (f^{(n-1)})'$ ,  $f^{(0)} := f$ .

**Определение 30.**  $P(x)$  — полином Тейлора степени  $n$  функции  $f$ , если  $\deg(P) \leq n$ , а

$$f(x) - P(x) = o((x - a)^n), \quad x \rightarrow a$$

**Теорема 46.** Если  $P_1$  и  $P_2$  — полиномы Тейлора степени  $n$  функции  $f$ , то  $P_1 = P_2$ .

**Теорема 47.** Пусть  $f : (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f^{(1)}, \dots, f^{(n-1)}$  определены на  $(t - \delta; t + \delta)$  для некоторого  $\delta > 0$  и определена  $f^{(n)}(t)$ . Тогда для всякого  $x \in U_\delta(t)$

$$f(x) = f(t) + \frac{f^{(1)}(t)}{1!}(x - t) + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x - t)^n + o((x - t)^n)$$

**Доказательство.** Рассмотрим  $g(x) := f(x) - f(t)/0! \cdot (x - t)^0 - \dots - f^{(n)}(t)/n! \cdot (x - t)^n$ . Тогда задача сведена к следующей лемме.

**Лемма 47.1.** Если  $g^{(1)}, \dots, g^{(n-1)}$  определены на  $(t - \delta; t + \delta)$  для некоторого  $\delta > 0$  и

$$g(t) = g^{(1)}(t) = \dots = g^{(n)}(t) = 0.$$

Тогда  $g(x) = o((x - t)^n)$ .

**Доказательство.** Докажем по индукции по  $n$ .

**База.** Пусть  $n = 1$ . Тогда очевидно, что  $f(x) = f(t) + f'(t)(x - t) + o(x - t) = o(x - t)$ .

**Шаг.** По предположению индукции  $f'(x) = o((x - t)^n)$ . Тогда мы имеем, что

$$f(x) - f(t) = f'(\xi)(x - t)$$

для некоторого  $\xi \in (x, t)$ . Тогда

$$\frac{f(x) - f(t)}{(x - t)^n} = \frac{f'(\xi)}{(x - t)^{n-1}} = \frac{o((\xi - t)^{n-1})}{(x - t)^{n-1}} = o(1) \frac{(\xi - t)^{n-1}}{(x - t)^{n-1}} = o(1)$$

□

□

**Теорема 48.** Пусть  $f(t) = f^{(1)}(t) = \dots = f^{(n)}(t) = 0$ , а  $f^{(n+1)} \neq 0$ . Если  $n$  чётно, то  $t$  — не экстремальная точка функции  $f$ , иначе  $t$  — экстремальная точка функции  $f$ .

**Теорема 49.** Пусть  $f : (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f^{(1)}, \dots, f^{(n+1)}$  определены на  $(t - \delta; t + \delta)$  для некоторого  $\delta > 0$ . Тогда для всякого  $x \in U_\delta(t)$  существует  $\xi \in (x, t)$ , что

$$f(x) = f(t) + \frac{f^{(1)}(t)}{1!}(x - t) + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x - t)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!}(x - t)^{n+1}$$

**Доказательство.** Точно так же сведём  $f$  к  $g$ , что  $g(t) = \dots g^{(n)}(t) = 0$ . Тогда требуется показать, что  $g(x) = g^{(n+1)}(\xi)/(n + 1)! \cdot (x - t)^{n+1}$  для некоторого  $\xi \in (x, t)$ . Докажем это по индукции.

**База.**  $n = 0$ . Теорема Лагранжа.

**Шаг.**

$$\frac{f(x)}{(x - t)^{n+1}} = \frac{f(x) - f(t)}{(x - t)^{n+1} - (t - t)^{n+1}} = \frac{f'(\xi)}{(n + 1)(\xi - t)^n} = \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n + 1)!}$$

где  $\xi \in (x, t)$  (существует по теореме Лагранжа), а  $\eta \in (\xi, t) \subseteq (x, t)$  (существует по предположению индукции для  $f'$  и  $\xi$ ). Отсюда следует искомое утверждение. □

## 2.5 Стандартные функции, ряды Тейлора и их сходимость

Тут нужно рассказать про функции  $\exp$ ,  $\sin$ ,  $\cos$  и  $(1+x)^\alpha$  и их ряды

**Определение 31.**  $f$  является (поточечным) пределом  $\{f_n\}_{n=0}^\infty$  на  $E$ , если  $\lim\{f_n(x)\}_{n=0}^\infty = f(x)$  для любого  $x \in E$ .

**Определение 32.**  $f$  является равномерным пределом  $\{f_n\}_{n=0}^\infty$  на  $E$ , если для любого  $\varepsilon > 0$  найдётся  $N \in \mathbb{N}$ , что  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$  для всех  $n > N$  и  $x \in E$ .

**Теорема 50** (Стокс, Зейдель). Пусть  $\{f_n\}_{n=0}^\infty$  — последовательность непрерывных функций, и  $f_n \rightarrow f$  равномерно на  $E$ . Тогда  $f$  непрерывна.

**Доказательство.** Для любого  $\varepsilon > 0$  есть такое  $n \in \mathbb{N}$ , что  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3$  для всех  $x \in E$ . Тогда существует  $\delta > 0$ , что  $f_n(U_\delta(t)) \subseteq U_{\varepsilon/3}(f_n(t))$  для данного  $t$ . Тогда

$$f(U_\delta(t)) \subseteq U_{\varepsilon/3}(f_n(U_\delta(t))) \subseteq U_{2\varepsilon/3}(f_n(t)) \subseteq U_\varepsilon(f(t)).$$

□

**Теорема 51** (Коши). TFAE (the following are equivalent):

1.  $f_n \rightarrow f$  равномерно сходится на  $E$ .
2. Для любого  $\varepsilon > 0$  существует  $N \in \mathbb{N}$ , что  $|f_k(x) - f_l(x)| < \varepsilon$  для любых  $k, l > N$  и  $x \in E$ .

**Теорема 52** (Вейерштрасс). Пусть  $\{u_n\}_{n=0}^\infty$  — последовательность непрерывных функций, что есть последовательность чисел  $\{d_n\}_{n=0}^\infty$ , для которой верно, что  $|u_n| < d_n$  для всех  $n \in \mathbb{N}$ , и  $\sum_{n=0}^\infty d_n$  сходится. Тогда  $\sum_{n=0}^\infty u_n$  равномерно сходится.

**Теорема 53.** Пусть  $f_n \rightarrow f$  на  $E$  и  $\{f_n\}_{n=0}^\infty$  гладкие. Если  $f'_n \rightarrow g$  равномерно, то  $f$  тогда тоже гладка и  $f' = g$ .

**Доказательство.** Для любого  $\varepsilon > 0$  существует  $N \in \mathbb{N}$ , что  $|f'_k - f'_l| < \varepsilon/3$  для всех  $k, l > N$ . Тогда имеем, что

$$\left| \frac{f_k(x) - f_k(y)}{x - y} - \frac{f_l(x) - f_l(y)}{x - y} \right| = \left| \frac{(f_k - f_l)(x) - (f_k - f_l)(y)}{x - y} \right| = |(f_k - f_l)'(\xi)| < \varepsilon/3$$

Устремляя  $l$  к бесконечности получаем, что

$$\left| \frac{f_k(x) - f_k(y)}{x - y} - \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq \varepsilon/3$$

Также имеем, что есть такое  $\delta > 0$ , что для всех  $y \in U_\delta(x)$

$$\left| \frac{f_k(x) - f_k(y)}{x - y} - f'_k(x) \right| < \varepsilon/3$$

Также есть  $M \in \mathbb{N}$ , что  $|f'_k - g| < \varepsilon/3$  для любого  $k > M$ . Складывая всё вместе, получаем, что для всех  $k > \max(N, M)$  и  $y \in U_\delta(x)$

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} - g(x) \right| < \varepsilon$$

Значит  $f$  гладка и  $f' = g$ .

□

**Следствие 53.1.** Если  $\{f^{(0)}\}, \dots, \{f^{(n-1)}\}$  сходятся, а  $f^{(n)}$  равномерно сходится. Тогда то же верно и про первые  $n$  производных.

**Следствие 53.2.** Если ряд Тейлора сходится, то функция бесконечно гладкая.

### 3 Примеры и контрпримеры

#### Название раздела?

**Теорема 54.** Существует непрерывная функция  $f$  на отрезке  $[a; b]$ , которая не имеет производной ни в какой точке на отрезке  $[a; b]$

**Доказательство.** Можно привести примеры данной функции  $f$ .

1. (функция Вейерштрасса) Определим

$$f_0(x) := \frac{1}{2} - \left| x - [x] - \frac{1}{2} \right| \quad f_n(x) := \frac{f_0(4^n x)}{4^n} \quad f(x) := \sum_{i=0}^{\infty} f_i(x)$$

Поскольку  $|f_n| = 1/4^n$ , а  $\sum_{i=0}^{\infty} 1/4^i$  сходится, то по теореме Вейерштрасса ряд равномерно сходится к  $f$ , а поскольку каждая  $f_n$  непрерывна, то по теореме Стокса-Зейделя функция  $f$  непрерывна. Теперь осталось показать, что у  $f$  нет производных.

Пусть  $a$  — произвольная точка из  $\mathbb{R}$ . Заметим, что для всяких  $m$  и  $n$ , что  $m \geq n$ , период  $f_m$  равен  $1/4^m$ , значит  $1/4^m \mid 1/4^n$ , а тогда  $f_m(a \pm 1/4^n) = f_m(a)$ . Значит для всякого  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

$$f(a \pm 1/4^n) - f(a) = \sum_{i=0}^{n-1} f_i(a \pm 1/4^n) - f_i(a)$$

Заметим, что  $a$  находится на отрезке монотонности функции  $f_{n-1}$  длины  $1/(2 \cdot 4^{n-1}) = 2/4^n$ , который также является отрезком монотонности каждой функции из  $f_0, \dots, f_{n-2}$ . Поскольку  $1/4^n$  в два раза меньше, то либо  $a + 1/4^n$ , либо  $a - 1/4^n$  лежит на том же отрезке монотонности; пусть это будет точка  $b_n$ . Тогда имеем, что

$$\left| \frac{f_0(b_n) - f_0(a)}{b_n - a} \right| = \left| \frac{f_1(b_n) - f_1(a)}{b_n - a} \right| = \dots = \left| \frac{f_{n-1}(b_n) - f_{n-1}(a)}{b_n - a} \right| = 1$$

Следовательно

$$\frac{f(b_n) - f(a)}{b_n - a} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f_i(b_n) - f_i(a)}{b_n - a} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f_i(b_n) - f_i(a)}{b_n - a}$$

— целое число, совпадающее по чётности с  $n$ . Если  $f'(a)$  определено, то  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  сходится, а значит должен сойтись и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a)}{b_n - a};$$

но это последовательность целых значений, значит с какого-то момента она должна быть тождественно равна 0, но это не так, так как нечётных членов бесконечно много в этой последовательности.

2. (пример Глеба Минаева) Рассмотрим  $f_0(x) := x$ . Представим её как бесконечную ломанную  $\dots \leftrightarrow (-2, -2) \leftrightarrow (-1, -1) \leftrightarrow (0, 0) \leftrightarrow (1, 1) \leftrightarrow (2, 2) \leftrightarrow \dots$ . Далее будем получать  $f_{n+1}$  из  $f_n$  следующим образом.

$f_n$  будет некоторой бесконечной в обе стороны ломанной, при этом всегда  $f_n(x) = f_n(x+1)$ . Следующая функция будет получаться заменой ребра  $(a_1, b_1) \leftrightarrow (a_2, b_2)$  на три ребра:

$$(a_1, b_1) \longleftrightarrow \left( \frac{a_1 + 2a_2}{3}, \frac{2b_1 + b_2}{3} \right) \longleftrightarrow \left( \frac{2a_1 + a_2}{3}, \frac{b_1 + 2b_2}{3} \right) \longleftrightarrow (a_2, b_2)$$

Так мы получим  $f_{n+1}$ . Рассматриваемой же функцией будет  $f := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ .

Несложно видеть, что звено высоты  $h$  каждый раз заменяется на три ребра: два высоты  $2h/3$  и одно высоты  $h/3$ . При этом описанный прямоугольник любого ребра содержит описанные прямоугольники рёбер, на которые он был заменён, а значит, окажется точка на ребре, из его описанного прямоугольника больше не вылезет. Таким образом после функции  $f_n$  разброс положений  $f_i(x)$  не более  $1/3^n$ , поэтому поточечный предел определён.

При этом значения в точках  $k/3^m$  с некоторого момента неподвижны: после функции  $f_n$  значения во всех точках  $k/3^n$  не меняются. Таким образом мы имеем, что во всякой окрестности будут точки вида  $k/3^n$ ,  $(3k+1)/3^{n+1}$ ,  $(3k+2)/3^{n+1}$  и  $(k+1)/3^n$ , а они ломают монотонность функции на данном интервале. Таким образом  $f$  нигде не монотонна.

Также предположим в точке  $a$  есть производная. Рассмотрим для каждого  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  пару  $(p_n, q_n)$ , что  $p_n$  и  $q_n$  — абсциссы концов звена на котором лежит  $(a, f_n(a))$  в ломаной функции  $f_n$  ( $q_n > p_n$ ). Тогда заметим, что  $q_n - p_n = 1/3^n$ ,  $f_n(p_n) = f(p_n)$ ,  $f_n(q_n) = f(q_n)$ , а тогда

$$\frac{f_n(q_n) - f_n(p_n)}{q_n - p_n} = \frac{f(q_n) - f(p_n)}{q_n - p_n} = \frac{f(q_n) - f(a)}{q_n - a} \cdot \frac{q_n - a}{q_n - p_n} + \frac{f(a) - f(p_n)}{a - p_n} \cdot \frac{a - p_n}{q_n - p_n}$$

Следовательно значение  $\frac{f_n(q_n) - f_n(p_n)}{q_n - p_n}$  лежит на отрезке между  $\frac{f(q_n) - f(a)}{q_n - a}$  и  $\frac{f(p_n) - f(a)}{p_n - a}$ ; при этом оно является коэффициентом наклона звена  $(p_n, f(p_n)) \leftrightarrow (q_n, f(q_n))$ .

Заметим, что звено  $(p_n, f(p_n)) \leftrightarrow (q_n, f(q_n))$  будет заменено на три, среди которых будет и  $(p_{n+1}, f(p_{n+1})) \leftrightarrow (q_{n+1}, f(q_{n+1}))$ . Значит коэффициент наклона  $(p_{n+1}, f(p_{n+1})) \leftrightarrow (q_{n+1}, f(q_{n+1}))$  можно получить из коэффициента наклона  $(p_n, f(p_n)) \leftrightarrow (q_n, f(q_n))$  домножением либо на 2, либо на  $-1$ .

Таким образом мы имеем, что последовательность

$$\left( \frac{f_n(q_n) - f_n(p_n)}{q_n - p_n} \right)_{n=0}^{\infty}$$

либо расходится по модулю, либо с некоторого момента не меняет модуль, но знакоперебегается. При этом если  $f'(a)$  определена, то в некоторой окрестности  $a$  значение

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

несильно отличается от  $f'(a)$  (чем меньше окрестность, тем меньше отличается). Но если мы будем рассматривать точки  $p_n$  и  $q_n$ , то для одной из них (обозначим её за  $x_n$ ) верно, что

$$\left| \frac{f(x_n) - f(a)}{x_n - a} \right| \geq \left| \frac{f_n(q_n) - f_n(p_n)}{q_n - p_n} \right| \quad \text{sign} \left( \frac{f(x_n) - f(a)}{x_n - a} \right) = \text{sign} \left( \frac{f_n(q_n) - f_n(p_n)}{q_n - p_n} \right)$$

Тогда про последовательность

$$\left( \frac{f_n(x_n) - f_n(a)}{x_n - a} \right)_{n=0}^{\infty}$$

с одной стороны можно сказать, что она сходится к  $f'(a)$  (т.к.  $|p_n - a|$  и  $|q_n - a|$  не более  $1/3^n$ , а следовательно и  $|x_n - a|$ ); с другой же стороны эта последовательность либо неограниченно растёт по модулю, либо с некоторого момента знакоперебегает, а значит навряд ли сходится — противоречие. Значит ни в какой точке  $f'$  не определена.

□

## 4 Интегрирование

### 4.1 Первообразная

**Определение 33.**  $g$  — первообразная функции  $f$ , если на области определения  $f$  верно, что  $g' = f$ .

**Теорема 55.** Если  $g_1$  и  $g_2$  — первообразные  $f$  на отрезке  $[a; b]$ , то  $g_1 - g_2 = \text{const}$  на том же отрезке.

**Доказательство.** Очевидно, что  $(g_1 - g_2)' = f' - f' = 0$  на отрезке  $[a; b]$ . Если  $g_1 - g_2$  не константна, то есть две точки на отрезке  $[a; b]$ , в которых принимаются разные значения, а тогда по теореме Лагранжа будет точка строго между ними (а значит и на отрезке), где производная не равна нулю — противоречие. Следовательно  $g_1 - g_2$  является константой. □

*Замечание 6.* Для несвязного множества утверждение неверно. Например, если областью определения  $f$  будут два отрезка, то  $g_1 - g_2$  будет константной на каждом отрезке, но константы могут быть различны.

**Определение 34.** Семейство первообразных функции  $f$  обозначается как

$$\int f$$

**Определение 35.** Линейная форма — линейная однородная функция ( $f(x) = \alpha x$ ).

**Лемма 56.**

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1.  | $\int 0 = \{f \equiv C \mid C \in \mathbb{R}\}$                | 5. | $\int e^x = e^x + C$                           |
| 2.  | $\int a_0 + \dots + a_n x^n = C + a_0 x + \dots + a_n x^{n+1}$ | 6. | $\int \sin(x) = -\cos(x) + C$                  |
| 3. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, x > 0$ | $\int x^\alpha = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$            |    | $\int \cos(x) = \sin(x) + C$                   |
| 4. $\forall x > 0$  | $\int \frac{1}{x} = \log(x) + C$                               | 7. | $\int \frac{1}{1+x^2} = \arctan(x) + C$        |
|   |  | 8. | $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin(x) + C$ |

**Теорема 57.**

1.

$$\int \alpha f = \alpha \int f + C$$

3.

$$\int f dg = fg - \int g df$$

2.

$$\int f + g = \int f + \int g$$

4.

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \left(\int f\right) \circ \varphi$$

**Доказательство.**

1. Продифференцируем обе части:

$$\left(\int \alpha f\right)' = \alpha f = \alpha \left(\int f\right)' = \left(\alpha \int f\right)'$$

Таким образом обе стороны отличаются на константу: её корректность гарантирует  $+C$ .

2. Продифференцируем обе части:

$$\left(\int f + g\right)' = f + g = \left(\int f\right)' + \left(\int g'\right) = \left(\int f + \int g\right)'$$

Таким образом обе стороны отличаются на константу; эта константа поглощается первообразными слева и справа (так как это семейства функций).

3. Продифференцируем обе части:

$$\left(\int f dg\right)' = f \cdot g' = (fg)' - g \cdot f' = \left(fg - \int g df\right)'$$

Таким образом обе стороны отличаются на константу; эта константа поглощается первообразными слева и справа (так как это семейства функций).

4. Продифференцируем обе части:

$$\left(\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx\right)' = (f \circ \varphi) \cdot \varphi' = \left(\left(\int f\right) \circ \varphi\right)'$$

Таким образом обе стороны отличаются на константу; эта константа поглощается первообразными слева и справа (так как это семейства функций).

□

## 4.2 Суммы Дарбу и интеграл Римана

**Определение 36.** Разбиение отрезка  $[a; b]$  — такое семейство  $\Sigma := \{I_k\}_{k=1}^n$  отрезков (ненулевой длины), что  $[a; b] = \bigcup_{k=1}^n I_k$ , и все отрезки из  $\Sigma$  попарно пересекаются не более, чем по одной точке.

Пусть дана функция  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ , где  $E \supseteq [a; b]$ , и некоторое разбиение  $\Sigma$  отрезка  $[a; b]$ . Тогда верхняя и нижняя суммы Дарбу функции  $f$  при разбиении  $\Sigma$  есть выражения

$$S^+(f, \Sigma) := \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_{x \in I} f(x)$$

$$S^-(f, \Sigma) := \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \inf_{x \in I} f(x)$$

соответственно. (При этом  $\sup$  и  $\inf$  могут принимать значения  $+\infty$  и  $-\infty$  соответственно; и в таких случаях соответствующие суммы Дарбу тоже будут принимать значения  $\pm\infty$ .)

Пример 2.

- Пусть  $f(x) := x^\alpha$ ,  $\alpha > 0$ ,  $[a; b] := [0; 1]$ , а  $\Sigma := \{[\frac{k-1}{n}; \frac{k}{n}]\}_{k=1}^n$ . Тогда

$$S^+(f, \Sigma) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_{x \in I} f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{\sum_{k=1}^n k^\alpha}{n^{\alpha+1}}$$

$$S^-(f, \Sigma) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \inf_{x \in I} f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \cdot f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{\sum_{k=1}^{n-1} k^\alpha}{n^{\alpha+1}}$$

- Пусть  $f$  — функция Дирихле, отрезок  $[a; b]$  — любой, и его разбиение  $\Sigma$  — любое. Тогда

$$S^+(f, \Sigma) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_{x \in I} f(x) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot 1 = b - a$$

$$S^-(f, \Sigma) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \inf_{x \in I} f(x) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot 0 = 0$$

**Лемма 58.** Пусть даны функция  $f$ , отрезка  $[a; b]$  и его разбиение  $\Sigma$ . Назовём его подразбиением семейство отрезков  $\Sigma'$ , которое является объединением разбиений отрезков из  $\Sigma$  (иначе говоря, множество концов отрезков  $\Sigma$  является подмножеством концов отрезков  $\Sigma'$ ). Тогда верны неравенства

$$S^+(f, \Sigma) \geq S^+(f, \Sigma') \quad S^-(f, \Sigma) \leq S^-(f, \Sigma')$$

**Доказательство.** Покажем это для верхних сумм Дарбу; для нижних доказательство аналогично.

Пусть  $\{\Lambda_I\}_{I \in \Sigma}$  — набор разбиений каждого отрезка  $I$  из  $\Sigma$ , что  $\Sigma' = \bigcup_{I \in \Sigma} \Lambda_I$ . Тогда мы имеем, что для всяких  $I \in \Sigma$  и  $J \in \Lambda_I$  верно, что

$$\sup_{x \in I} f(x) \geq \sup_{x \in J} f(x)$$

Следовательно

$$\sum_{J \in \Lambda_I} |J| \cdot \sup_{x \in J} f(x) \leq \sum_{J \in \Lambda_I} |J| \cdot \sup_{x \in I} f(x) = \left( \sum_{J \in \Lambda_I} |J| \right) \cdot \sup_{x \in I} f(x) = |I| \cdot \sup_{x \in I} f(x)$$

Значит, суммируя обе части по  $\Sigma$ , получаем, что

$$S^+(f, \Sigma') = \sum_{J \in \Sigma'} |J| \cdot \sup_{x \in J} f(x) = \sum_{I \in \Sigma} \sum_{J \in \Lambda_I} |J| \cdot \sup_{x \in J} f(x) \leq \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_{x \in I} f(x) = S^+(f, \Sigma)$$

□

**Лемма 59.** Пусть даны функция  $f$ , отрезок  $[a; b]$ , его разбиения  $\Sigma_1$  и  $\Sigma_2$ . Тогда

$$S^+(f, \Sigma_1) \geq S^-(f, \Sigma_2)$$

**Доказательство.** Рассмотрим

$$\Sigma := \{I \cap J \mid I \in \Sigma_1 \wedge J \in \Sigma_2 \wedge |I \cap J| > 1\}$$

— (минимальное) подразбиение  $\Sigma_1$  и  $\Sigma_2$ . Тогда верно, что

$$S^+(f, \Sigma_1) \geq S^+(f, \Sigma) \geq S^-(f, \Sigma) \geq S^-(f, \Sigma_2)$$

□



**Следствие 59.1.** Пусть фиксированы функция  $f$  и отрезок  $[a; b]$ . Рассмотрим множества

$$D^+ := \{S^+(f, \Sigma) \mid \Sigma - \text{разбиение } [a; b]\} \quad D^- := \{S^-(f, \Sigma) \mid \Sigma - \text{разбиение } [a; b]\}$$

Тогда  $D^+ \geq D^-$ .

**Определение 37.** Пусть фиксированы функция  $f$  и отрезок  $[a; b]$ , разбиения которого рассматриваются. Если

$$\sup_{\Sigma} S^-(f, \Sigma) = \inf_{\Sigma} S^+(f, \Sigma) = S,$$

то тогда  $f$  называется *интегрируемой по Риману*, а  $S$  называют *интегралом Римана функции  $f$  на отрезке  $[a; b]$* . Обозначение:

$$\int_a^b f(x)dx := S$$

**Лемма 60.** Пусть даны функция  $f$  и отрезок  $[a; b]$ . Тогда если для всякого  $\varepsilon > 0$  есть разбиение  $\Sigma$  отрезка  $[a; b]$ , что

$$\forall I \in \Sigma \quad \text{osc}_I f < \varepsilon$$

то  $f$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$ .

**Доказательство.** Обозначим для каждого такого  $\varepsilon$  разбиение из условия за  $\Sigma_\varepsilon$ . Тогда мы имеем, что

$$S^+(f, \Sigma_\varepsilon) - S^-(f, \Sigma_\varepsilon) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot (\sup_I f - \inf_I f) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \text{osc}_I f < \varepsilon \cdot \sum_{I \in \Sigma} |I| = \varepsilon \cdot (b - a)$$

Т.е. для всякого  $\varepsilon > 0$  верно, что

$$\inf_{\Sigma} S^+(f, \Sigma) - \sup_{\Sigma} S^-(f, \Sigma) \leq S^+(f, \Sigma_{\varepsilon/(b-a)}) - S^-(f, \Sigma_{\varepsilon/(b-a)}) < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon$$

Следовательно

$$\inf_{\Sigma} S^+(f, \Sigma) = \sup_{\Sigma} S^-(f, \Sigma),$$

что значит, что  $f$  интегрируема по Риману. □

**Лемма 61.** Пусть даны функция  $f$  и отрезок  $[a; b]$ . Тогда  $f$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$  тогда и только тогда, когда для всякого  $\varepsilon > 0$  существует  $\delta > 0$ , что для всякого разбиения  $\Sigma$  отрезка  $[a; b]$ , где  $\forall I \in \Sigma \ |I| < \delta$ , верно, что

$$\sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \text{osc}_I f < \varepsilon$$

**Доказательство.**

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $f$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$ . Тогда для всякого  $\varepsilon > 0$  есть разбиения  $\Sigma_1$  и  $\Sigma_2$  отрезка  $[a; b]$ , что

$$\{S^+(f, \Sigma_1); S^-(f, \Sigma_2)\} \subseteq U_{\varepsilon/4} \left( \int_a^b f(x)dx \right)$$

Пусть  $\Sigma$  — общее подразбиение  $\Sigma_1$  и  $\Sigma_2$  (например, минимальное). Тогда

$$S^+(f, \Sigma_1) \geq S^+(f, \Sigma) \geq S^-(f, \Sigma) \geq S^-(f, \Sigma_2)$$

Следовательно,

$$\{S^+(f, \Sigma); S^-(f, \Sigma)\} \subseteq U_{\varepsilon/4} \left( \int_a^b f(x) dx \right)$$

Заметим, что в таком случае  $\sup_{[a;b]} f$  и  $\inf_{[a;b]} f$  ограничены (равны вещественным значениям, а не  $\pm\infty$ ). Поэтому  $A := \text{osc}_{[a;b]} f$  является вещественной величиной. Определим также  $L := \min_{\Sigma} |I|$ .

Пусть  $\Lambda$  — некоторое разбиение  $[a; b]$ , что длина всякого отрезка не больше  $L \cdot \alpha$ , где

$$\alpha := \min \left( 1, \frac{\varepsilon \cdot |\Sigma|}{2 \cdot A \cdot L} \right) \in (0; 1].$$

Тогда мы имеем, что всякий отрезок  $I$  из  $\Lambda$  либо является подотрезком некоторого отрезка  $J_I$  из  $\Sigma$  (обозначим множество таких  $I$  за  $\Gamma$ ), либо является подотрезком объединения двух соседних отрезков  $K_1$  и  $K_2$  из  $\Sigma$  и содержит их общую границу (обозначим множество таких  $I$  за  $\Theta$ ). В случае  $I$  и  $J$  мы имеем, что  $\text{osc}_I f \leq \text{osc}_J f$ ; в случае  $I$ ,  $K_1$  и  $K_2$  мы имеем, что  $\text{osc}_I f \leq \text{osc}_{K_1 \cup K_2} f \leq A$ . Следовательно, используя только что оговоренные оценки,

$$\begin{aligned} \sum_{I \in \Lambda} |I| \cdot \text{osc}_I f &= \sum_{I \in \Gamma} |I| \cdot \text{osc}_I f + \sum_{I \in \Theta} |I| \cdot \text{osc}_I f \\ &\leq \sum_{I \in \Gamma} |I| \cdot \text{osc}_{J_I} f + \sum_{I \in \Theta} |I| \cdot \text{osc}_{[a;b]} f \\ &\leq \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \text{osc}_I f + A \cdot \sum_{I \in \Theta} |I| \\ &\leq \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \text{osc}_I f + A \cdot L \cdot \alpha \cdot |\Theta| \\ &\leq S^+(f, \Sigma) - S^-(f, \Sigma) + A \cdot L \cdot \alpha \cdot |\Sigma| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Таким образом  $\delta := L \cdot \alpha$ .

( $\Leftarrow$ ) Пусть для всякого  $\varepsilon > 0$  существует  $\delta > 0$ , что для всякого разбиение  $\Sigma$  отрезка  $[a; b]$ , где  $\forall I \in \Sigma |I| < \delta$ , верно, что

$$\sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \text{osc}_I f < \varepsilon$$

Тогда

$$S^+(f, \Sigma) - S^-(f, \Sigma) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot (\sup_I f - \inf_I f) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \text{osc}_I f < \varepsilon$$

Т.е. для всякого  $\varepsilon > 0$

$$\inf_{\Sigma} S^+(f, \Sigma) - \sup_{\Sigma} S^-(f, \Sigma) < \varepsilon$$

Следовательно

$$\inf_{\Sigma} S^+(f, \Sigma) = \sup_{\Sigma} S^-(f, \Sigma)$$

т.е.  $f$  интегрируема на  $[a; b]$  по Риману.

□

**Теорема 62.** Пусть  $f$  — непрерывная на  $[a; b]$  функция. Тогда она интегрируема по Риману на  $[a; b]$ .

**Доказательство.** Поскольку  $f$  непрерывна на компакте  $[a; b]$ , то она равномерно непрерывна, т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in [a; b] \quad f(U_\delta(x)) \subseteq U_\varepsilon(f(x))$$

Для каждого такого  $\varepsilon$  получаемое  $\delta$  обозначим за  $\delta_\varepsilon$ . Тогда для всякого подотрезка  $I$  отрезка  $[a; b]$  длины менее  $\delta_{\varepsilon/2}$  верно, что  $\text{osc}_I f < \varepsilon$ . Следовательно для любого разбиения  $\Sigma$  с шагом не более  $\delta_{\varepsilon/2}$  (т.е.  $\forall I \in \Sigma \ |I| < \delta_{\varepsilon/2}$ ) мы имеем, что

$$\sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \text{osc}_I f < [a; b] \cdot \varepsilon$$

Поэтому  $f$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$ . □

**Теорема 63.**

1.

$$\int_a^b \lambda dx = \lambda(b - a)$$

4. Если  $f$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$ , то

$$\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$$

2. Если  $f$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$ , то

$$f \geq 0 \implies \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

5.  $f$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$  и  $[b; c]$  тогда и только тогда, когда на  $[c; a]$ , и во всех случаях

3. Если  $f$  и  $g$  интегрируемы по Риману на  $[a; b]$ , то

$$\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

**Доказательство.**

- Очевидно, что для всякого разбиения  $\Sigma$  верно, что  $S^+(f, \Sigma) = S^-(f, \Sigma) = \lambda(b - a)$ , следовательно и интеграл Римана равен  $\lambda(b - a)$ .
- Очевидно, что для всякого разбиения  $\Sigma$  верно, что  $S^-(f, \Sigma) \geq 0$ , следовательно, если интеграл Римана определён, то он неотрицателен.
- Очевидно, что для всякого  $\varepsilon > 0$  есть разбиения  $\Sigma_1$  и  $\Sigma_2$ , что

$$\sum_{I \in \Sigma_1} |I| \cdot \text{osc}_I f < \frac{\varepsilon}{2} \qquad \sum_{I \in \Sigma_2} |I| \cdot \text{osc}_I g < \frac{\varepsilon}{2}$$

Рассмотрим любое подразбиение  $\Sigma$  разбиений  $\Sigma_1$  и  $\Sigma_2$ . Тогда

$$\begin{aligned} S^+(f + g, \Sigma) &= \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_I (f + g) \\ &\leq \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_I f + \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_I g \\ &\leq \sum_{I \in \Sigma_1} |I| \cdot \sup_I f + \sum_{I \in \Sigma_2} |I| \cdot \sup_I g \\ &= S^+(f, \Sigma_1) + S^+(g, \Sigma_2) \end{aligned}$$

Аналогично мы имеем, что  $S^-(f + g, \Sigma) \geq S^-(f, \Sigma_1) + S^-(g, \Sigma_2)$ . Таким образом отметим две важные строки неравенств.

$$\begin{aligned} S^+(f, \Sigma_1) + S^+(g, \Sigma_2) &\geq S^+(f + g, \Sigma) \geq S^-(f + g, \Sigma) \geq S^-(f, \Sigma_1) + S^-(g, \Sigma_2) \\ S^+(f, \Sigma_1) + S^+(g, \Sigma_2) &\geq \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx \geq S^-(f, \Sigma_1) + S^-(g, \Sigma_2) \end{aligned}$$

Так мы получаем, что  $S^+(f + g, \Sigma)$ ,  $S^-(f + g, \Sigma)$  и  $\int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$  — три числа с отрезка

$$[S^-(f, \Sigma_1) + S^-(g, \Sigma_2); S^+(f, \Sigma_1) + S^+(g, \Sigma_2)],$$

длина которого меньше  $\varepsilon$ . Следовательно  $f + g$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$ , и интеграл равен

$$\int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

4. Докажем сначала для  $\lambda \geq 0$ . Для всякого  $\varepsilon > 0$  есть разбиение  $\Sigma$  отрезка  $[a; b]$ , что

$$\sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \operatorname{osc}_I f < \varepsilon$$

Также имеем, что

$$\begin{aligned} S^+(\lambda f, \Sigma) &= \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_I \lambda f = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \lambda \cdot \sup_I f = \lambda \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_I f = \lambda S^+(f, \Sigma) \\ S^-(\lambda f, \Sigma) &= \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \inf_I \lambda f = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \lambda \cdot \inf_I f = \lambda \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \inf_I f = \lambda S^-(f, \Sigma) \end{aligned}$$

Следовательно

$$\begin{aligned} S^+(\lambda f, \Sigma) &= \lambda S^+(f, \Sigma) \geq \lambda \int_a^b f(x)dx \geq \lambda S^-(f, \Sigma) = S^-(\lambda f, \Sigma) \\ S^+(\lambda f, \Sigma) - S^-(\lambda f, \Sigma) &< \lambda \varepsilon \end{aligned}$$

Таким образом интеграл  $\lambda f$  по Риману на  $[a; b]$  определён и равен  $\lambda \int_a^b f(x)dx$ .

Теперь покажем для  $\lambda = -1$ . Заметим, что

$$\begin{aligned} S^+(-f, \Sigma) &= \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_I -f = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot -\inf_I f = -\sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \inf_I f = -S^-(f, \Sigma) \\ S^-(-f, \Sigma) &= \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \inf_I -f = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot -\sup_I f = -\sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_I f = -S^+(f, \Sigma) \end{aligned}$$

Следовательно

$$\begin{aligned} S^+(-f, \Sigma) &= -S^-(f, \Sigma) \geq -\int_a^b f(x)dx \geq -S^+(f, \Sigma) = S^-(-f, \Sigma) \\ S^+(-f, \Sigma) - S^-(-f, \Sigma) &< \varepsilon \end{aligned}$$

Таким образом интеграл  $-f$  по Риману на  $[a; b]$  определён и равен  $-\int_a^b f(x)dx$ .

Используя доказанные утверждения получаем, что для всякого  $\lambda$  верно, что

$$\begin{aligned} \int_a^b \lambda f(x)dx &= \int_a^b \text{sign}(\lambda) \cdot |\lambda| f(x)dx \\ &= \text{sign}(\lambda) \int_a^b |\lambda| f(x)dx \\ &= \text{sign}(\lambda) |\lambda| \int_a^b f(x)dx \\ &= \lambda \int_a^b f(x)dx \end{aligned}$$

5. Если  $f$  интегрируема по Риману на некотором отрезке  $I$ , то  $\sup_I f$  и  $\inf_I f$  равны некоторым вещественным значениям (не  $\pm\infty$ ).

Таким образом пусть  $f$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$  и  $[b; c]$ . Тогда для всякого  $\varepsilon > 0$  есть разбиения  $\Sigma_L$  отрезка  $[a; b]$  и  $\Sigma_R$  отрезка  $[b; c]$ , что

$$\sum_{I \in \Sigma_L} |I| \text{osc}_I f < \frac{\varepsilon}{2} \qquad \sum_{I \in \Sigma_R} |I| \text{osc}_I f < \frac{\varepsilon}{2}$$

Следовательно, если определить  $\Sigma := \Sigma_L \cup \Sigma_R$ ,

$$S^+(f, \Sigma) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \sup_I f = \sum_{I \in \Sigma_L} |I| \sup_I f + \sum_{I \in \Sigma_R} |I| \sup_I f \geq \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

По аналогии получаем, что

$$S^+(f, \Sigma) \geq \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx \geq S^-(f, \Sigma)$$

При этом

$$S^+(f, \Sigma) - S^-(f, \Sigma) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \text{osc}_I f = \sum_{I \in \Sigma_L} |I| \text{osc}_I f + \sum_{I \in \Sigma_R} |I| \text{osc}_I f < \varepsilon$$

Таким образом  $f$  интегрируема по Риману на  $[a; c]$ , а интеграл равен  $\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$ .

Пусть теперь  $f$  интегрируема на  $[a; c]$ . Тогда для всякого разбиения  $\Sigma$  отрезка  $[a; c]$  мы можем рассмотреть

$$\Sigma_L := \{I \cap [a; b] \mid I \in \Sigma\}$$

и тогда

$$\sum_{I \in \Sigma_L} |I| \cdot \text{osc}_I f < \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \text{osc}_I f$$

Следовательно есть разбиения со сколь угодно маленькой осцелляцией  $f$  на них, а значит  $f$  интегрируема на  $[a; b]$ ; аналогично и на  $[b; c]$ . А по предыдущим рассуждениям достигается равенство в тождестве интегралов.

□

**Теорема 64.** Пусть дана функция  $f$ , а  $M = \sup_{[a;b]} |f|$ . Тогда

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M(b-a)$$

**Доказательство.** Очевидно, что при разбиении  $\Sigma := \{[a; b]\}$

$$\begin{aligned} S^+(f, \Sigma) &= \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_I f = (b-a) \cdot \sup_{[a;b]} f \\ S^-(f, \Sigma) &= \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \inf_I f = (b-a) \cdot \inf_{[a;b]} f \end{aligned}$$

Следовательно

$$M(b-a) \geq (b-a) \sup_{[a;b]} f = S^+(f, \Sigma) \geq \int_a^b f(x) dx \geq S^-(f, \Sigma) = (b-a) \inf_{[a;b]} f \geq -M(b-a)$$

откуда следует требуемое. □

**Теорема 65.** Пусть  $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна. Тогда

$$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

является первообразной  $f$ .

**Доказательство.** Рассмотрим какие-то  $x$  и  $y$ , что  $a \leq x < y \leq b$ . Тогда

$$F(y) - F(x) = \int_a^y f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^y f(t) dt$$

Следовательно, рассматривая  $\Sigma := \{[x; y]\}$ ,

$$\begin{aligned} \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \inf_I f &\leq F(y) - F(x) \leq \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_I f \\ (y-x) \cdot \inf_{[x;y]} f &\leq F(y) - F(x) \leq (y-x) \cdot \sup_{[x;y]} f \\ \inf_{[x;y]} f &\leq \frac{F(y) - F(x)}{y-x} \leq \sup_{[x;y]} f \end{aligned}$$

Немного меняя обозначения, получаем, что для всякого  $\varepsilon \in [a-x; b-x] \setminus \{0\}$

$$\inf_{U_{|\varepsilon|}(x)} f \leq \frac{F(x+\varepsilon) - F(x)}{\varepsilon} \leq \sup_{U_{|\varepsilon|}(x)} f$$

Заметим, что по непрерывности  $f$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \inf_{U_{\varepsilon}(x)} f = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \sup_{U_{\varepsilon}(x)} f = f(x)$$

Следовательно

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(x+\varepsilon) - F(x)}{\varepsilon} = f(x)$$

Иначе говоря  $F'(x) = f(x)$ . Таким образом  $F' = f$ . □

**Следствие 65.1** (формула Ньютона-Лейбница). Пусть  $F$  — первообразная непрерывной на  $[a; b]$  функции  $f$ . Тогда

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

**Доказательство.** Заметим, что  $G(x) := \int_a^x f(t)dt$  — первообразная  $f$ . Следовательно  $G(x) - F(x) = C$  на  $[a; b]$ . Значит

$$\int_a^b f(x)dx = G(b) = G(b) - G(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$$

□

**Теорема 66.** Пусть  $(f_n)_{n=0}^\infty$  — последовательность интегрируемых по Риману на  $[a; b]$  функций — равномерно сходится к  $f$ . Тогда  $f$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$ , и

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx$$

**Доказательство.** Заметим, что для всякого  $\varepsilon > 0$  есть  $N \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ , что для всяких  $n, m > N$  верно, что

$$|f_n - f_m| \leq \frac{\varepsilon}{3(b-a)};$$

следовательно для всякого  $n > N$  верно, что

$$|f - f_n| \leq \frac{\varepsilon}{3(b-a)}.$$

При этом существует такое разбиение  $\Sigma$  отрезка  $[a; b]$ , что

$$S^+(f_{N+1}, \Sigma) - S^-(f_{N+1}, \Sigma) = \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \operatorname{osc}_I f < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Таким образом для всякого  $n > N$  верно, что

$$\begin{aligned} S^+(f_n, \Sigma) &= \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_I f_n \leq \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \left( \frac{\varepsilon}{3(b-a)} + \sup_I f_{N+1} \right) = \frac{\varepsilon}{3} + \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \sup_I f_{N+1} \\ &= S^+(f_{N+1}, \Sigma) + \frac{\varepsilon}{3}; \end{aligned}$$

аналогично  $S^-(f_n, \Sigma) \geq S^-(f_{N+1}, \Sigma) - \frac{\varepsilon}{3}$ . Аналогично данные утверждения верны и для  $f$  (вместо  $f_n$ ).

Заметим, что

$$\begin{aligned} S^+(f_{N+1}, \Sigma) + \frac{\varepsilon}{3} &\geq S^+(f_n, \Sigma) \geq \int_a^b f_n(x)dx \geq S^-(f_n, \Sigma) \geq S^-(f_{N+1}, \Sigma) - \frac{\varepsilon}{3} \\ S^+(f_{N+1}, \Sigma) + \frac{\varepsilon}{3} &\geq S^+(f, \Sigma) \geq S^-(f, \Sigma) \geq S^-(f_{N+1}, \Sigma) - \frac{\varepsilon}{3} \end{aligned}$$

Таким образом

$$S^+(f, \Sigma) - S^-(f, \Sigma) < \varepsilon,$$

следовательно  $f$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$ . Таким образом мы имеем, что

$$\begin{aligned} S^+(f_{N+1}, \Sigma) + \frac{\varepsilon}{3} &\geq \int_a^b f_n(x) dx \geq S^-(f_{N+1}, \Sigma) - \frac{\varepsilon}{3} \\ S^+(f_{N+1}, \Sigma) + \frac{\varepsilon}{3} &\geq \int_a^b f(x) dx \geq S^-(f_{N+1}, \Sigma) - \frac{\varepsilon}{3} \end{aligned}$$

т.е. для всех  $n > N$

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| < \varepsilon$$

Это значит, что

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

□

**Лемма 67.** Если  $f$  и  $g$  интегрируемы по Риману на  $[a; b]$ , то и  $f \cdot g$ .

**Доказательство.** Заметим, что, поскольку  $f$  и  $g$  интегрируемы по Риману, есть такие константы  $C_f > 0$  и  $C_g > 0$ , что  $|f| \leq C_f$  и  $|g| \leq C_g$ . Следовательно для всяких  $x, y \in [a; b]$

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &\leq |f(x)g(x) - f(y)g(x)| + |f(y)g(x) - f(y)g(y)| \\ &\leq C_g |f(x) - f(y)| + C_f |g(x) - g(y)| \end{aligned}$$

Значит для всякого отрезка  $I$  верно, что

$$\operatorname{osc}_I f \cdot g \leq C_g \operatorname{osc}_I f + C_f \operatorname{osc}_I g$$

Следовательно для всякого разбиения  $\Sigma$  отрезка  $[a; b]$

$$\sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \operatorname{osc}_I f \cdot g \leq C_g \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \operatorname{osc}_I f + C_f \sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \operatorname{osc}_I g$$

Вспомним, что для всякого  $\varepsilon > 0$  есть разбиения  $\Sigma_f$  и  $\Sigma_g$  отрезка  $[a; b]$ , что

$$\sum_{I \in \Sigma_f} |I| \cdot \operatorname{osc}_I f < \frac{\varepsilon}{2C_g} \qquad \sum_{I \in \Sigma_g} |I| \cdot \operatorname{osc}_I g < \frac{\varepsilon}{2C_f}$$

Рассмотрим общее подразбиение  $\Sigma$  разбиений  $\Sigma_f$  и  $\Sigma_g$ . Для него верны предыдущие предыдущие неравенства. Следовательно

$$\sum_{I \in \Sigma} |I| \cdot \operatorname{osc}_I f \cdot g < C_g \frac{\varepsilon}{2C_g} + C_f \frac{\varepsilon}{2C_f} = \varepsilon$$

Поэтому  $f \cdot g$  интегрируема по Риману на  $[a; b]$ .

□

### 4.3 У чего есть выражаемая первообразная?

**Лемма 68.**



1.

$$\int 0 = C$$

5.

$$\int e^x = e^x + C$$

2.

$$\int a_0 + \dots + a_n x^n = C + a_0 x + \dots + a_n x^{n+1}$$

6.

$$\int \sin(x) = -\cos(x) + C$$

3.  $\forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, x > 0$ 

$$\int x^\alpha = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$$

$$\int \cos(x) = \sin(x) + C$$

7.

$$\int \frac{1}{1+x^2} = \arctan(x) + C$$

4.  $\forall x > 0$ 

$$\int \frac{1}{x} = \log(x) + C$$

8.

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin(x) + C$$

**Теорема 69.** Следующие виды функций имеют выражаемую первообразную:

1. рациональные функции;

3. рациональные функции от  $\sinh$  и  $\cosh$ ;2. рациональные функции от  $\sin$  и  $\cos$ ;4. рациональные функции от  $x$  и  $ax^2 + bx + 1$ , где  $a \neq 0$ .

**Доказательство.**

1. Каждая рациональная функция представляется в виде суммы полиномов, членов вида  $\frac{k}{(x+a)^n}$  и членов вида  $\frac{px+q}{(ax^2+bx+c)^n}$ . Покажем, что каждый из них имеет выражаемую первообразную.

- Первообразная многочлена очевидна.

- 

$$\int \frac{dx}{x+a} = \log(x+a) + C$$

- Для всякого  $n > 1$

$$\int \frac{dx}{(x+a)^n} = \frac{1}{(1-n)(x+a)^{n-1}} + C$$

- 

$$\int \frac{dx}{x^2+1} = \operatorname{ctg}^{-1}(x)$$

- 

$$\int \frac{x dx}{x^2+1} = \frac{1}{2} \log(x^2+1)$$

- Для всякого  $n > 1$

$$\int \frac{x dx}{(x^2+1)^n} = \frac{1}{2(1-n)(x^2+1)^{n-1}}$$

- Заметим, что

$$\left( \frac{x}{(x^2+1)^n} \right)' = \frac{1}{(x^2+1)^n} - 2n \frac{x^2}{(x^2+1)^{n+1}} = \frac{2n}{(x^2+1)^{n+1}} - \frac{2n-1}{(x^2+1)^n}$$

Следовательно

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^{n+1}} = \frac{x}{2n(x^2 + 1)^n} + \frac{2n-1}{2n} \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^n}$$

Таким образом несложно понять по индукции, что  $\int \frac{dx}{(x^2+1)^n}$  для  $n > 1$  есть некоторая сумма рациональных функций и  $\operatorname{ctg}^{-1}$ .

- Линейными заменами задача нахождения первообразных у  $\frac{1}{(x+a)^n}$  и  $\frac{px+q}{(ax^2+bx+c)^n}$  сводится к нахождению первообразных  $\frac{1}{x^n}$ ,  $\frac{1}{(x^2+1)^n}$  и  $\frac{x}{(x^2+1)^n}$ .

2. Заметим, что

$$\sin(x) = \frac{2 \operatorname{tg}(x/2)}{1 + \operatorname{tg}(x/2)^2} \quad \cos(x) = \frac{1 - \operatorname{tg}(x/2)^2}{1 + \operatorname{tg}(x/2)^2} \quad dx = \frac{2d(\operatorname{tg}(x/2))}{1 + \operatorname{tg}(x/2)^2}$$

Следовательно задача сводится к нахождению первообразной рациональной функции при помощи подстановки  $t := \operatorname{tg}(x)$ .

3. С одной стороны это можно свести к предыдущей задаче заменой  $t := ix$ . С другой стороны можно заметить, что

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad dx = \frac{d(e^x)}{e^x}$$

Следовательно задача сводится к нахождению первообразной рациональной функции при помощи подстановки  $t := e^x$ .

4. Линейными подстановками можно свести задачу к нахождению первообразной рациональной функции от  $y$  и  $\sqrt{\pm y^2 \pm 1}$  или только от  $y$ .

- Случай рациональной функции только от  $y$  уже был разобран.
- Если нам дана рациональная функция от  $y$  и  $\sqrt{1 - y^2}$ , то заменой  $t := \sin^{-1}(y)$  она сводится к рациональной функции от  $\sin$  и  $\cos$ .
- Если нам дана рациональная функция от  $y$  и  $\sqrt{y^2 - 1}$ , то заменой  $t := \cosh^{-1}(y)$  она сводится к рациональной функции от  $\sinh$  и  $\cosh$ .
- Если нам дана рациональная функция от  $y$  и  $\sqrt{1 + y^2}$ , то заменой  $t := \sinh^{-1}(y)$  она сводится к рациональной функции от  $\sinh$  и  $\cosh$ .

□

## 5 Логарифм? Полезности?? Что???

**Теорема 70.** Пусть дана функция  $\varphi : (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , что

- $\forall a, b \in (0; +\infty) \quad \varphi(ab) = \varphi(a) + \varphi(b)$
- $\varphi$  монотонна.

Тогда верны следующие утверждения:

1.  $\varphi(1) = 0$ ;
2.  $\forall a \in (0; +\infty), n \in \mathbb{N} \quad \varphi(a^n) = n\varphi(a)$ ;

3.  $\forall a \in (0; +\infty) \quad \varphi(a^{-1}) = -\varphi(a);$
4.  $\forall a \in (0; +\infty), q \in \mathbb{Q} \quad \varphi(a^q) = q\varphi(a);$
5.  $\varphi$  непрерывна;
6.  $\varphi$  бесконечно дифференцируема;
7.  $\varphi'(x) = \frac{C}{x}$  для некоторого  $C \in \mathbb{R};$
8. все такие  $\phi$  имеют вид  $\int_1^x \frac{Cdt}{t}$  для некоторого  $C > 0$  и наоборот: любая такая функция удовлетворяет условиям на  $\phi$ .

**Доказательство.**

1.

$$\varphi(1) = \varphi(1 \cdot 1) - \varphi(1) = \varphi(1) - \varphi(1) = 0.$$

2. Докажем по индукции по  $n$ . База при  $n = 0$  и  $n = 1$  очевидна. Весь шаг:

$$\varphi(a^{n+1}) = \varphi(a^n) + \varphi(a) = n\varphi(a) + \varphi(a) = (n+1)\varphi(a).$$

3.

$$\varphi(a^{-1}) = \varphi(a \cdot a^{-1}) - \varphi(a) = \varphi(1) - \varphi(a) = -\varphi(a)$$

4. Пусть  $q = \frac{kn}{m}$ , где  $n, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ , а  $k = \pm 1$ . Тогда

$$m\varphi(a^q) = \varphi(a^{mq}) = \varphi(a^{kn}) = k\varphi(a^n) = kn\varphi(a) = qm\varphi(a)$$

Следовательно

$$\varphi(a^q) = q\varphi(a)$$

5. Заметим, что  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \varphi(x)$  в связи с монотонностью и ограниченностью (например, значением  $\varphi(1/2)$ ) функции  $\varphi$  определён, значит равен некоторому  $b$ . Тогда

$$2b = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2\varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \varphi(x^2) = \lim_{y \rightarrow 1^+} \varphi(y) = b$$

значит  $b = 0$ . Следовательно

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi(x) = - \lim_{x \rightarrow 1^-} \varphi(x^{-1}) = - \lim_{y \rightarrow 1^+} \varphi(y) = 0$$

Таким образом  $\varphi$  непрерывна в 1. Следовательно

$$\lim_{x \rightarrow y} \varphi(x) = \varphi(y) + \lim_{x \rightarrow y} \varphi\left(\frac{x}{y}\right) = \varphi(y) + \lim_{\alpha \rightarrow 1} \varphi(\alpha)$$

т.е.  $\varphi$  непрерывна во всех точках  $(0; +\infty)$ .

6. Рассмотрим

$$\Phi := (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \int_1^x \varphi(t) dt$$

Тогда мы имеем, что  $\Phi$  — первообразная, поскольку  $\varphi$  непрерывна. А тогда если  $\varphi$  имеет  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  производных, то  $\Phi$  имеет  $n+1$  производную. Заметим, что

$$\Phi(2x) - \Phi(x) = \int_x^{2x} \varphi(t) dt = x \int_x^{2x} \varphi\left(\frac{t}{x}\right) d\frac{t}{x} + x \int_x^{2x} \varphi(x) d\frac{t}{x} = Cx + \varphi(x)x$$

где

$$C := \int_1^2 \varphi(t) dt$$

Следовательно

$$\varphi(x) = \frac{\Phi(2x) - \Phi(x)}{x} - C$$

Таким образом, если  $\Phi$  имеет  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  производных, то  $\varphi$  тоже. Значит  $\Phi$  и  $\phi$  бесконечно дифференцируемы.

7. Пусть фиксировано некоторое  $y > 0$ . Следовательно

$$y\varphi'(xy) = (\varphi(xy))' = (\varphi(x) + \varphi(y))' = \varphi'(x)$$

а значит, если подставить  $y = x^{-1}$

$$\varphi'(x) = \frac{\varphi'(1)}{x}$$

Таким образом определяя  $C := \varphi'(1)$  имеем, что

$$\varphi'(x) = \frac{C}{x}$$

8. Действительно, если есть некоторое  $\phi$ , то  $\phi$  и  $\int_1^x \frac{\phi'(1)dt}{t}$  являются первообразными  $\frac{\phi'(1)}{x}$ , значит отличаются на константу. При этом в 1 они обе равны 0, значит функции совпадают.

Теперь же покажем, что  $\psi(x) := \int_1^x \frac{Cdt}{t}$  является корнем функционального уравнения.

- Поскольку  $\frac{C}{x}$  — функция одного знака, то  $\psi$  монотонна.
- 

$$\begin{aligned} \psi(xy) &= \int_1^{xy} \frac{Cdt}{t} &= \int_1^x \frac{Cdt}{t} + \int_x^{xy} \frac{Cdt}{t} \\ &= \int_1^x \frac{Cdt}{t} + \int_x^{xy} \frac{Cd(t/x)}{(t/x)} &= \int_1^x \frac{Cdt}{t} + \int_1^y \frac{Cds}{s} &= \psi(x) + \psi(y) \end{aligned}$$

□

**Определение 38.** *Натуральный логарифм* — функция

$$\log : (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \int_1^x \frac{dt}{t}$$

*Экспонента* — функция

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0; +\infty), x \mapsto \log^{-1}(x)$$

**Теорема 71.**

1.  $\exp$  корректно определена;
2.  $\exp$  непрерывна;
3.  $\exp$  бесконечно дифференцируема, и каждая производная  $\exp$  равна  $\exp$ ;

4.  $\exp(0) = 1$ ;
5.  $\exp(a + b) = \exp(a) \cdot \exp(b)$ ;
- 6.

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!};$$

### Доказательство.

1. Поскольку  $\log$  монотонна, то всякое значение из области значений  $\log$  — всё  $\mathbb{R}$  — принимается единожды. Следовательно  $\exp$  корректно определена.
2. Поскольку всякая монотонная биекция из интервала в интервал является непрерывной функцией, то и  $\exp$  непрерывна на всяком интервале.
3. По свойству дифференцирования

$$\exp'(x) = \frac{1}{\log'(\exp(x))} = \frac{1}{1/\exp(x)} = \exp(x)$$

Таким образом  $\exp$  дифференцируема раз, и при дифференцировании не меняется. Следовательно  $\exp$  бесконечно дифференцируема.

4. Следует из того, что  $\log(1) = 0$ .
5. Следует из того, что  $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$ , подстановкой  $x := \log^{-1}(a)$  и  $y := \log^{-1}(b)$ .
6. Вспомним, что по теореме 49 для всякого  $x \in \mathbb{R}$  и  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  есть  $\xi_n \in (0; x)$ , что

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\exp^{(k)}(0)}{k!} (x-0)^k + \frac{\exp^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} (x-0)^{n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{\exp(\xi_n)x^{n+1}}{(n+1)!}$$

Вспомним также, что

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right)$$

Чтобы показать, что предел этой последовательности реально совпадает с  $\exp(x)$ , покажем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \exp(x) - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right) = 0$$

Действительно,

$$\left| \exp(x) - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right| = \left| \frac{\exp(\xi_n)x^{n+1}}{(n+1)!} \right| \leq \exp(|x|) \left( \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \right)$$

Пусть  $N = \lceil 2|x| \rceil$ . Тогда для всякого  $n \geq N$  имеем, что

$$\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{|x|^N}{N!} \prod_{k=N+1}^{n+1} \frac{|x|}{k} < \frac{|x|^N}{N!} \prod_{k=N+1}^{n+1} \frac{1}{2} = \frac{|x|^N \cdot 2^{N-1}}{N!} \cdot \frac{1}{2^n}$$

Следовательно, с момента  $N$  последовательность

$$\left( \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \right)_{n=0}^{\infty}$$

сходится к 0 не медленнее, чем геометрическая прогрессия, а тогда и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \exp(x) - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right) = 0$$

□

**Теорема 72.** 1.  $(a^x)' = \log(a)a^x$  2.  $(x^a)' = ax^{a-1}$

**Доказательство.**

1.

$$(a^x)' = \exp(x \log(a))' = (x \log(a))' a^x = \log(a)a^x$$

2.

$$(x^a)' = \exp(a \log(x))' = (a \log(x))' x^a = \frac{a}{x} x^a = ax^{a-1}$$

□

**Теорема 73.** Пусть  $f : (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f^{(1)}, \dots, f^{(n+1)}$  определены на  $(t - \delta; t + \delta)$  для некоторого  $\delta > 0$ . Тогда для всякого  $x \in U_\delta(t)$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k + \frac{1}{n!} \int_t^x f^{(n+1)}(s) (s - t)^n ds$$