

Übungsblatt № 6

Aufgabe 24: Summe unabhängiger poissonverteilter Zufallsvariablen

Für unabhängige poissonverteilte $X_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1)$ und $X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2)$ zeige man mit $p = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$:

- i) $X_1 + X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$
- ii)

$$\mathbb{P}(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad 0 \leq k \leq n$$

Wir wissen $\mathbb{P}(X_i = k) = \frac{\lambda_i^k}{k!} e^{-\lambda_i} = f_{X_i}(k)$.

Zu i):

Da X_1 und X_2 unabhängig sind gilt $f_{X_1+X_2} = f_{X_1} * f_{X_2}$, mit $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$:

$$\begin{aligned} (f_{X_1} * f_{X_2})(k) &= \sum_{j=0}^k f_{X_1}(j) f_{X_2}(k-j) = \sum_{j=0}^k \frac{\lambda_1^j}{j!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{k-j}}{(k-j)!} e^{-\lambda_2} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!(k-j)!} \lambda_1^j \lambda_2^{k-j} = \frac{e^{-\lambda}}{k!} \sum_{j=0}^k \frac{k!}{j!(k-j)!} \lambda_1^j \lambda_2^{k-j} = \frac{e^{-\lambda}}{k!} (\lambda_1 + \lambda_2)^k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

Somit gilt $X_1 + X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Zu ii): Mit dem Satz von Bayes erhalten wir:

$$\mathbb{P}(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) = \frac{\mathbb{P}(X_1 + X_2 = n | X_1 = k) \mathbb{P}(X_1 = k)}{\mathbb{P}(X_1 + X_2 = n)}$$

Wir müssen also insbesondere $\mathbb{P}(X_1 + X_2 = n | X_1 = k)$ bestimmen. Sei B das Ereignis, dass $X_1 = k$ und A das Ereignis, dass $X_1 + X_2 = n$. Dann gilt $\mathbb{P}(B) = \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1}$. Der Schnitt $A \cap B$ enthält nur $X_1 = k$. Damit $X_1 + X_2 = n$ gilt muss daher $X_2 = n - k$ gelten. Aufgrund der Unabhängigkeit von X_1 und X_2 folgt somit:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(X_1 = k) \mathbb{P}(X_2 = n - k)}{\mathbb{P}(X_1 = k)} = \mathbb{P}(X_2 = n - k) = \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2}$$

Damit erhalten wir:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = k, X_1 + X_2 = n) &= \frac{\lambda_2^{n-k} \lambda_1^k}{k!(n-k)!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{n!}{(\lambda_1 + \lambda_2)^n} e^{\lambda_1 + \lambda_2} \\ &= \binom{n}{k} \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1 + \lambda_2)^n} = \binom{n}{k} \frac{\lambda_1^k}{(\lambda_1 + \lambda_2)^k} \frac{\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1 + \lambda_2)^{n-k}} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

Aufgabe 26: Erwartungswert

Ein Punkt (X_1, X_2) wird stetig gleichverteilt im Dreieck D mit den Eckpunkten $(0, 0)$, $(1, 0)$ und $(1, 1)$ ausgewählt. Bestimmen Sie $(\mathbb{E}(X_1), \mathbb{E}(X_2))$ und $\varrho(X, Y)$.

Wir bestimmen die Randverteilungen:

$$f_{X_1}(x) = \frac{1}{\lambda^2(D)} \int_{\mathbb{R}} I_D(x, x_2) dx_2 = \frac{1}{\frac{1}{2}} \int_0^x dx_2 dx = 2x$$

$$f_{X_2}(x) = \frac{1}{\lambda^2(D)} \int_{\mathbb{R}} I_D(x_1, x) dx_1 = \frac{1}{\frac{1}{2}} \int_x^1 dx_1 = 2(1-x)$$

$$\mathbb{E}(X_1) = \int_0^1 x f_{X_1}(x) dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$\mathbb{E}(X_2) = \int_0^1 x f_{X_2}(x) dx = \int_0^1 2x(1-x) dx = \frac{1}{3}$$

Für die Varianzen:

$$\mathbb{E}(X_1^2) = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2} \implies \text{var}(X_1) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$$

$$\mathbb{E}(X_2^2) = \int_0^1 2x^2(1-x) dx = \frac{1}{6} \implies \text{var}(X_2) = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$$

Für die Kovarianzen brauchen wir $f_{X_1 X_2}(x)$. Dazu bestimmen wir $\mathbb{P}(X_1 X_2 \leq x)$. Betrachten wir anhand einer Graphik, über welchen Bereich wir integrieren müssen:




Abbildung 1: Der zu integrierende Bereich

Auf der Gerade (t, t) ist der Schnittpunkt mit D bei \sqrt{x} , ergibt sich:

$$\mathbb{P}(X_1 X_2 \leq x) = \frac{x}{2} + \int_{\sqrt{x}}^1 \frac{x}{t} dt = \frac{x}{2} - x \ln(\sqrt{x}) = \frac{x(1 - \ln(x))}{2}$$

Da $X_1, X_2 \in [0, 1]$ folgt also $\mathbb{P}(X_1 X_2 \leq 1) = 1$, womit wir eine Normierung von 2 brauchen, daher:

$$F_{X_1 X_2}(x) = x(1 - \ln(x)) \implies f_{X_1 X_2}(x) = -\ln(x) \quad (1)$$

Damit:

$$\mathbb{E}(X_1 X_2) = \int_0^1 -x \ln(x) dx = \frac{1}{4}$$

Wir erhalten $\text{cov}(X_1, X_2) = \mathbb{E}(X_1 X_2) - \mathbb{E}(X_1)\mathbb{E}(X_2) = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36}$ und

$$\varrho(X_1, X_2) = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{1}{18}} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

Aufgabe 27: Varianz-Kovarianz Matrix

X , Y und Z seien unabhängig und stetig gleichverteilt in $(-1, 1)$. Berechnen Sie die Varianz-Kovarianz Matrix des Vektors

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} X + Y \\ Y + Z \\ XZ \end{bmatrix}$$

Wir kennen die allgemeine Form von $\text{var}(\mathbf{V})$:

$$\text{var}(\mathbf{V}) = \begin{bmatrix} \text{var}(X + Y) & \text{cov}(X + Y, Y + Z) & \text{cov}(X + Y, XZ) \\ \text{cov}(X + Y, Y + Z) & \text{var}(Y + Z) & \text{cov}(Y + Z, XZ) \\ \text{cov}(X + Y, XZ) & \text{cov}(Y + Z, XZ) & \text{var}(XZ) \end{bmatrix}$$

Bevor wir einige Integrale ausrechnen, wollen wir zuerst die Unabhängigkeit der Zufallsvariablen und die Rechenregeln der Kovarianz ausnutzen:

$$\text{cov}(X + Y, Y + Z) = \text{cov}(X, Y + Z) + \text{cov}(Y, Y + Z) = \text{cov}(X, Y) + \text{cov}(X, Z) + \text{cov}(Y, Y) + \text{cov}(Y, Z)$$

Nach dem Multiplikationssatz folgt nun:

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0$$

$$\text{cov}(X, Z) = \mathbb{E}(XZ) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Z) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Z) = 0$$

$$\text{cov}(Y, Z) = \mathbb{E}(YZ) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(Z) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(Z) = 0$$

Es verbleiben also $\text{cov}(Y, Y)$ und $\text{cov}(X, XZ)$ bzw. $\text{cov}(Y, XZ)$ und $\text{cov}(Z, XZ)$ zu bestimmen:

$$\text{cov}(Y, Y) = \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 = \text{var}(Y)$$

$$\text{cov}(X, XZ) = \mathbb{E}(X^2 Z) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(XZ) = \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Z) - \mathbb{E}(X)^2\mathbb{E}(Z) = \text{var}(X)\mathbb{E}(Z)$$

$$\text{cov}(Y, XZ) = \mathbb{E}(XYZ) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(XZ) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(Z) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(Z) = 0$$

$$\text{cov}(Z, XZ) = \mathbb{E}(XZ^2) - \mathbb{E}(Z)\mathbb{E}(XZ) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Z^2) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Z)^2 = \mathbb{E}(X)\text{var}(Z)$$

Weiter mit $\text{var}(X) = \text{var}(Y) = \text{var}(Z)$:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x \, dx = \frac{1}{4}(1 - 1) = 0$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 \, dx = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Somit folgt $\text{var}(X) = \frac{1}{3}$. Aus $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(Z) = 0$ folgt außerdem $\text{cov}(X, XZ) = \text{cov}(Z, XZ) = 0$. Wir brauchen von $\text{var}(Y + Z)$ und $\text{var}(XZ)$:

$$\mathbb{E}(Y + Z) = \mathbb{E}(Y) + \mathbb{E}(Z) = 0$$

$$\mathbb{E}((Y + Z)^2) = \mathbb{E}(Y^2 + 2YZ + Z^2) = \mathbb{E}(Y^2) + 2\mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(Z) + \mathbb{E}(Z^2) = \frac{2}{3}$$

$$\mathbb{E}(XZ) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Z) = 0 \quad \mathbb{E}(X^2 Z^2) = \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2) = \frac{1}{9}$$

Damit haben wir:

$$\text{var}(\mathbf{V}) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$$