DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DA TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL PÓS-PANDEMIA

Kolte IV*, Cunha EAT, Alves E***, Brito L***, Basta PC***

***Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Rio de Janeiro, RJ **Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (LACEN-MS), Campo Grande, MS. ***Programa Estadual de Controle de Tuberculose (SES-MS), Campo Grande, MS. Contato: idakolte@hotmail.com.**

Introdução & justificativa

A acentuada desigualdade em saúde vivenciada pela população indígena no Brasil foi demonstrada por um excesso de mortalidade global de 34,8% durante a pandemia COVID-19 em 2020, contra 18,1% na população não indígena (1). A tuberculose é uma prioridade para a saúde indígena desde a criação da SESAI em 2010. Durante a pandemia COVID-19, a vigilância e o acompanhamento da tuberculose foram interrompidos tanto para a população indígena 'aldeada', atendida pela SESAI, quanto para a população indígena não aldeada, atendida pelo SUS. O objetivo deste estudo descritívo exploratório é de mapear o impacto da pandemia no número de casos notificados de tuberculose (TB), diagnóstico da doença, e desenvolvimento de casos de tuberculose multidrogaresistente (MDR-TB) na população indígena no país.

Materiais e metodologia

Baixamos dados livremente acessíveis dos casos notificados de tuberculose do sistema TabNet do Ministério da Saúde: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/tubercbr.def Usamos os variáveis ano de notificação, raça/cor, tipo de entrada, confirmação laboratorial, 1o Bac Escarro, 2o Bac Escarro, Cultura Escarro, Teste Rápido TB, Teste Sensibilidade, Situação Encerramento.

No censo de 2010 foram registrados 896.917 pessoas indígenas no Brasil. No censo de 2022, esse número subiu para 1.693.535 pessoas. O crescimento observado não pode ser devido somente a fatores demográficos (nascimentos, mortes). Devido à incerteza sobre o denominador optamos por apresentar somente números absolutos de casos e não taxas de incidência no estudo.

Resultados

Ano Dx	Casos novos	Recidiva	Regresso após abandono	Pós-óbito	Transferência	Não sabe	Total Indígenas	Indígenas mudança do ano anterior	Total Brasil	Brasil mudança do ano anterior
2015	864	61	44	1	21	2	993		85462	
2016	813	53	32	9	18	6	931	-6,2%	86210	0,9%
2017	751	62	50	4	34	3	904	-2,9%	90295	4,7%
2018	768	71	46	7	28	9	929	2,8%	94735	4,9%
2019	785	61	42	5	26	3	922	-0,8%	96685	2,1%
2020	662	56	40	5	27	1	791	-14,2%	86757	-10,3%
2021	620	30	52	3	22	3	730	-7,7%	92415	6,5%
2022	816	59	68	1	24	4	972	33,2%	104654	13,2%
2023	945	62	113	10	48	2	1180	21,4%	111467	6,5%
Total	**7024**	**515**	**487**	**45**	**248**	**33**	**8352**		**848680**	

Teste de sensibilidade 2023								
	Sensível	Em andamento	Resistente isoniazida	Resistante rifampicina	Resistente isoniazida & rifampicina	Resistente ≥ 3 drogas da 1ª linha	Total	% testado por sensibilidade
Total	95	13	8	3	2	1	122	10.3
Casos novos	78	8	5	2	0	1	94	9.9
Recidivas	3	0	2	0	1	0	6	9.7
Retorno após abandono	9	3	0	1	1	0	14	12.4
Transferência	2	1	1	0	0	0	4	8.3
Pós-óbito	3	1	0	0	0	0	4	40.0

2023: 270 casos indígenas (22.9%) não tiveram nenhum teste laboratorial. 384 casos (32.5%) foram confirmados somente com bacilloscopia. Desses, 122 casos (10.3%) tiveram bacilloscopia negativa.

2020: 144 casos indígenas (18.2%) não tiveram nenhum teste laboratorial. 268 casos (33.8%) foram confirmados somente com bacilloscopia. Desses, 100 casos (12.8%) tiveram bacilloscopia negativa.

Ano Dx	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Testados sensibilidade	7,55%	8,59%	9,51%	9,90%	9,33%	8,60%	10,82%	11,21%	10,34%
Taxa de detecção	8,00%	6,25%	11,63%	6,52%	4,65%	5,88%	12,66%	9,17%	11,48%
TDO realizado	53,47%	50,48%	53,76%	57,37%	49,57%	46,40%	48,49%	46,81%	46,10%

Discussão

Os dados disponíveis no sistema TabNet são preliminares e os resultados baseados neles somente podem ser considerados como indicações de tendências. Observamos que, como era esperado, houve uma explosão de casos após a pandemia, e que o aumento foi muito maior na população indígena. Para a população nãó-indígena o crescimento anual de casos diminuiu de 2022 para 2023, mas para a população indígena o aumento de casos parece continuar. Mais da metade dos casos notificados não tiveram nenhum teste laboratorial ou somente confirmação com bacilloscopia. Os procedimentos diagnósticos não mudaram desde 2020. Embora a taxa de casos testados por sensibilidade aumentou de 7,55% em 2015 para 10,34% em 2023, é preciso reforçar a detecção de MDR-TB, considerando o aumento na taxa de detecção de resistentes por ≥1 drogas da 1ª linha que chegou a quase 12% em 2023, a queda contínua de TDO e o aumento preocupante em casos de regresso após abandono. Somente 12,4% dos casos de regresso após abandono tiveram um teste de sensibilidade em 2023. O sistema TabNet não contém dados sobre a busca ativa, que precisa ser investigada em pesquisas futuras.

1. Soares GH, Jamieson L, Biazevic MGH, Michel-Crosato E. Disparities in Excess Mortality Between Indigenous and Non-Indigenous Brazilians in 2020: Measuring the Effects of the COVID-19 Pandemic. J Racial Ethn Health Disparities. 2021 Sep 28:1–10.