

COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE

Résultats 2025 du comptage Wetlands International



Wetlands
INTERNATIONAL



**Agir pour
la biodiversité**

ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2025

Auteurs : Gwenaël Quaintenne.

Relecture : Laurent Couzi & Jérémy Dupuy.

Coordination nationale : LPO pour le compte de Wetlands International

Contact : wetlands-france@lpo.fr

Financeurs : Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. EDF.

Citation recommandée : LPO (2025) Comptage des Oiseaux d'eau à la mi-janvier en France. Résultats 2025 du comptage Wetlands International. LPO BirdLife France - Service Connaissance, Wetlands International, Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. 26 pp. & annexes 101 pp., Rochefort.

Contributeurs : Les observateurs de terrain, bénévoles pour la plupart, constituent les piliers du réseau Wetlands International. Nous remercions particulièrement pour leur investissement, souvent de longue date, l'ensemble des participants et les coordinateurs locaux issus de ces structures : A Rocha, ACDPM Baie de Seine – Pays de Caux, ADENA-Bagnas, Aggl. du Pays de l'Or, ALEPE, ANA - CEN Ariège, ANVL, AOM Saône-et-Loire, APOE Hegenheim, ARO Midi-Pyrénées, ASCO, ASPF, Ass. de Protection du Val du Drugeon, Ass. de Rosquerno, Ass. des Naturalistes de la Gohelle, Ass. des Prop. du Marais Balançon, Ass. des Sauvaginaires de la côte d'Opale, Ass. Hirondelle, Ass. La Bouëxière Environnement, Ass. Naturaliste d'Ouessant, Ass. Nature du Nogentais, Ass. Nature Nord-Isère Lo Parvi, Ass. Roannaise de Protection de la Nature, Aude Nature, AVEN du Grand Voyeux, Bonnelles Bulion Nature, Bretagne Vivante SEPNB, BTS GPN Vic, BVO 29-Nord, BVO 29-Sud, BVO 35, BVO 56, CA de Guingamp Paimpol, CD 13, CD 14, CD 23, CD 33, CD 35, CD 44, CD 56, CD 59, CD 77, CD 91, CDC du Saint-Quentinoise, CDC île de Noirmoutier, CDC Océan Marais de Monts, CDC Pays d'Iroise, CEL Ile aux Moines, CEMO, CEN Allier, CEN Bourgogne, CEN Champagne-Ardenne, CEN Corse, CEN Lorraine, CEN Nouvelle-Aquitaine, CEN Occitanie, CEN PACA, CERF, Charente Nature, CODB, COGard, Collectif Audois, Collectif de Prunete, Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, Conservatoire du littoral - Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, CPIE Chaîne des terrils, CPIE du Pays de Soulaines, CPIE Littoral Basque, CPIE Meuse, CPIE Seignanx et Adour, CPIE Sèvre et Bocage, CPN, CPN des Landes (Saint-Nazaire), CPN les Mulots Chevelus (Saint-Nazaire), Ctre de découverte de la Baie du Mont Saint-Michel, DDT 18, DDT 58, EDEN 62, ENS Essonne, ENS Izadia, EPTB Saône et Doubs, EPTB Seine Grands Lacs, Espace Naturel Lille Métropole, Eure-et-Loir Nature, F.O.S.O.R., FDC 01, FDC 02, FDC 13, FDC 18, FDC 22, FDC 24, FDC 28, FDC 29, FDC 30, FDC 33, FDC 34, FDC 35, FDC 40, FDC 44, FDC 56, FDC 85, Fondation Pierre Vérots, GAEC la Salorge de la Vertonne, GEOB, GEOCA, GNA, GNLA, GNUFC, GODS, GOELAND, GOJ, GON (agr. rég. Haut-de-France), GONm, GOR, Groupe jeune LPO - Groupe local LPO Audeux, Guide Naturaliste Ot D'arès, Indre Nature, La salsepareille, Le Clipon, Le Merle, Les Amis de la Réserve de Séné, Les Amis du muséum de Gray, Les Amis du Val d'Allier, Les Amis Marais du Viguerat, Les Gazouillis du Plateau, LOANA, Loiret Nature Environnement, Loir-et-Cher Nature, LPO 01, LPO 02, LPO 07, LPO 11, LPO 18, LPO 21, LPO 26, LPO 32, LPO 34, LPO 38, LPO 42, LPO 44, LPO 46, LPO 54, LPO 55, LPO 57, LPO 58, LPO 59, LPO 62, LPO 69, LPO 71, LPO 72, LPO 73, LPO 74, LPO 81, LPO 85, LPO 89, LPO Alsace, LPO Anjou, LPO Aquitaine, LPO Auvergne, LPO Auvergne-Rhône-Alpes, LPO Bourgogne-Franche-Comté, LPO Bretagne, LPO Champagne-Ardenne, LPO Grand-Est, LPO Ile-de-France, LPO Limousin, LPO Normandie, LPO Occitanie, LPO PACA, LPO Poitou-Charentes, LPO Touraine, Mairie d'Andernos-les-Bains, Mairie de La Teste de Buch, Maison de la Mer/Tregunc, Maison des Dunes 29N, Marais aux Oiseaux, Mayenne Nature Environnement, Nature 18, Nature en Occitanie, NaturEssonne, OAG KARLSRUHE, OBIOS, OFB 13, OFB 14, OFB 17, OFB 18, OFB 22, OFB 24, OFB 29, OFB 33, OFB 34, OFB 35, OFB 37, OFB 41, OFB 44, OFB 45, OFB 47, OFB 49, OFB 51, OFB 53, OFB 54, OFB 56, OFB 58, OFB 67, OFB 68, OFB 79, OFB 85, OFB Unité Avifaune Migratrice, ONF, Parc Ornitho du Pont de Gau, Parc Ornithologique du Pont de Gau, Parc Ornithologique/Réserve de Villars-les-Dombes, Picardie Nature, PN des Ecrins, PN Port-Cros, PNM d'Iroise, PNR Avesnois, PNR Boucles de la Seine normande, PNR Camargue, PNR d'Armorique, PNR de Brière, PNR de la Brenne, PNR de la Forêt d'Orient, PNR de la Narbonnaise (Med), PNR de Lorraine, PNR des Caps et Marais d'Opale, PNR du Perche, PNR Golfe du Morbihan, PNR Landes de Gascogne, PNR Marais du Cotentin et du Bessin, PNR Scarpe-Escaut, RCFS de l'Estuaire Loire, RENARD, Réserve du Petit Rhône, Réserve Ornithologique du Teich, RNC Etang de Biguglia, RNCFS Arjuzanx, RNCFS du Rhin, RNCFS Golfe du Morbihan, RNCFS Lac du Der, RNF - OPNL, RNN Archipel des Glénan, RNN Baie de L'Aiguillon, RNN Beauguillot, RNN Chérine, RNN Courant d'Huchet, RNN de Camargue, RNN de Grand-Lieu, RNN de la Belle Henriette, RNN de la Mare de Vauville, RNN de l'étang de Cousseau, RNN de Moëze-Oléron, RNN des étangs et rigoles d'Yveline, RNN des Marais de Müllembourg, RNN des Sept-Iles, RNN du Banc d'Arguin, RNN du Lac de Remoray, RNN du Marais d'Orx, RNN du Marais d'Yves, RNN du Val d'Allier, RNN du Val de Loire, RNN Estuaire Seine-Maison de l'Estuaire, RNN Etang noir, RNN François le Bail, RNN Ile du Girard, RNN Lilleau des Niges, RNN Marais de Bruges, RNN Marais de Séné, RNN Marais du Viguerat, RNN Marais et dunes d'Hourtin, RNN Mer d'Iroise, RNN Prés salés d'Arès et Lège-Cap-Ferret, RNN Saint-Denis-du-Payré, RNN Saint-Quentin-en-Yvelines, RNR de Sainte-Lucie, RNR des «Landes, Prairies et Etangs de Plounérin», RNR du marais de Larchant, RNR du marais de Sougéal, RNR La Vacherie, RNR polder de Sébastopol, Sce des Espaces Verts et Nature de l'Eurométropole de Strasbourg, SEPANLOG, SEPANSO, SEPANSO, SIARCE, SMDs, SNPN, Sologne Nature Environnement, Station Ornithologique des Marais de Sacy, Sté de Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne, Sté d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Steenwerck-Nature-Environnement, Synd. de l'Orge, Synd. Intercom. de Chasse au Gibier d'Eau de la Basse Loire Nord, Synd. Mixte Baie de Somme-Gd Littoral Picard, Synd. Mixte Camargue Gardoise, Synd. Mixte des Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, Synd. Mixte des Marais de Sacy, Synd. Mixte Ria d'Etel, Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche, Tour du Valat, Unis-Cité, Université Bretagne Sud & Ursine Nature.

Illustration première de couverture : Canard souchet, *Spatula clypeata* © Piotr Krzeslak

Ce travail est notamment rendu possible grâce aux partenaires du réseau Faune-France. Cette démarche rassemble plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales, unies autour d'une charte commune.




LES CHIFFRES CLÉS DU COMPTAGE INTERNATIONAL DES OISEAUX D'EAU DE WETLANDS INTERNATIONAL

180
Pays — **150 000**
compteurs bénévoles
↳ **1,5**
milliard d'oiseaux


Le comptage des Oiseaux d'eau dans le monde c'est :

- Des comptages synchronisés sur 5 grandes régions (Asie-Pacifique, Afrique-Eurasie, Caraïbes, Amérique centrale, néotropique), à travers près de 180 pays
- Plus de 150 000 compteurs bénévoles
- 50 000 zones humides référencées et comptées régulièrement
- Plus d'un 1,5 milliard d'oiseaux d'eau dénombrés au total depuis 1967



Le réseau de comptage en France c'est :

- Plus de 2 500 compteurs bénévoles
- Près de 300 organismes et associations participants
- Près de 80 coordinateurs locaux
- Plus de 500 zones humides dénombrées
- Une série temporelle de près de 300 000 données renseignant sur l'occurrence de 200 espèces d'oiseaux d'eau depuis 1967 et totalisant plus de 110 000 000 individus dénombrés



Le comptage international des oiseaux d'eau, l'un des plus importants programmes de sciences participatives à travers le monde (Wetlands International 2017)

The International Waterbird Census is one of the largest and longest running monitoring programmes in the world

Sources : Wetlands International (2017) *The value of counting birds for people and nature* ; LPO (2021) Base de données comptage des Oiseaux d'eau de la mi-janvier 1967-2023.




COMPTER LES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER, POURQUOI ?

Le comptage international des oiseaux d'eau se veut simultané dans chaque région géographique (Afrique-Eurasie, Asie-Pacifique, Caraïbes...). Il se déroule sur un ou deux jours, historiquement autour de la mi-janvier (fenêtre de 7 jours autour de la mi-janvier selon les contraintes locales). Le comptage se veut un instantané de la répartition des effectifs des populations d'oiseaux d'eau sur les différentes voies de migration. En effet, si les effectifs dénombrés constituent un indicateur de l'état des populations d'oiseaux d'eau et des habitats utilisés à l'échelle nationale, ils prennent davantage de sens à l'échelle de la voie de migration. Pour rappel, les comptages standardisés de Wetlands International ont débuté en 1967 et ne concernaient à l'origine que le gibier d'eau, c'est-à-dire les anatidés et la foulque (et les limicoles à partir de 1978). Ils se sont ensuite élargis progressivement à l'ensemble des espèces d'oiseaux d'eau (Laridés et espèces exogènes comprises).



Grands gravelots © Fabrice Cahez

Quelques dates clés - le début des comptages standardisés par groupe taxonomique & enquêtes annexes



Pourquoi la mi-janvier ?

Le comptage de la mi-janvier est une alternative aux comptages sur les aires de reproduction intercontinentales des espèces, comptages relativement difficiles selon l'écologie des espèces dès lors que leurs territoires sont vastes et que les couples sont difficiles à détecter. A la mi-janvier, entre la fin de la migration postnuptiale et avant que ne s'opèrent les premières remontées prénuptiales, la majorité des espèces présentes sur leurs sites d'hivernage montrent une relative stabilité spatiale. Les effectifs dénombrés sont à leurs minimums (la mortalité naturelle et cynégétique ayant fait son œuvre) ; ils sont donc les plus à même de représenter le pool d'individus susceptibles de se reproduire les années suivantes.

Publication de l'évaluation de la voie de migration est-atlantique réalisée à l'occasion du « Total Count 2023 »

Ce rapport soulève des inquiétudes quant à l'état des populations d'oiseaux d'eau migrateurs le long de la voie de migration Est-Atlantique. Si la situation demeure moins préoccupante que sur d'autres voies de migration (e.g. EAAF) 33% des populations suivies affichent des déclin. Si les pressions exercées sur les habitats humides sont généralisées le long de la voie de migration, les causes spécifiques de ces déclin sont souvent méconnues. Le rapport appelle à une collaboration internationale et à un engagement politique accru pour protéger les oiseaux migrateurs et prévenir tout nouveau déclin des populations le long de cette voie de migration. À consulter [ici](#).

Van Roomen, M., Reneerkens, J., Citegetse, G., Crowe, O., Gueye, K., Langendoen, T., Dodman, T., Meise, K. & Schekkerman, H. (2025) East Atlantic Flyway Assessment 2023. The status of coastal waterbird populations and their sites. Wadden Sea Flyway Initiative p/a CWSS, Wilhelmshaven, Germany, Wetlands International, Wageningen, The Netherlands, BirdLife International, Cambridge, United Kingdom.

Des enjeux de conservation

Les comptages des oiseaux d'eau de la mi-janvier donnent lieu à un double enjeu de conservation qui concerne à la fois les espèces elles-mêmes mais également les zones humides.

Ces comptages permettent d'estimer les tailles des populations et leurs tendances à intervalles de temps réguliers, en prenant en compte les différentes sous-espèces et populations décrites. Ces données alimentent directement les ouvrages de référence et statut de conservations des espèces d'oiseaux d'eau, comme :

- à l'échelle mondiale, le [portail sur les Populations d'Oiseaux d'eau de Wetlands International](#) ;
- à l'échelle de l'aire d'application de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) : le [Rapport sur l'état de Conservation des oiseaux d'eau migrateurs](#) ;

- à l'échelle continentale, la [Liste rouge européenne des espèces d'oiseaux menacées de disparition de BirdLife International](#) alimentée par les exercices réguliers de rapportage au titre de la Directive Oiseaux de chaque État membre de l'Union Européenne (en France coord. [MNHN Paris](#)).

Les statuts de conservation sont alors établis en lien avec les menaces et pressions spécifiques s'exerçant sur les espèces. Des plans internationaux d'action et de gestion sont actés dans le but d'enrayer les déclin spécifiques de certaines populations ou cortèges d'espèces d'oiseaux d'eau.

Du côté de la protection des zones humides, les comptages permettent également d'identifier : les sites d'intérêt international pour la conservation des oiseaux d'eau au titre de la [convention de Ramsar](#) ; Les Zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité ([IBA](#)) définies par BirdLife International ; et d'alimenter les initiatives pour la conservation des oiseaux d'eau des différentes voies de migration comme la [Wadden Sea Flyway Initiative](#) ou la [MedWet Initiative](#).





RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE

L'un des objectifs principaux du comptage international des oiseaux d'eau à la mi-janvier est de calculer les tendances de populations à l'échelle de la voie de migration sur les long (depuis le début des suivis coordonnés des groupes) et court termes (12 ans). Le dénombrement n'étant pas exhaustif, les analyses s'appuient sur deux fondements :

- 1) Pour une espèce donnée, l'échantillon d'individus comptés chaque année doit être représentatif de l'ensemble de la population.
- 2) Le comptage doit être standardisé, c'est-à-dire que chaque année, les mêmes sites doivent être suivis exactement selon le même protocole de façon à ce que les données soient comparables dans le temps et reflètent une réalité biologique plutôt qu'un artefact dû à un changement méthodologique. Ainsi, afin d'assurer la continuité de la couverture géographique des comptages au cours du temps, une fois la routine de comptage établie, c'est-à-dire les limites des zones de comptage, l'itinéraire parcouru par l'observateur et les points d'observation, elle doit être respectée chaque année, y compris lorsqu'un observateur se retire d'un site et est remplacé par un autre. Il est d'ailleurs fortement recommandé de planifier un « passage de flambeau » entre l'ancien et le nouvel observateur par un comptage en commun pour que ce dernier puisse être formé sur la routine spécifique de comptage du site. Il est parfois tentant de prospecter plus que l'observateur précédent et d'obtenir de plus gros comptages, mais cela nuit à la robustesse du suivi.

Chaque année les dates exactes du comptage de la mi-janvier sont décidées par Wetlands International pour une synchronisation globale et ce afin d'obtenir un instantané de la distribution des effectifs des espèces à l'échelle de la voie de migration. Si une tolérance de plus ou moins 7 jours autour de ces dates officielles est accordée pour adapter les dénombrements aux conditions locales, il est important de les respecter pour minimiser la probabilité de double comptage, ou de manquer des individus.

Le biais observateur

L'influence du changement d'observateurs lors de comptages sur la justesse et la précision des tendances de populations a été évaluée dans le cadre d'une thèse menée par la Tour du Valat/OFB (Vallecillo *et al.* 2021) via des simulations intégrant des données expérimentales d'erreur d'estimation de taille de groupes par des observateurs expérimentés. L'étude révèle que le changement d'observateurs réduit considérablement la précision du calcul de tendance et augmente le nombre d'années de suivi nécessaire pour une estimation précise de la tendance d'une population. Ce biais est inhérent aux observateurs et indépendant du protocole, il peut donc être amplifié lorsque la routine de comptage d'un site est modifiée. Ces résultats soulignent donc l'importance de limiter les changements d'observateurs et de standardiser au mieux les modalités de comptage pour réduire ces biais et améliorer la robustesse des tendances spécifiques. L'utilisation du module Wetlands de Faune France pour la saisie des données permet de garder une trace de tout changement d'observateurs.

Références

Vallecillo, D., Gauthier-Clerc, M., Guillemain, M., Vittecoq, M., Vandewalle, P., Roche, B. & Champagnon, J. (2021) Reliability of animal counts and implications for the interpretation of trends. *Ecology and Evolution* 11:2249–2260, DOI: <https://doi.org/10.1002/ece3.7191>.
Wetlands International & Tour du Valat (2012) Guide méthodologique pour le suivi des oiseaux d'eau: Protocole de terrain pour le comptage des oiseaux d'eau. Traduction O. Devineau (Tour du Valat) - Février 2012, pp. 15. Tour du Valat, Wetlands International. https://europe.wetlands.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/Protocol-for-waterbird-counting_FR_.pdf.



Site fonctionnel et site élémentaire

Pour les oiseaux d'eau, un **site fonctionnel** représente un espace géographique au sein duquel les individus vont pouvoir satisfaire leurs exigences écologiques de façon durable. Il englobe :

- les zones de repos (reposoirs, dortoirs ou remises), principales et alternatives, où les oiseaux satisfont leurs activités de confort (repos, toilette, parades) ;
- les zones d'alimentation, principales et alternatives, fréquentées pour l'acquisition des besoins énergétiques journaliers et situés à des distances variables ;
- les axes de déplacement entre les zones de repos et d'alimentation.

À la différence, un **site élémentaire** ne possède pas forcément une réalité écologique, mais reflète plutôt un aspect logistique du suivi puisqu'il s'agit d'une unité de comptage. Ainsi un site fonctionnel complexe peut être découpé en plusieurs sites élémentaires pour faciliter le comptage simultané par plusieurs observateurs. Ce découpage plus fin permet d'évaluer la pression d'observation à l'intérieur d'un site fonctionnel et sa continuité temporelle. Il permet également d'estimer localement les zones les plus importantes pour un site donné, information particulièrement importante pour vérifier que les espaces protégés englobent bien l'ensemble des secteurs importants pour les oiseaux d'eau migrants.

Pour les sites fonctionnels complexes, la synchronisation du comptage des sites élémentaires est indispensable afin d'éviter les doubles comptages en cas de mouvement des oiseaux d'un secteur à un autre.


Il est aussi essentiel de rapporter les comptages nuls afin de faire la distinction entre les sites non-comptés (absence de données) et les sites visités mais pour lesquels aucune espèce n'était présente (comptage nul).

Réserve Naturelle de Moëze © Philippe Delaporte



LE RÉSEAU DES ZONES HUMIDES DÉNOMBRÉES À LA MI-JANVIER

523 sites
comptés régulièrement



Sites du réseau de comptage de la mi-janvier 2025, totaux des effectifs d'oiseaux d'eau dénombrés et identification des zones humides d'importance internationale (cercle bleu ; moy. 2021-2025)
French waterbird census sites. Total number of waterbirds counted during the 2025 mid-January census in France and location of sites meeting criteria for international importance (blue circle; mean 2021-2025)

Les zones humides Wetlands en chiffres

- 523 sites fonctionnels comptés régulièrement*
 - 493 sites comptés en 2025 soit une couverture de 94 % près de 7 000 sites élémentaires comptés
 - 45 sites répondant aux « critères d'importance internationale » pour les oiseaux d'eau (moy. 2021-2025)
- *549 sites au total mais 26 sont considérés « abandonnés » car non comptés depuis plus de 10 ans.

ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE POUR LES OISEAUX D'EAU (MI-JANVIER 2021-2025)

Sites du réseau de comptage Wetlands	> 20 000 oiseaux d'eau	Cygne tuberculé	Bernache cravant	Bernache à ventre pâle	Tadorne de Belon	Nette rousse	Fuligule milouin	Canard souchet	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard colvert	Canard pilet	Sarcelle d'hiver	Flamant rose	Spatule blanche	Ibis faïcinelle	Grue cendrée	Héron garde-bœufs	Aigrette garzette	Avocette élégante	Pluvier argenté	Grand Gravelot	Barge rousse	Barge à queue noire	Tournepierrre à collier	Bécasseau maubèche	Bécasseau variable	Goéland marin
Nb sites	26	1	12	1	5	3	6	13	3	1	2	7	4	3	1	1	10	1	1	7	6	3	1	6	2	5	6	1
HAUTS-DE-FRANCE																												
Littoral Picard	•							•																				
NORMANDIE																												
Estuaire Seine	•																											
Littoral Seino-Marin																												•
Baie des Veys	•																											
Les Marais du Cotentin et du Bessin	•						•	•																				
La côte ouest du Cotentin				•																								
ÎLE-DE-FRANCE																												
Autres sites - 77 (Seine-et-Marne)						•																						
GRAND EST																												
Lac du Der-Chantecoq (51/52)	•						•		•			•	•				•											
Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon	•						•						•															
Cours du Rhin (67/68)	•								•																			
BRETAGNE																												
Baie du Mont-Saint-Michel	•		•		•			•										•								•	•	
Estuaires de Trieux, Jaudy et Anse de Paimpol			•																									
Baie de St-Brieuc-Yffiniac-Morieux			•																									
Baie de Quiberon			•																									
Golfe du Morbihan	•		•					•				•						•						•			•	
Baie de Vilaine	•																											
PAYS-DE-LA-LOIRE																												
Presqu'île Guérandaise dont Traicts du Croisic	•		•		•			•										•	•						•			
Loire Aval	•							•					•						•									
Lac de Grandlieu	•						•	•																				
Baie de Bourgneuf et Noirmoutier	•		•															•	•				•	•		•		
Baie de l'Aiguillon et Pointe d'Arçay	•		•		•			•				•						•	•					•	•	•	•	
Marais Breton								•																				

Identification des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau (moyenne mi-janvier 2021-2025) selon les critères 5 (≥20 000 oiseaux d'eau) et 6 (≥1% de la population biogéographique d'une espèce ou sous-espèce) de la convention de Ramsar
Sites meeting criteria 5 and 6 of the Ramsar Convention for international importance (mean 2021-2025)

Sites du réseau de comptage Wetlands	> 20 000 oiseaux d'eau	Cygne tuberculé	Bernache cravant	Bernache à ventre pâle	Tadorne de Belon	Nette rousse	Fuligule milouin	Canard souchet	Canard chipeau	Canard siffleur	Canard colvert	Canard pilet	Sarcelle d'hiver	Flamant rose	Spatule blanche	Ibis falcinelle	Grue cendrée	Héron garde-bœufs	Aigrette garzette	Avocette élégante	Pluvier argenté	Grand Gravelot	Barge rousse	Barge à queue noire	Tournepieuvre à collier	Bécasseau maubèche	Bécasseau variable	Goéland marin
Nb sites	26	1	12	1	5	3	6	13	3	1	2	7	4	3	1	1	10	1	1	7	6	3	1	6	2	5	6	1
CENTRE-VAL DE LOIRE																												
Etangs de Brenne	•						•	•																				
Autres sites 18 (Cher)																	•											
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ																												
RNR Loire Bourguignonne																	•											
NOUVELLE AQUITAINE																												
Île de Ré	•		•																		•	•			•			
Marais littoraux de Charente-Maritime, dont R.N. d'Yves	•							•																		•		
Réserve Naturelle de Moëze (Charente-Seudre)	•		•	•				•				•								•	•			•		•	•	
Côtes Nord et Ouest de l'île d'Oléron			•																									
Côte Médocaine																						•						
Etang de Carcans-Hourtin et R.N. de l'étang de Cousseau																	•											
Bassin d'Arcachon	•		•																	•	•				•			•
Autres sites 33 (Gironde)	•											•					•				•				•			
Reserve Nationale de Faune d'Arjuzanx																	•											
Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx												•																
Autres sites 40 (Landes)	•																•											
Autres sites - 64 (Pyrénées-Atlantiques)																		•										
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES																												
Reserve Naturelle du Val d'Allier																	•											
Dombes-Vallée de l'Ain	•						•				•	•																
Lac du Bourget						•																						
OCCITANIE																												
Lac de Puydarrieux																	•											
Etangs du Narbonnais														•														
Etangs Montpelliérains (34+30)	•														•													
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR																												
Camargue	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•								•	
Complexe de l'étang de Berre	•																											

Identification des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau (moyenne mi-janvier 2021-2025) selon les critères 5 (≥20 000 oiseaux d'eau) et 6 (≥1% de la population biogéographique d'une espèce ou sous-espèce) de la convention de Ramsar
Sites meeting criteria 5 and 6 of the Ramsar Convention for international importance (mean 2021-2025)



CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DU DÉNOMBREMENT DE 2025

Contrairement à janvier 2024, marqué par un épisode hivernal durable, la mi-janvier 2025 a connu des conditions globalement favorables. Le mois de janvier 2025 a présenté un contraste marqué entre un début très perturbé et humide succédant à un mois de décembre déjà perturbé et doux, un épisode froid anticyclonique - amenant un temps sec et froid - autour du week-end officiel de comptage (11–12 janvier) avec de fortes gelées matinales jusqu'au 20, puis une fin de mois à nouveau dominée par les perturbations atlantiques. La région méditerranéenne n'a pratiquement pas été touchée par cet épisode de froid. Seule la Corse a connu des pluies intenses liées à la dépression Gabri du 18 au 20.


Ces conditions autour de la date du comptage officiel ont néanmoins été de courte durée et sans gel généralisé des plans d'eau. Les conditions de comptage ont ainsi été jugées globalement favorables par les observateurs (90 % des sites) : glace et neige quasi-absentes ; niveaux d'eau « normaux » ; et visibilité globalement bonne.

À l'échelle de l'Europe, les conditions ont varié selon les régions. Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, la séquence froide de mi-janvier s'est accompagnée de brouillards fréquents et de givre matinal, réduisant la visibilité et retardant parfois les comptages. En Belgique, la période est restée fraîche et couverte, tandis qu'en Allemagne elle a été plutôt douce et lumineuse, seules quelques gelées et brouillards matinaux ayant pu gêner localement. L'Europe centrale et balkanique a connu un épisode hivernal marqué (neige abondante, gel durable), alors que le pourtour méditerranéen est demeuré doux et sec.

L'indice NAO reflète bien cette dynamique : positif en décembre 2024 (+1,21) puis légèrement négatif en janvier 2025 (-0,52). Cette bascule a favorisé un blocage anticyclonique en Europe occidentale, propice au froid radiatif et aux brouillards durant la période de comptage. Contrairement à janvier 2024 (NAO très négative, froid durable et généralisé), l'épisode 2025 est resté bref, expliquant l'absence de gel massif des zones humides françaises mais des perturbations plus nettes chez nos voisins du Nord-Ouest.

Sources : Bilan climatique de l'hiver 2024-2025 de Météo-France, ECMWF Copernicus Climate Change Service, State of the European Climate: Climate bulletin January 2025

Anomalie de la température de l'air en surface pour janvier 2025 par rapport à la moyenne de janvier pour la période 1991-2020 dans le monde et en Europe.
Source des données : ERA5. Crédit : C3S/ECMWF - Surface air temperature anomaly for January 2025 relative to the January average for the period 1991-2020.
Data source: ERA5. Credit: C3S/ECMWF. ECMWF Copernicus Climate Change Service.





BILAN GLOBAL DES DÉNOMBREMENTS DE LA MI-JANVIER 2025

Effectifs totaux dénombrés en 2025

Avec 2,5 millions d'oiseaux d'eau dénombrés sur 493 sites fonctionnels, 2025 s'inscrit au plus bas de la décennie mais révèle des contrastes marqués selon les groupes : reculs chez plusieurs anatidés, record historique pour le Canard souchet, et nouveaux sommets pour le Flamant rose et la Spatule blanche.

Chez les **anatidés**, les effectifs sont en baisse par rapport à 2024 (-10 %), se situant dans la moyenne basse de la décennie. Dans ce contexte global en retrait, 2025 combine replis marqués pour plusieurs canards de surface et records pour quelques espèces. La **Foulque macroule** fait toutefois exception progressant de +17 % par rapport à l'an dernier, tandis que le **Canard colvert** continue de décliner, à l'exception de la PACA et de la Nouvelle-Aquitaine où ses effectifs se maintiennent. Le déclin est particulièrement marqué dans le Grand Est (seulement 2 292 individus au lac du Der-Chantecoq, -41 % vs. 2024) et en Auvergne-Rhône-Alpes (9398 ind. en Dombes-vallée de l'Ain, -51 %). Les effectifs du **Canard siffleur** (-27 %) et du **Canard chipeau** (-25%) restent faibles, tout comme ceux des **Fuligules milouin** et **morillon** en déclin continu. À l'inverse, avec près de 65 200 individus, le **Canard souchet** atteint un record depuis le début des comptages, en particulier dans les Pays de la Loire (7 600 ind. en Brière) et en Camargue (14 600 ind.). Les effectifs sont également élevés pour le **Canard pilet**, cinquième valeur depuis 1967, notamment sur le centre-ouest (île de l'Estuaire Gironde, Moëze-Oléron, littoral de La Rochelle), et pour le **Tadorné de Belon**, notamment dans les Pertuis charentais et en Camargue.

Dans un contexte de déclin continu, les grèbes présentent des tendances contrastées : le **Grèbe huppé** affiche des effectifs particulièrement bas (26 000 ind., quatrième valeur la plus faible), tandis que le **Grèbe castagneux** se maintient dans la moyenne haute avec plus de 10 000 individus. Les effectifs de plongeurs, quant à eux, se maintiennent.

Les effectifs de **Ibis falcinelle**, de **Spatule blanche** et de **Flamant rose** poursuivent leur nette progression (+9 % vs. 2024), atteignant des niveaux jamais observés à la mi-janvier. La population méditerranéenne de Flamant rose (55 260 ind., +11 %) et celle de Spatule blanche (2 746 ind., +8 %) sont au plus haut, tandis que l'Ibis falcinelle, dont le principal noyau demeure en Camargue, poursuit son expansion le long de la façade atlantique, notamment en Nouvelle-Aquitaine.

Chez le groupe des rallidés et de la Grue, les effectifs de **Grue cendrée** se révèlent modestes, confirmant les tendances

déjà relevées par le Réseau Grues (coord. LPO Champagne-Ardenne) qui dénombre près de 138 000 individus. Les conditions météorologiques perturbées en décembre et début janvier (départs accélérés vers le sud-ouest), inondations locales, redistribution des dortoirs, et absence de gros contingents tardifs, expliqueraient en partie ce déficit. La Camargue se distingue cependant par un record d'hivernage, contrastant avec les reculs observés en Lorraine, en Champagne et dans le Centre.

La **Cigogne blanche** continue sa progression (+12 %), portée par les populations du pourtour méditerranéen et de la façade atlantique. Les ardéidés confirment également leur dynamique positive, en particulier le **Héron garde-bœufs** et la **Grande Aigrette**, avec une progression marquée en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Occitanie.

Les **limicoles** totalisent près de 800 000 individus, un effectif qui demeure dans la fourchette basse. Les **Bécasseau variable** (~280 000 ind.), **Pluviers doré et argenté**, **Bécasseau maubèche** et **Barge rousse** présentent des effectifs faibles. On note cependant un record pour le **Chevalier gambette** (~7 800 ind.) et la poursuite de la progression, bien que sur de faibles effectifs, de plusieurs espèces comme les **Chevaliers culblanc**, **aboyeur**, **guignette**, **arlequin**, ainsi que du **Gravelot à collier interrompu**.

Enfin, les **Laridés** accusent un net recul avec seulement 328 700 individus, le plus bas effectif de la série (-140 000 par rapport aux années 2020). La **Mouette rieuse**, espèce clé des dénombrements, reste à un niveau historiquement bas, tout comme la **Mouette mélanocéphale**, le **Goéland brun** et le **Goéland marin**. Ce creux de la mi-janvier 2025 ne semble pas lié à une nouvelle hécatombe printanière liée à la grippe aviaire comme en 2024, mais pourrait traduire surtout les pertes massives de 2022-2023 (et possiblement certains événements de l'automne 2024), conjuguées à un recrutement très affaibli en 2024 et à des contingents d'hivernants durablement réduits.

Au total, **47 sites** atteignent en 2025 les critères de zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau (-8 vs. 2024). Si le nombre de sites dépassant 20 000 individus (critère 5) se maintient (+1), le nombre de sites d'importance pour les populations (critère 6) régresse (-9), en lien avec la baisse des effectifs rapportés et une concentration moindre de certaines espèces par rapport à l'an passé.



Hérons garde-boeufs © David Allemand

Cette année, la date officielle du comptage Wetlands International était fixée aux 11 et 12 janvier 2025



Les tendances et résultats des comptages détaillés de chaque espèce sont disponibles dans les annexes techniques du comptage des oiseaux d'eau à la mi-janvier 2025.

Effectifs totaux dénombrés	mi-janvier 2025		2024	2023	2022	2021	2020
Anatidés & Foulque	1 022 838	(-)	1 132 134	1 010 052	1 039 898	1 116 961	1 052 055
Plongeurs & Grèbes	44 799	(-)	44 839	47 607	59 211	50 010	50 149
Ibis, Spatules & Flamants	63 295	(+)	57 996	56 349	57 146	54 464	57 336
Rallidés & Grue	124 238	(-)	159 392	163 461	148 429	126 236	120 391
Cigognes	3 294	(+)	3 085	1 575	2 259	2 032	1 522
Ardéidés	62 321	(+)	53 959	52 557	48 506	43 102	55 686
Cormorans	73 706	(=)	84 655	77 996	69 026	79 169	77 169
Limicoles	780 840	(=)	691 685	935 331	825 647	842 623	979 059
Laridés	328 723	(-)	345 506	411 865	374 860	440 769	475 361
TOTAL "Oiseaux d'eau"	2 504 054	(-)	2 573 251	2 756 793	2 624 982	2 755 366	2 868 728

Effectifs totaux d'oiseaux d'eau dénombrés à la mi-janvier 2025
Total numbers of waterbirds counted during the 2025 mid-January census

TENDANCES QUANTITATIVES DES EFFECTIFS D'OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER

La progression du nombre de sites de comptage depuis 1967 nécessite d’appliquer des analyses qui prennent en compte l’absence de données de comptage sur certains sites, certaines années. Des méthodes et outils d’analyse de tendance dédiés, prenant en considération les autres spécificités de la distribution des données de comptage, sont alors utilisés pour estimer les incertitudes sur les estimations de tendances propres à chaque espèce. Le tableau ci-dessous résume

les effectifs dénombrés en 2025 et les résultats des analyses de tendances (sur le long-terme et le court-terme) de près de 70 des principales espèces d’oiseaux d’eau suivies à la mi-janvier en France. La tendance à court-terme est donnée sur les 12 dernières années, soit 2013-2025 ; la tendance à long-terme à partir de 1980 (anatidés, foulque et limicoles) ou depuis le début des suivis standardisés de chaque groupe (autres taxons depuis 1993).

ORDRE Espèces		Mi-janvier 2025		Tendances 12 dernières années			Tendances long-terme		
		Totaux	Nb sites	Dir.	Magn. ±ES		Dir.	Magn. ±ES	
ANSERIFORMES									
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	24 956	322	↗	+2%	±0%	↗+	+7%	±0%
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	91	5	↗?	-2%	±2%	↗+	+7%	±1%
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	232	9	↗?	-3%	±1%	↗	+6%	±0%
Bernache cravant à ventre sombre	<i>Branta bernicla bernicla</i>	92 401	66	→	-0.1%	±1%	↗	+1%	±0%
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	9 674	85	↘	-4%	±1%	↗+	+7%	±0%
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	2 754	6	↗?	+4%	±2%	↘	-1%	±0%
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	249	8	↘	-5%	±2%	↗	+3%	±0%
Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	5	3	↗?	-1%	±5%	→	-1%	±1%
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>	375	20	↗?	+3%	±4%	↘+	-6%	±0%
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	175	24	↗?	-2%	±3%	↘+	-6%	±0%
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	16 140	37	→	-0.1%	±1%	↘	-1%	±0%
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	496	35	↘+	-10%	±1%	↘	-2%	±0%
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>	78	13	↘	-8%	±1%	↘	-1%	±0%
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	2 851	69	↗	+3%	±1%	↗	+3%	±0%
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	1 343	45	↘	-6%	±1%	↘	-1%	±0%
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	64 430	202	↗	+2%	±0%	↗	+2%	±0%
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	6 618	55	↗	+4%	±1%	↗	+2%	±0%
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	45 055	274	↘	-4%	±1%	↘	-1%	±0%
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	60	15	↗?	+1%	±2%	↗	+5%	±1%
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	25 037	245	↘	-4%	±1%	↘	-2%	±0%
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	59	17	↘	-11%	±4%	↘+	-10%	±0%
Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>	65 120	262	↗	+3%	±1%	↗	+2%	±0%
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>	25 656	224	↘	-1%	±0%	↗	+2%	±0%
Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i>	31 592	193	↘	-2%	±1%	↘	-0.4%	±0%
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	201 833	458	↘	-2%	±0%	→	-0.1%	±0%
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	24 814	135	↗	+5%	±1%	↗	+0.4%	±0%
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	141 716	339	↗	+3%	±1%	↗	+2%	±0%

Dir. : Direction (↗Augmentation, → Stable, ↘ Déclin, ~? Fluctuant/Incertain) ; Magn. : Magnitude en % par an et ±ES son erreur standard

Effectifs totaux dénombrés à la mi-janvier 2025, nombre de sites en présence et tendances à court et long termes de 70 espèces d’oiseaux d’eau régulières
Total numbers of Waterbirds recorded in France in mid-january 2025, number of sites, and short- (12 years) and long- term (since 1980 or earlier ; 1993 for non Anatidae/Coot/Shorebirds species) population trends

ORDRE Espèces		Mi-janvier 2025		Tendances 12 dernières années			Tendances long-terme		
		Totaux	Nb sites	Dir.	Magn. ±ES		Dir.	Magn. ±ES	
PODICIPEDIFORMES ET PHOENICOPTERIFORMES									
Grèbe castagneux	Tachybaptus ruficollis	10 170	344	➡	-1%	±0%	↗	+2%	±0%
Grèbe jougris	Podiceps grisegena	10	8	~?	-1%	±4%	↘	-6%	±1%
Grèbe huppé	Podiceps cristatus	25 999	387	↘	-4%	±0%	↘	-0.5%	±0%
Grèbe esclavon	Podiceps auritus	153	33	↘	-8%	±1%	↘	-2%	±0%
Grèbe à cou noir	Podiceps nigricollis	4 562	95	↘	-7%	±1%	↘	-3%	±0%
Flamant rose	Phoenicopterus roseus	55 260	18	↗	+3%	±1%	↗	+2%	±0%
GRUIFORMES									
Foulque macroule	Fulica atra	224 149	403	↘	-3%	±0%	↗	+1%	±0%
Grue cendrée	Grus grus	113 296	40	↗	+5%	±1%	↗+	+9%	±1%
GAVIIFORMES									
Plongeon catmarin	Gavia stellata	2 042	47	↗+	+8%	±1%	↗+	+13%	±1%
Plongeon arctique	Gavia arctica	252	29	↗	+4%	±1%	➡	+0.1%	±0%
Plongeon imbrin	Gavia immer	310	61	↗	+5%	±1%	↗	+4%	±0%
PELECANIFORMES									
Spatule blanche	Platalea leucorodia	2 748	64	↗+	+9%	±1%	↗+	+12%	±1%
Cigogne blanche	Ciconia ciconia	3 284	72	↗+	+11%	±1%	↗+	+11%	±1%
Bihoreau gris	Nycticorax nycticorax	553	35	↗+	+12%	±2%	↗+	+10%	±1%
Héron garde-boeufs	Bubulcus ibis	30 504	162	↗+	+10%	±1%	↗+	+7%	±1%
Héron cendré	Ardea cinerea	11 524	432	➡	-0.1%	±0%	↗	+1%	±0%
Grande Aigrette	Ardea alba	9 299	348	➡	+0.2%	±0%	↗+	+14%	±0%
Aigrette garzette	Egretta garzetta	10 416	266	➡	-0.2%	±0%	↗	+0.4%	±0%
CHARADRIIFORMES									
Huîtrier pie	Haematopus ostralegus	44 745	73	➡	+0.3%	±1%	➡	-0.2%	±0%
Avocette élégante	Recurvirostra avosetta	22 058	50	↘	-2%	±1%	↗	+1%	±0%
Pluvier argenté	Pluvialis squatarola	31 938	74	➡	+0.1%	±1%	↗	+1%	±0%
Grand Gravelot	Charadrius hiaticula	12 843	81	➡	-2%	±1%	↗	+2%	±0%
Gravelot à collier int.	Charadrius alexandrinus	942	26	↗+	+13%	±2%	↗	+4%	±0%
Courlis corlieu	Numenius phaeopus	54	18	~?	+5%	±3%	↗	+8%	±2%
Courlis cendré	Numenius arquata	26 473	98	↘	-2%	±0%	↗	+1%	±0%
Barge rousse	Limosa lapponica	5 620	43	↘	-3%	±1%	↗	+1%	±0%
Barge à queue noire	Limosa limosa	37 120	37	↗	+3%	±1%	↗	+5%	±0%
Tournepierre à collier	Arenaria interpres	25 804	87	➡	-1%	±1%	↗+	+7%	±0%
Bécasseau maubèche	Calidris canutus	31 513	24	➡	+1%	±1%	↗	+3%	±0%
Combattant varié	Calidris pugnax	330	17	~?	-3%	±2%	➡	+1%	±0%
Bécasseau sanderling	Calidris alba	28 682	72	↘	-2%	±1%	↗+	+8%	±0%
Bécasseau variable	Calidris alpina	282 194	101	➡	+1%	±1%	↗	+0.3%	±0%
Bécasseau violet	Calidris maritima	1 051	33	➡	+0.3%	±1%	↗	+4%	±1%
Bécasseau minute	Calidris minuta	1 437	15	➡	-1%	±1%	↗	+3%	±1%
Chevalier guignette	Actitis hypoleucos	905	127	↗	+5%	±1%	↗+	+6%	±0%
Chevalier culblanc	Tringa ochropus	1 018	157	↗	+4%	±1%	↗+	+9%	±1%
Chevalier arlequin	Tringa erythropus	545	27	➡	-0.3%	±1%	↗	+5%	±0%
Chevalier aboyeur	Tringa nebularia	1 011	55	↗	+5%	±1%	↗+	+9%	±1%
Chevalier gambette	Tringa totanus	7 789	64	➡	+1%	±1%	↗	+1%	±0%


Dir. : Direction (↗Augmentation, → Stable, ↘ Déclin, ~? Fluctuant/Incertain) ; Magn. : Magnitude en % par an et ±ES son erreur standard

Effectifs totaux dénombrés à la mi-janvier 2025, nombre de sites en présence et tendances à court et long termes de 70 espèces d’oiseaux d’eau régulières
Total numbers of Waterbirds recorded in France in mid-january 2025, number of sites, and short- (12 years) and long- term (since 1980 or earlier ; 1993 for non Anatidae/Coot/Shorebirds species) population trends

Les comptages Wetlands alimentent l'indicateur « Évolution des populations d'oiseaux d'eau hivernants » construit pour l'ONB


Extrait de la fiche indicateur - Depuis le début des comptages Wetlands International en 1967, les conventions internationales et lois de protection de la nature ont considérablement amélioré la protection des oiseaux d'eau et des zones humides (1971: Convention de Ramsar, 1976: loi de protection de la Nature instaurant leur protection légale, 1979: Directive UE «Oiseaux» ; création des réserves naturelles...). Leur persécution a été fortement réduite dès les années 1970, parallèlement à l'augmentation des espaces protégés, à une plus grande disponibilité

d'habitats d'alimentation protégés, et aussi à des hivers moins rigoureux. Comme ailleurs en Europe, les oiseaux d'eau ont profité en France de ces mesures de conservation. Concomitamment à l'essor de leurs populations reproductrices et de leurs aires de répartition, les effectifs de certains groupes ont particulièrement progressé en hivernage, comme les ardéidés, la Grue, la Cigogne blanche ou la Spatule blanche. Cette progression nationale ne résulte donc pas uniquement de l'évolution de l'état des zones humides en France, mais aussi des mesures prises ailleurs sur leurs voies de migration, des tendances globales des populations, de redistributions et des changements globaux. Les espèces protégées voient leurs effectifs augmenter plus rapidement que les espèces gibiers. Depuis le début de leurs suivis respectifs, les «grands échassiers» sont ceux qui montrent la plus forte progression (+1611%), suivis par les limicoles (+206%), les anatidés (+73%) et les plongeurs et grèbes (+50%).



Les oiseaux d'eau ont progressé de 135% entre 1980 et 2025

Piloté par l'Office français pour la Biodiversité et le Ministère de la Transition Ecologique, l'Observatoire National de la Biodiversité (ONB) met à la disposition de tous des informations précises et documentées sur la biodiversité en France et ses interactions avec la société française. Depuis 2020, le comptage Wetlands vient alimenter un nouvel indicateur du groupe thématique Zones humides, en renseignant l'évolution des populations d'oiseaux d'eau hivernants en France métropolitaine.



Note : Moyenne géométrique pondérée des indices de n=66 espèces d'oiseaux d'eau régulières et abondantes ; le taux d'évolution entre 1980 et 2025 est basé sur la différence entre l'indice 1980 et 2025.

ONB Observatoire National de la Biodiversité
Visual ONB, d'après : Origine des données : LPO France
Traitements : LPO France, Octobre 2025.

Pour en savoir plus

- L'indicateur « évolution des populations d'oiseaux d'eau hivernants » : <https://naturefrance.fr/indicateurs/evolution-des-populations-doiseaux-deau-hivernants>
- Les indicateurs et publications de l'ONB : <https://naturefrance.fr>

ONB
Observatoire National
de la Biodiversité



Grues cendrées © Fabrice Cahez



ZOOM SITE : « LA PRESQU'ÎLE GUÉRANDAISE »

Martine Maillard¹, Matthieu Marquet², Didier Montfort³, Olivier Pénard⁴ et Jean-Michel Vailhen¹


¹LPO 44, ²Parc Naturel Régional de Brière, ³Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique, ⁴Département de Loire-Atlantique

Présentation du site

En organisant les comptages Wetlands de tout le département de Loire-Atlantique en 1992, Jo Pourreau a rassemblé dans « La Presqu'île guérandaïse », en plus du linéaire de la côte d'Amour

et d'étangs intérieurs, le Pays Blanc (zones humides 1 et 2) et le Pays Noir (zones humides 3 et 4 le bassin du Brivet). Il leur a ajouté l'île Dumet (5).

Ce faisant, le site est devenu primordial en Loire-Atlantique pour le nombre d'oiseaux d'eau comptés à la mi-janvier (moy. ~57 000 ind. ; 33%), devançant même le lac de Grand-Lieu.



Localisation des secteurs dénombrés (cyan) à la mi-janvier sur le site fonctionnel « Presqu'île guérandaïse » englobant en plus du linéaire de côté : (1) le Traict de Mesquer et marais du Mès ; (2) le Traict du Croisic, marais salants de Guérande ; (3) les marais de Brière ; (4) le marais du Brivet ; et (5) l'île Dumet.




1 Traict de Mesquer et marais du Mès

Les marais du Mès s'organisent le long du seul « fleuve » côtier d'importance - 20 km - entre Loire et Vilaine. Il prend sa source sur le flanc nord du coteau de Guérande et, après un trajet sud-nord, s'oriente vers l'ouest pour se jeter dans la baie de Vilaine entre les pointes de Merquel et de Pen-bé. Le bassin versant de près 15 000 ha explique la succession amont-aval de zones douces, saumâtres et marines. Les premières jouxtant la Brière, les dernières formant une vaste vasière (traict) d'environ 400 ha - accueillant à marée basse les migrateurs et hivernants qui viennent s'y nourrir - bordée de marais salants (260 ha) en exploitation, transformés en bassins ostréicoles ou aménagés pour la chasse. La variété des habitats offre une complémentarité de milieux favorables aux hivernants. La baie de Pont-Mahé au nord de l'embouchure est une zone de gagnage complémentaire sur une vaste slikke. On y trouve les mêmes espèces que dans les traicts et marais de Guérande - avec lesquels il y a de nombreux échanges - mais dans des proportions différentes, les anatidés et le Courlis cendré pouvant y être proportionnellement plus nombreux. Si le site fait l'objet de plusieurs classements - Natura 2000, ZPS/ZSC, RAMSAR - il n'abrite aucune réserve. L'augmentation de la fréquentation touristique toute l'année et la chasse engendrent un dérangement de plus en plus prégnant surtout sur la partie marine.

2 Traicts du Croisic, Marais salants de Guérande

Ce secteur d'importance s'étend au pied du coteau de Guérande sur 700 ha d'estran sablo-vaseux - communiquant avec la mer par l'étroit goulet du Croisic - et 1650 ha de marais salants endigués. Le grand nombre d'oiseaux recensés en janvier - moyenne de 28 000 sur les 4 dernières années dont 75% de limicoles - s'explique par la forte productivité naturelle des plans d'eau peu profonds gérés majoritairement en production salicole (17 000 t/an) par 330 paludiers qui contribuent à une gestion hydraulique favorable aux cycles biologiques. Si l'estran est principalement utilisé pour l'alimentation, les marais jouent - en fonction des niveaux d'eau qui y sont maintenus - un double rôle de



Importance de chaque secteur en nombre total d'oiseaux d'eau dénombrés à la mi-janvier 2025.

lieu de repos et de gagnage pour les limicoles, anatidés et ardéidés. Une surface importante de l'estran (208 ha) est consacrée à l'élevage de bivalves (coques, huîtres, moules, palourdes). Le site bénéficie des mêmes classements que les marais du Mès auxquels s'ajoute une RCFS de 500 ha quasi-totalement située sur l'estran. L'état en a confié en 2024 la gestion exclusive à la FDC de Loire-Atlantique en limitant l'accès aux activités de loisirs - promenades/pêche à pied/sports nautiques - en hiver essentiellement. Il est regrettable qu'il n'ait pas été tenu compte des besoins biologiques des espèces en ne prenant pas aussi des mesures pour limiter le dérangement au niveau des reposoirs de pleine mer situés dans la zone endiguée. Les menaces concernent essentiellement le dérangement par la chasse - au sud et sur le pourtour de la réserve - et les promeneurs. S'y ajoute une évolution des pratiques salicoles consistant en un assec hivernal annuel et prolongé des « vasières » (bassins de stockage d'eau) qui impacte leur productivité naturelle. Si cette pratique était amenée à se généraliser, elle ne serait pas sans conséquences sur les capacités d'accueil du site.



ZOOM SITE : « LA PRESQU'ÎLE GUÉRANDAISE »

Martine Maillard¹, Matthieu Marquet², Didier Montfort³, Olivier Pénard⁴ et Jean-Michel Vailhen¹

¹LPO 44, ²Parc Naturel Régional de Brière, ³Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique, ⁴Département de Loire-Atlantique

3 Marais indivis de la Grande Brière Mottière

Les marais de Brière sont officiellement classés Site Ramsar depuis février 1995 et sites Natura 2000 (zone de protection spéciale) au titre de la Directive « Oiseaux » depuis 2006. Au sein de ces marais, le marais indivis briéron est l'une des grandes unités hydrauliques du bassin du Brivet. Il en constitue la cuvette la plus basse, la plus palustre et la plus sauvage. Propriété collective, indivise et inaliénable des briérons depuis le XVIII^e siècle, il est géré depuis 1838 par la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière (CSGBM) et s'étend sur presque 7000 ha. Son exutoire principal jouxte l'estuaire de la Loire, à proximité du débouché du Brivet sous le pont de Saint-Nazaire. La chasse y est autorisée toute la semaine en saison, à l'exception de deux réserves de la CSGBM dont les surfaces respectives sont de 601 ha et de 210 ha. Elles sont classées RNR et co-gérées par le PNR de Brière et la CSGBM. Les effectifs d'oiseaux d'eau sur ces deux entités de la RNR, auxquelles s'ajoute l'entité Pierre Constant (24 ha) à Saint-Malo-de-Guersac, y augmentent progressivement de la fin de l'été jusqu'au milieu de l'hiver pour atteindre un pic en février (autour de 6 000 individus en moyenne pour la période 2016 à 2024). En moyenne 86% des effectifs y sont constitués par les canards de surface. Le Canard souchet, la Sarcelle d'hiver, le Canard colvert et le Canard chipeau en sont les principaux représentants. Pour la Sarcelle d'hiver, la population atteint son pic d'effectif en janvier (4 700 en 2024), alors que pour le Canard souchet, les effectifs bondissent en deuxième partie d'hiver (plus de 10 000 en février 2022). Les effectifs d'anatidés stationnant en hiver dans la RNR représentent environ 78% du total des canards dénombrés lors des comptages Wetlands sur la totalité des marais du bassin du Brivet (zones 3 et 4). Le rôle de la RNR comme zone de halte migratoire pour des espèces comme la Spatule blanche mérite d'être souligné. Les effectifs les plus importants (300 individus) sont recensés en période prénuptiale et postnuptiale.

4 Marais privés du bassin du Brivet

Les marais privés du pays briéron représentent environ 13 000 hectares de zones humides, prairies inondables mais aussi roselières, cariçaies et boisements hygrophiles. Ils sont pour l'essentiel situés dans le lit majeur de la rivière principale de Brière, le Brivet, dont le bassin versant couvre

800 km² entre l'estuaire de la Vilaine et l'estuaire de la Loire. Leurs capacités d'accueil des oiseaux d'eau hivernants sont étroitement liées à leur niveau de submersion par les crues plus ou moins facilement évacuées selon leur ampleur par les vidanges opérées par le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB). L'impact des dérangements liés notamment à la chasse est un autre facteur influençant plus ou moins fortement les stationnements des oiseaux selon les années. Lorsque les conditions hydrauliques sont favorables, l'avifaune aquatique y est majoritairement représentée par les canards de surface, les foulques, les vanneaux, les bécassines, les laridés et les grands échassiers. Sur le plan fonctionnel, ce sont des zones de gagnage nocturne importantes pour les anatidés en provenance de la Basse-Loire voisine ou de la Presqu'île guérandaïse.

5 Île Dumet

Seule île maritime de Loire-Atlantique, l'île Dumet se situe au large de Piriac-sur-Mer et au sein du périmètre Natura 2000 « Mor Braz ». Propriétaire de l'île depuis 1992 (pour sa partie terrestre), le Conservatoire du littoral a confié sa gestion au Département et à la commune de Piriac-sur-Mer depuis 2013. Ce site unique de huit hectares abrite une grande diversité d'oiseaux qui s'y réunissent tant en période hivernale qu'en intersaison, comme zone d'abri et d'alimentation pour l'Eider à duvet (284 ind. dénombrés à la mi-janvier 2025) – le Mor Braz constituant le dernier bastion de la petite population nicheuse française de l'espèce –, les plongeurs imbrin et catmarin, les laridés, le Cormoran huppé et le Bécasseau violet. Avec ses paysages préservés, l'île Dumet attire également chaque été de très nombreux plaisanciers. Pour protéger les oiseaux de tout dérangement, toute l'année et notamment durant leur période critique de reproduction, un arrêté inter-préfectoral de protection du biotope (APPB) a été signé le 28 février 2024. Celui-ci permet d'interdire l'accès à l'île Dumet et ses abords maritimes du 1^{er} mars au 31 juillet inclus. Le reste de l'année, seule une zone restreinte de l'île (les deux plages principales) est accessible.

Liste des associations et structures gestionnaires d'espaces naturels participant aux comptages en Presqu'île guérandaïse :
Bretagne Vivante (S.E.P.N.B.), C.P.N. des Landes (Saint-Nazaire), C.P.N. les Mulots Chevelus (Saint-Nazaire), C.S.G.B.M. (Commission Syndicale de Grande Brière Mottière), Département de Loire-Atlantique, G.N.L.A. (Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique), L.P.O. 44 (Ligue pour la Protection des Oiseaux - Délégation de Loire-Atlantique) & P.N.R.B. (Parc Naturel Régional de Brière).

Histoire et organisation des comptages

Les premiers comptages de limicoles côtiers à la mi-janvier furent entrepris dès 1975 par le Groupe Ornithologique de Loire-Atlantique (GOLA), pour le Bureau International de Recherche sur les Oiseaux d'eau et les Zones Humides (BIORE), sous la houlette de Patrice Boret. Puis en 1993, Jo Pourreau organisa les comptages dans la Presqu'île guérandaïse alors que le BIORE devenait « Wetlands International » et que le GOLA intégrait la LPO 44.

De nos jours les comptages de la Presqu'île guérandaïse mobilisent une cinquantaine d'ornithologues, bénévoles ou professionnels. Ils font partie des comptages départementaux qui sont coordonnés par une équipe de cinq personnes de différentes structures : Jean-François Dufland, Alain Gentric, Olivier Poisson, Sébastien Reeber & Rodolphe Tourneux. Une synthèse départementale est rédigée annuellement.




Quelques tendances et résultats des dénombrements de 2025

En 2025, c'est un total de 56 761 oiseaux d'eau qui sont dénombrés (soit le 6^e site français). Le site atteint le critère de zone humide d'importance internationale pour les populations de 5 espèces : Bernache cravant, Tadorne de Belon, Canard souchet, Avocette élégante & Barge à queue noire. À noter, à la différence de l'an passé, le site n'atteint pas à la mi-janvier 2025 les critères pour la Spatule blanche et l'Aigrette garzette. Pour cette dernière, la tempête Caetano (21/11/2024) a ravagé le dortoir du Pouliguen et provoqué son éparpillement en dortoirs secondaires.

Le Busard des roseaux en hiver

Les marais de Brière indivis se caractérisent par une densité remarquable de Busards des roseaux : plus de 200 individus chaque hiver ... 266 en janvier 2025. Totalisant 60% environ des effectifs du département au comptage de la mi-janvier, c'est le principal site d'accueil de l'espèce en Loire-Atlantique, suivi par le lac de Grand-Lieu (une centaine d'oiseaux) et secondairement par les marais de l'Erdre. Les caractéristiques paysagères des habitats (immenses

phragmitaies, cariçaies, saulaies et mégaphorbiaies) ainsi que la présence de gibier d'eau, blessé ou perdu, et de nombreux cadavres de ragondins, constituent ici autant de facteurs favorables au Busard des roseaux. De beaux dortoirs hivernaux sont notés ici et là dans des formations boisées au cœur ou en périphérie des marais de Brière. Ils accueillent aussi souvent quelques busards Saint-Martin et, plus occasionnellement, quelques rares Faucons émerillon.






ZOOM ESPÈCE : LE CANARD SOUCHET

Spatula clypeata

Mi-janvier 2025




Répartition du Canard souchet en France métropolitaine lors du comptage des oiseaux d'eau de la mi-janvier 2025.
Northern Shoveler distribution in France during the 2025 International Waterbird Census



Indices d'abondance des effectifs de Canard souchet dénombrés à la mi-janvier en France de 1967 à 2025.
Abundance index of Northern Shoveler in France (International Waterbird Census 1967-2025)

Canard souchet © Fabrice Cahéz




Deux principales populations - largement chevauchantes et entretenant des échanges indéniables - sont reconnues dans la partie occidentale de l'aire Afrique-Eurasie : la population hivernant en Europe du Nord-Ouest et centrale (70-80 000 ind.), en progression, et la population de Sibérie occidentale - Europe de l'Est / Sud de l'Europe - Afrique de l'Ouest (450-600 000 ind.), globalement stable. La France accueille des effectifs issus de ces deux populations : la première sur la majorité du territoire, et la seconde principalement sur le pourtour méditerranéen.

Avec en moyenne 55 000 oiseaux recensés en janvier sur 361 sites, la France représente un contributeur majeur (~40-50 %) aux comptages de la mi-janvier pour la population NW/C Europe, au même titre que le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Sa part est plus faible pour la grande population orientale, dominée côté ouest de sa distribution par la péninsule Ibérique et l'Afrique du Nord.

Depuis 1967, les effectifs français ont triplé (+300 %), poursuivant leur progression (+39 % sur les 12 dernières années), les hivers 2024 (64 000 ind.) et 2025 (65 200 ind.) constituant des records historiques. Cinq sites concentrent à eux seuls la moitié des effectifs : la Camargue (~10 900 ind. moy. 2021-2025), le lac de Grandlieu (~6 000 ind.), les marais du Cotentin et du Bessin (~3 900 ind.), la presqu'île guérandaise (dans sa partie Brière ; ~3 500 ind.) et la Loire aval (~3 100 ind.). Seize sites dépassent les seuils Ramsar de zone humide d'importance internationale, principalement autour de l'Estuaire de la Loire, des Pertuis Charentais et en Camargue pour la population orientale.

Cette dynamique contraste avec le déclin des nicheurs en Europe du Nord et de l'Ouest. Elle s'expliquerait avant tout par une redistribution vers le nord des populations hivernantes en Afrique avec l'affaiblissement du rôle des zones sahéniennes et nord-africaines à la faveur d'hivers plus doux. Ces évolutions interviendraient dans un contexte d'incertitudes structurelles fortes : les frontières entre populations hivernantes demeurant floues et indéniablement perméables, avec des biais de couverture du comptage international des oiseaux d'eau (forte couverture en Europe, mais lacunes au Sahel ou encore en Caspienne). Le Canard souchet est classé LC - Préoccupation mineure sur la Liste rouge mondiale et en Europe, en raison d'une aire de répartition très vaste et d'une population totale encore importante malgré un déclin estimé à près de 19 % sur trois générations. En revanche, dans l'UE, le déclin plus marqué

(~27 % sur trois générations) justifie son classement en NT - Quasi menacé, reflétant la baisse continue des effectifs nicheurs notamment en Finlande, Suède, ou encore aux Pays-Bas, où les habitats et conditions de reproduction de l'espèce se dégradent rapidement. Les prélèvements cynégétiques dans l'UE seraient non soutenables pour les populations, et des travaux sont en cours pour orienter des mesures de gestion avec en priorité une amélioration des connaissances.



Canard souchet femelle
© François Desbordes



Canard souchet mâle
© François Desbordes



LE COMPTAGE WETLANDS EN DEHORS DE NOS FRONTIÈRES

Menno Hornman¹, Mayke Vonk¹ & Erik van Winden¹
¹Sovon




Le comptage des oiseaux d'eau aux Pays-Bas

Grâce à son caractère deltaïque, à ses hivers relativement doux et à sa position clé sur la voie de migration Est-Atlantique, les Pays-Bas figurent parmi les pays les plus importants d'Europe pour l'accueil des oiseaux d'eau. Le suivi y est ancien : amorcé dès 1947 sur certains sites, il est devenu systématique à l'échelle nationale à partir de 1975. Depuis 1992, la coordination est assurée par le Sovon, dans le cadre du Netwerk Ecologische Monitoring, en partenariat avec l'État et le Statistics Netherlands. Chaque hiver, se sont environ 2 300 bénévoles, appuyés par des professionnels, qui couvrent plus de 3 000 unités de comptage, incluant des relevés terrestres, en bateau et aériens selon des protocoles standardisés (Hornman *et al.*, 2024). Les dénombrements s'étendent de septembre à avril (comptages supplémentaires d'oies en mai), avec un effort maximal à la mi-janvier pour le comptage international Wetlands. Les grands sites – comme la zone du delta du sud-ouest, le lac IJsselmeer, le lac Markermeer et les lacs Randmeren, les côtes de la mer des Wadden de Hollande-Septentrionale, de Frise et de Groningue – sont suivis tout au long de l'année, avec des comptages spécifiques à marée haute pour les zones tidales. Les zones de marée sont recensées à marée haute, tandis que les eaux libres des lacs IJsselmeer et Markermeer, de la mer des Wadden et de la mer du Nord (zone côtière et hauturière) font l'objet de relevés aériens (uniquement en janvier et novembre). Pour les oiseaux marins, les données des relevés aériens sur la partie néerlandaise de la mer du Nord sont complétées par des données d'observation marine systématiques depuis des points d'observation côtiers.

En janvier 2024, les recensements ont concerné 26 300 km², soit près de deux tiers du territoire. Les résultats ont atteint un record historique : 6,6 millions d'oiseaux d'eau ont été recensés, contre un précédent maximum de 5,8 millions. Les effectifs les plus importants concernent l'Oie rieuse (982 000 ind.), le Canard siffleur (973 000) et la Bernache nonnette (842 000), toutes en nombre record. Ces abondances exceptionnelles s'expliquent en partie par un épisode de gel et de neige en Allemagne du Nord, qui a favorisé le déplacement d'oiseaux vers les Pays-Bas, ainsi que par

l'inondation de grandes plaines alluviales offrant des conditions favorables aux canards. Parmi les observations marquantes pour le pays figure également le Héron garde-bœufs, avec 74 individus, une présence en progression constante.

Sur le long terme, les effectifs hivernants moyens ont doublé depuis 1975. Toutefois, on observe une stagnation, voire un déclin, depuis une quinzaine d'années, en particulier chez certaines espèces de cygnes, d'oies et chez les oiseaux se concentrant dans le nord-est du pays. Les canards et limicoles montrent une relative stabilité, tandis que les oiseaux marins évoluent de façon contrastée : augmentation d'espèces abondantes comme la Mouette pygmée ou les Pingouin torda et Guillemot de Troïl, mais la majorité des espèces marines ont connu un déclin significatif, y compris de nombreuses espèces rares. Ces tendances reflètent aussi des redistributions spatiales liées au climat : progression d'espèces traditionnellement cantonnées au sud-ouest du pays, stabilisation de celles centrées sur les Pays-Bas, et recul des espèces dépendantes du nord-est.




Couverture du comptage de janvier 2024 aux Pays-Bas.
Coverage of IWC in The Netherlands in January 2024.

Les tendances contrastées observées selon l'origine géographique des populations hivernantes reflètent des redistributions liées au climat et à la disponibilité alimentaire. Les espèces dont le centre d'hivernage se situait historiquement au sud-ouest de l'Europe, comme la Spatule blanche ou le Canard souchet, progressent désormais aux Pays-Bas, signe d'un déplacement de leur aire vers le nord sous l'effet d'hivers plus doux. Celles dont le cœur d'hivernage était centré sur les Pays-Bas, à l'image du Canard siffleur ou du Chevalier gambette, se stabilisent après une phase d'augmentation marquée jusqu'au tournant des années 2000. À l'inverse, les espèces traditionnellement associées aux régions plus nord-orientales, telles que le Garrot à œil d'or ou le Harle piette, régressent dans le pays : autrefois présentes surtout lors des hivers rigoureux en mer Baltique, elles y demeurent désormais plus fréquemment du fait de gels moins intenses. La ressource alimentaire pourrait également contribuer à ces évolutions, notamment pour certaines espèces ichthyophages ou malacophages dont les habitats d'alimentation évoluent avec les conditions climatiques. Les Pays-Bas portent une responsabilité majeure en matière de conservation des oiseaux d'eau, avec 27 sites Natura 2000 où la moitié des espèces d'intérêt atteignent leurs valeurs de référence favorable. Toutefois, dans 30 autres sites, au moins la moitié des espèces restent sous les seuils attendus.


Pour aller plus loin :

Les résultats du comptage des oiseaux sont publiés chaque année dans les rapports Watervogels in Nederland, publiés par le Sovon.

Le site www.sovon.nl/nl/gebieden propose un aperçu complet de tous les sites, espèces et tendances et information sur les sites.



Tendances des effectifs d'oiseaux d'eau dénombrés aux Pays-Bas depuis 1975-76.
Trend in total numbers in The Netherlands since 1975/76.



Tendances des effectifs hivernants aux Pays-Bas pour les espèces hivernant principalement au sud-ouest des Pays-Bas, aux Pays-Bas et au nord-est des Pays-Bas (données de décembre à février, tendance moyenne pour toutes les espèces) depuis 1975-76.
Trends in wintering numbers in The Netherlands of species mainly wintering SW of The Netherlands, in The Netherlands, and NE of The Netherlands (data from Dec-Feb, average trend over all species).



ESPÈCES EXOTIQUES

Les espèces exotiques dans le comptage de la mi-janvier 2025

Le comptage Wetlands permet de suivre l'évolution d'un certain nombre d'espèces exotiques introduites, qui ne sont pourtant pas toutes à considérer comme « envahissantes ». Explication :

Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN, 2000), « une espèce exotique envahissante est une espèce allochtone dont l'introduction par l'Homme (volontaire ou fortuite), l'implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives ». Une espèce exotique dite « envahissante » peut être qualifiée d'« invasive » seulement si cette dernière a un impact négatif sur la biodiversité. Les EEE se classent comme la 3^e menace pesant sur les espèces en Europe. Dans le cadre de la stratégie Européenne, le MNHN (2014) hiérarchise les espèces EEE et dresse une liste de référence des espèces de vertébrés introduits en France métropolitaine dont le caractère invasif demeure ensuite à évaluer.

Espèces d'oiseaux d'eau introduites		Espèces Exotiques Envahissantes		mi-janv. 2025	
		UE	ER	Nb. ind.	Nb. sites
Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i>			47	24
Oie à tête barrée	<i>Anser indicus</i>			15	8
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>			11 281	97
Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>			1 919	52
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>			154	7
Canard carolin	<i>Aix sponsa</i>			7	5
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>			108	26
Canard de Barbarie	<i>Cairina moschata</i>			37	11
Érismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>	✓	✓	23	3
Ibis sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	✓	✓	499	14
Pélican gris	<i>Pelecanus rufescens</i>			0	0

Liste et classement des espèces exotiques introduites recensées lors du comptage Wetlands 2025
List and classification of introduced non-native waterbirds species reported during the 2025 mid-January waterbird survey in France



EVÉNEMENT
Vers le 60^e anniversaire du comptage international des oiseaux d'eau !

En janvier 2026, l'International Waterbird Census (IWC) célébrera son 60^e anniversaire. La date officielle pour la région Afrique-Eurasie est d'ores et déjà fixée au week-end des 17 et 18 janvier 2026. Cet évènement marquera une étape symbolique pour l'un des plus anciens programmes de suivi de la biodiversité au monde, initié en 1966 et toujours porté par l'engagement de milliers de bénévoles et de professionnels.

Depuis six décennies, les dénombrements coordonnés par Wetlands International ont permis d'accumuler une base de données unique sur les populations d'oiseaux d'eau migrateurs et sur l'état des zones humides. Ces informations alimentent la recherche scientifique, la gestion des sites et les politiques publiques, et servent de référence à de nombreux accords internationaux comme Ramsar, l'AEWA ou la Directive Oiseaux. Elles permettent aussi de documenter des tendances à long terme, souvent impossibles à détecter autrement, et d'alerter sur les pressions qui affectent habitats et espèces. Et l'ampleur du programme force le respect : depuis 1967, l'IWC a été mené dans 189 pays ou territoires et près de 1,9 milliard d'oiseaux d'eau ont été comptés sur plus de 67 000 sites. Aujourd'hui, environ 30 000 observateurs – pour la plupart bénévoles – participent chaque année à ce suivi. Les données collectées constituent la référence pour la désignation de 956 sites Ramsar, de milliers d'IBA et de ZPS, et elles alimentent directement les grandes conventions internationales. Elles concernent aussi bien les espèces les plus abondantes – Canard colvert, Foulque macroule, Oie rieuse, Canard siffleur ou Bécasseau variable – que des espèces en déclin, telles que le Fuligule milouin, dont l'IWC a contribué à révéler sa situation préoccupante. À l'occasion de ce 60^e anniversaire, il s'agira de valoriser la contribution des observateurs et coordinateurs locaux, de rappeler que leurs efforts nourrissent une chaîne de décisions allant du terrain aux enceintes internationales, et de partager ce message avec le grand public. Des illustrations concrètes – cartes de télémétrie, histoires d'espèces phares, témoignages de compteurs – viendront montrer la force de ce réseau et mettre en valeur cet engagement collectif. En 2016, le 50^e anniversaire s'était traduit par le mot d'ordre « *Let's make it count* ». Dix ans plus tard,

l'ambition demeure : faire compter chaque observation, renforcer la visibilité de ce travail collectif et rappeler l'importance des zones humides pour la biodiversité comme pour les sociétés humaines.



INTERNATIONAL
WATERBIRD CENSUS

Les matériels et éléments de communication autour de l'évènement seront diffusés prochainement sur le site dédié de Wetlands International : www.wetlands.org/knowledge-base/international-waterbird-census



- 2 ILS ONT PARTICIPÉ AU COMPTAGE 2025
- 3 LES CHIFFRES CLÉ DU COMPTAGE INTERNATIONAL DES OISEAUX D'EAU DE WETLANDS INTERNATIONAL
- 4 COMPTER LES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER, POURQUOI ?
- 6 RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE
- 8 LE RÉSEAU DES ZONES HUMIDES DÉNOMBRÉES À LA MI-JANVIER
- 9 ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE POUR LES OISEAUX D'EAU (MI-JANVIER 2021-2025)
- 11 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DU DÉNOMBREMENT DE 2025
- 12 BILAN GLOBAL DES DÉNOMBREMENTS DE LA MI-JANVIER 2025
- 14 TENDANCES QUANTITATIVES DES EFFECTIFS D'OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER
- 16 INDICATEUR ONB « ÉVOLUTION DES POPULATIONS D'OISEAUX D'EAU HIVERNANTS »
- 18 ZOOM SITE : LA PRESQU'ÎLE GUÉRANDAISE
- 20 ZOOM ESPÈCE : LE CANARD SOUCHET
- 22 LE COMPTAGE WETLANDS EN DEHORS DE NOS FRONTIÈRES : LES PAYS-BAS
- 24 ESPÈCES EXOTIQUES
- 25 EVÈNEMENT : VERS LE 60^E ANNIVERSAIRE DU COMPTAGE INTERNATIONAL DES OISEAUX D'EAU !



Faune
France

Ce travail a été réalisé grâce à www.faune-france.org, démarche participative rassemblant plusieurs dizaines d'associations naturalistes locales et des dizaines de milliers de contributeurs. Ce projet permet des actions de préservation de la biodiversité, de connaissance et participe aux politiques publiques. Le projet Faune France est coordonné par la LPO.



ODF (Oiseaux de France) est un projet adossé à Faune-France qui vise à mettre à jour et diffuser l'état des connaissances de l'avifaune française (Outre-Mer inclus). ODF s'appuie massivement sur des données opportunistes mais aussi sur tous les dispositifs protocolés existants (VigieNature, Wetlands, Observatoire Rapaces, etc.).



Inventaire
National du
Patrimoine
Naturel

Les données de comptage des oiseaux d'eau alimentent la plateforme thématique de référence du SINP - Système d'Information sur la Nature et les Paysages - dédiée à la « géodiversité et biodiversité », l'INPN.

LPO France

CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX • Tél. 05 46 82 12 34
Fax 05 46 83 95 86 • www.lpo.fr • lpo@lpo.fr

Service Revues et Studio graphique LPO 2025 - 2510006AB



Agir pour
la biodiversité