

Química Geral para Ciências Biológicas: P1 (M1 e M2)			Pontuação ↓
Data: 07/04/2026	Questões: 3	Pontos totais: 10	
Matrícula:			Nome:

<i>Questão</i>	<i>Pontos</i>	<i>Nota</i>
1	4	
2	4	
3	2	
Total:	10	

Instruções:

1. Justifique **todas** as suas respostas.
2. Entregue as respostas manuscritas e materiais de consulta com essa folha anexa.
3. Tabela de eletronegatividade (χ) de Pauling:


H 2.1																	He ---
Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne ---
Na 0.9	Mg 1.2											Al 1.5	Si 1.8	P 2.2	S 2.5	Cl 3.0	Ar ---
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 3.0
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 2.6
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.1-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn ---
Fr 0.7	Ra 0.9	Ac-No 1.1-1.7															

4. É permitido o uso de calculadora científica;
 5. Há uma tabela periódica ao final da prova.
1. (4 pontos) O trióxido de enxofre, SO_3 , é um dos insumos industriais mais importantes e é utilizado na síntese do ácido sulfúrico, H_2SO_4 . Dessa forma, faça o que se pede:
 - (a) Faça a estrutura de Lewis do SO_3 e indique sua geometria molecular;
 - (b) Calcule o número de elétrons na camada de valência do enxofre no SO_3 . Qual o impacto desse número na estabilidade do composto?


Resposta:

Na letra a, a fórmula de Lewis do SO_3 pode ser construída a partir dos passos abordados em sala de aula:


1. **Somatório dos elétrons de valência dos átomos envolvidos.** Como todos os átomos são da família 16 (XVIA), cada um contribui com 6 elétrons, totalizando 24 (12 pares);
2. **Determinação do átomo central.** Como a valência do enxofre e do oxigênio é 2, deve-se considerar o átomo menos eletronegativo como o central. Dessa forma, os três átomos de oxigênio estão ligados ao átomo de enxofre;
3. **Montagem do esqueleto da fórmula de Lewis com um par de elétrons entre cada átomo.** Mantendo uma estrutura simétrica em torno do átomo de S, tem-se:



4. **Distribuição dos pares eletrônicos nos átomos periféricos, avaliação do octeto e da carga formal.** Como há 9 pares de elétrons remanescentes, cada átomo de oxigênio forma uma ligação simples com 3 pares não ligantes ($C_f = -1$). O átomo de enxofre possui $C_f = +3$ e octeto incompleto;



5. **Ajuste das cargas formais para o valor mais próximo possível de zero e verificação do octeto.** Como há, essencialmente, três “pares” de cargas formais +1 e -1, basta converter um par de elétrons não ligante de cada oxigênio em uma ligação dupla, $\text{S}=\text{O}$;



Dessa forma, cada átomo possui carga formal, C_f , igual a zero

$$C_f = e_{\text{valência}}^- - \left(e_{\text{não ligantes}}^- + \frac{e_{\text{ligantes}}^-}{2} \right). \quad (1)$$

Aplicando a equação para os átomos de oxigênio, tem-se

$$C_f(\text{O}) = (6) - \left((4) + \frac{(4)}{2} \right) = 0 \quad (2)$$

e, para os átomos de enxofre, tem-se

$$C_f(\text{S}) = (6) - \left((0) + \frac{(12)}{2} \right) = 0. \quad (3)$$

Na letra b, o enxofre possui 12 elétrons na camada de valência. Esse número, acima de 8, indica hipervalência. Para o enxofre, esse fenômeno é válido, pois, como o elemento químico enxofre possui a camada 3 preenchida, tem acesso aos orbitais d, que podem acomodar o excesso do octeto.

2. (4 pontos) Quando se comparam os ângulos de ligação nas moléculas de SiH_4 , PH_3 e H_2S , observa-se que os ângulos das ligações $\text{H}-\text{A}-\text{H}$, em que A é Si, P ou S, variam conforme a **Tabela 1**.


Tabela 1: Ângulos de ligação $\text{H}-\text{A}-\text{H}$ ($\phi_{\text{H}-\text{A}-\text{H}}$, °), em que A = Si, P ou S, para as moléculas SiH_4 , PH_3 e H_2S .

Molécula	$\phi_{\text{H}-\text{A}-\text{H}}$, °
SiH_4	109,5°
PH_3	93,5°
H_2S	92,4°

Com base nas geometrias eletrônicas e moleculares dos compostos, justifique a variação dos ângulos de ligação $\text{H}-\text{A}-\text{H}$.

Resposta:

Os compostos em questão possuem comportamento similar ao discutido em aula para os compostos CH_4 , NH_3 e H_2O . Dessa forma, a estrutura de Lewis de cada um deles é



Como se pode ver, o SiH_4 não tem pares de elétrons não ligantes, o PH_3 tem um e o H_2S tem dois. Além disso, a repulsão intereletrônica (R) segue a tendência

$$R_{\text{n.l., n.l.}} > R_{\text{n.l., l.}} > R_{\text{l., l.}}, \quad (4)$$

em que $R_{\text{n.l., n.l.}}$ é a repulsão entre pares de elétrons não ligantes, $R_{\text{n.l., l.}}$ é a repulsão entre um par de elétrons ligante e um par de elétrons não ligante, e $R_{\text{l., l.}}$ é a repulsão entre pares de elétrons ligantes.

Então, como o H_2S possui dois pares de elétrons não ligantes, ele está sujeito ao maior R e, por consequência, possui o menor ângulo entre as ligações $\text{H}-\text{S}-\text{H}$ ($\phi_{\text{H-S-H}}$). Essa repulsão é levemente menor no PH_3 , pois possui apenas um par de elétrons não ligantes e, por consequência, o ângulo entre as ligações ($\phi_{\text{H-P-H}}$) é o intermediário. Por fim, no SiH_4 , a repulsão é a menor das três, devido à ausência de pares de elétrons não ligantes, o que resulta no maior ângulo ($\phi_{\text{H-Si-H}}$).

3. (2 pontos) O composto CaO , também chamado de cal virgem, é um óxido e um dos principais componentes do cimento. O CO_2 também é um óxido e é um dos principais componentes da fotossíntese. Dessa forma, faça o que se pede.

- (a) Indique qual desses compostos é um composto iônico e qual é um composto covalente.
(b) Dê o nome de ambos os compostos.

Resposta:

Na letra a, o CaO é um composto iônico e o CO_2 , um composto covalente. Isso se deve à diferença de eletronegatividade ($\Delta\chi$) entre os átomos envolvidos nas ligações. Para o CaO , $\Delta\chi = 3,5 - 1,0 = 2,5$, enquanto o CO_2 , $\text{O}=\text{C}=\text{O}$, possui $\Delta\chi = 3,5 - 2,5 = 1,0$.

Como se pode ver, a ligação $\text{C}=\text{O}$, por apresentar um $\Delta\chi$ menor, é mais covalente do que a ligação entre o cálcio e o oxigênio, cujo $\Delta\chi$ é maior e tem mais caráter iônico.

Considerando a tipificação dos compostos, os nomes são óxido de cálcio (CaO) e dióxido de carbono (CO_2).

