

Química Orgânica para Ciências Biológicas: P1 (M1 e M2)			Pontuação ↓
Data: 13/04/2026	Questões: 3	Pontos totais: 10	
Matrícula:			Nome:

<i>Questão</i>	<i>Pontos</i>	<i>Nota</i>
1	4	
2	2	
3	4	
Total:	10	

Instruções:

1. Justifique **todas** as suas respostas.
2. Entregue as respostas manuscritas e materiais de consulta com essa folha anexa;
3. Tabela de eletronegatividade (χ) de Pauling:

H 2.1																	He ---
Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne ---
Na 0.9	Mg 1.2											Al 1.5	Si 1.8	P 2.2	S 2.5	Cl 3.0	Ar ---
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 3.0
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 2.6
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.1-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn ---
Fr 0.7	Ra 0.9	Ac-No 1.1-1.7															

4. É permitido o uso de calculadora científica;
 5. Há uma tabela periódica ao final da prova.
1. (4 pontos) O átomo de carbono, no seu estado fundamental, possui a distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^2$. Dessa forma, o diagrama preenchido de orbitais atômicos desse átomo é mostrado na **Figura 1**.





Figura 1: Diagrama de orbitais atômicos do carbono no seu estado fundamental, cuja distribuição eletrônica é $1s^2 2s^2 2p^2$.

- (a) Baseando-se **apenas** no diagrama de preenchido dos orbitais atômicos (**Figura 1**), quantas ligações químicas um átomo de carbono faria em um composto químico?
- (b) Levando em conta a resposta do item anterior, explique o fato do metano ter a fórmula molecular CH_4 , com o átomo de carbono fazendo quatro ligações C–H de mesmo comprimento (1,09 Å) e com ângulos de ligação iguais ($109,5^\circ$), assumindo uma geometria tetraédrica.

Resposta:

Na letra a), o diagrama preenchido de orbitais atômicos mostra dois orbitais semipreenchidos. Dessa forma, espera-se que o carbono faça apenas duas ligações.


Na letra b), a hibridação dos orbitais atômicos pode explicar (i) as quatro ligações do CH_4 , (ii) o fato de terem comprimentos iguais e (iii) o fato de descreverem um tetraedro.



Dessa forma, como os quatro orbitais híbridos formados têm a mesma energia (degenerados) e as ligações são feitas entre os mesmos elementos (C–H), elas têm os mesmos comprimentos. Além disso, o maior espaçamento possível entre os quatro orbitais, afim de diminuir a repulsão eletrônica, é dado por uma geometria tetraédrica, com ângulos de ligação iguais a $109,5^\circ$.

2. (2 pontos) A estrutura do composto químico hex-1-en-5-ino é mostrada a seguir.

Indique a hibridação de cada átomo de carbono marcado com um asterisco.




Resposta:

Para assinalar a hibridação de cada átomo de carbono destacado, como nenhum deles possui pares de elétrons não ligantes, basta verificar (i) o número de átomos ligados ou (ii) o número de ligações σ e π .

Dessa forma, da esquerda para a direita, temos:

1. Três átomos ligados com três ligações σ e uma π : hibridação sp^2 ;
2. Quatro átomos ligados com quatro ligações σ : hibridação sp^3 ;
3. Dois átomos ligados com duas ligações σ e duas π : hibridação sp .

3. (4 pontos) Considere as estruturas dos isômeros de função etanol (álcool etílico) e metoximetano (éter metílico), apresentadas a seguir.



Experimentalmente, sabe-se que a temperatura de ebulição do etanol (1 atm) é igual a $78,2^\circ\text{C}$, enquanto que a do metoximetano (1 atm) é igual a -24°C . Explique essa diferença.

Resposta:

Como se tratam de isômeros, a massa molar de ambos é a mesma, tornando esse fator irrelevante para a ebulição. Dessa forma, a intensidade das forças intermoleculares é o fator preponderante para a determinação da temperatura de ebulição.

Comparando a estrutura dos compostos, percebe-se que, enquanto ambos são polares, apenas o etanol é capaz de fazer ligações de hidrogênio, pois possui um átomo de hidrogênio ligado a F, O ou N, assim como um átomo eletronegativo (F, O ou N) com pares de elétrons não ligantes. O éter dimetílico, em contrapartida, não possui hidrogênios ligados a átomo de F, O ou N. Sendo assim, enquanto o etanol realiza ligações de hidrogênio, interações dipolo-dipolo e forças de London, o metoximetano realiza apenas interações dipolo-dipolo e forças de

London. Então, como o etanol tem forças intermoleculares mais fortes, seu ponto de ebulição será maior, como observado pelos valores experimentais.

