

# Topologie Zusammenfassung

April 23, 2024

# Contents

1	Topologische Räume	2
---	--------------------	---

# 1 Topologische Räume

**Definition 1.1.** Sei  $X \neq \emptyset$ . Eine Topologie auf  $X$  ist eine Familie  $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$  mit

1.  $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$
2. Die Vereinigung beliebig vieler Teilmengen aus  $\mathcal{T}$  ist in  $\mathcal{T}$
3. Der Durchschnitt endlich vieler Teilmengen von  $\mathcal{T}$  ist in  $\mathcal{T}$

Das Paar  $(X, \mathcal{T})$  heißt topologischer Raum, die Elemente aus  $\mathcal{T}$  heißen offene Mengen.

**Definition 1.2.** Auf  $X \neq \emptyset$  seien  $\mathcal{T}$  und  $\mathcal{T}'$  zwei Topologien mit  $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$ . Dann heißt  $\mathcal{T}'$  die feinere und  $\mathcal{T}$  die gröbere Topologie. Ist zusätzlich  $\mathcal{T} \neq \mathcal{T}'$ , dann heißen die Relationen strikt finer bzw. gröber.

**Definition 1.3.** Sei  $X \neq \emptyset$ . Eine Basis für eine Topologie auf  $X$  ist eine Familie  $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$  welche die Eigenschaften erfüllt

1.  $\forall x \in X \exists B \in \mathcal{B}$  sodass  $x \in B$
2. Sind  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$  und  $x \in B_1 \cap B_2$ , dann existiert  $B_3 \in \mathcal{B}$  mit

$$x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$$

Ist eine Basis  $\mathcal{B}$  gegeben, so heißt  $\mathcal{T}(\mathcal{B})$  die von  $\mathcal{B}$  erzeugte Topologie über

$$U \in \mathcal{T}(\mathcal{B}) :\Leftrightarrow \forall x \in U \exists B \in \mathcal{B} \text{ mit } x \in B \subset U$$

**Theorem 1.4.** Sei  $X \neq \emptyset$ ,  $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$  eine Basis für eine Topologie auf  $X$ . Dann ist  $\mathcal{T}(\mathcal{B})$  in der Tat eine Topologie.

**Theorem 1.5.** Sei  $X \neq \emptyset$  und  $\mathcal{B}$  eine Basis für eine Topologie auf  $X$ . Dann besteht  $\mathcal{T}(\mathcal{B})$  aus genau den Mengen, die sich als Vereinigung von Mengen aus  $\mathcal{B}$  schreiben lassen.

**Theorem 1.6.** Sei  $(X, \mathcal{T})$  ein topologischer Raum. Sei dann  $\mathcal{C} \subset \mathcal{T}$  mit der Eigenschaft

$$\forall U \in \mathcal{T} \text{ und } x \in U \exists C \in \mathcal{C} : x \in C \subset U$$

Dann ist  $\mathcal{C}$  bereits eine Basis für  $\mathcal{T}$ .

**Theorem 1.7.** Seien  $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$  Basen zweier Topologien  $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ . Dann sind die folgenden beiden Aussagen äquivalent

1.  $\mathcal{T}'$  ist feiner als  $\mathcal{T}$

2.  $\forall x \in X$  und  $\forall B \in \mathcal{B}$  mit  $x \in B$  existiert  $B' \in \mathcal{B}'$  mit  $x \in B' \subset B$ .

**Theorem 1.8.** Sei  $X \neq \emptyset$ . Ist dann  $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(X)$ , so gibt es eine eindeutige grösste Topologie, welche  $\mathcal{S}$  enthält. Diese sei mit  $\mathcal{T}(\mathcal{S})$  notiert.

Ist außerdem  $\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S = X$ , dann ist  $\mathcal{T}(\mathcal{S})$  genau die Menge beliebiger Vereinigungen von endlichen Durchschnitten von Mengen aus  $\mathcal{S}$ .  $\mathcal{S}$  heißt Subbasis von  $\mathcal{T}(\mathcal{S})$ .