

Lista de Exercícios 7 - MAE0228

Exercício 2

Vamos definir: $A = \{A_t; t \geq 0\}$ como o número de fregueses que entram pela porta A até o instante t .
 $B = \{B_t; t \geq 0\}$ como o número de fregueses que entram pela porta B até o instante t .

a) De acordo com a definição acima, $X_t = A_t + B_t$. Vamos mostrar, usando Funções Geradoras de Momentos, que X_t é um Processo de Poisson.

$$M_{X_t}(s) = M_{A_t+B_t}(s) \stackrel{ind.}{=} M_{A_t}(s) \cdot M_{B_t}(s) = e^{15 \cdot (e^s - 1)} \cdot e^{10 \cdot (e^s - 1)} = e^{25 \cdot (e^s - 1)}$$

Pela unicidade das Funções Geradoras de Momentos, temos que X_t é um Processo de Poisson com taxa média (parâmetro) de 25 fregueses por minuto.

b) O instante em que o primeiro freguês entra por A é $T_1 \sim \Gamma(1, 15) \sim \text{Exponencial}(15)$. Para B, esse instante é dado por $V_1 \sim \Gamma(1, 10) \sim \text{Exponencial}(10)$. Seja $Y = \min(T_1, V_1)$, teremos:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = 1 - P(Y > y) = 1 - P(T_1 > y, V_1 > y) \stackrel{ind.}{=} 1 - P(T_1 > y) \cdot P(V_1 > y) \\ &= 1 - \left[\int_y^\infty 15 \cdot e^{-15t} dt \cdot \int_y^\infty 10 \cdot e^{-10v} dv \right] = 1 - \left[(-e^{-15t}|_y^\infty) \cdot (-e^{-10v}|_y^\infty) \right] \\ &= 1 - [e^{-15y} \cdot e^{-10y}] = 1 - e^{-25y} \Rightarrow f_Y(y) = 25 \cdot e^{-25y} \Rightarrow Y \sim \text{Exponencial}(25) \end{aligned}$$

c) Neste item, queremos encontrar $P(T_1 < V_1)$. Fazemos:

$$\begin{aligned} P(T_1 < V_1) &\stackrel{ind.}{=} \int_0^\infty \int_0^v 15 \cdot e^{-15t} \cdot 10 \cdot e^{-10v} dt dv = \int_0^\infty 10 \cdot e^{-10v} \cdot \left[\int_0^v 15 \cdot e^{-15t} dt \right] dv \\ &= \int_0^\infty 10 \cdot e^{-10v} \cdot [-e^{-15t}|_0^v] dv = \int_0^\infty 10 \cdot e^{-10v} \cdot [1 - e^{-15v}] dv \\ &= \int_0^\infty 10 \cdot e^{-10v} dv - \int_0^\infty 10 \cdot e^{-25v} dv = 1 - \frac{10}{25} \int_0^\infty 25 \cdot e^{-25v} dv \\ &= 1 - \frac{10}{25} = \frac{15}{25} \end{aligned}$$

Exercício 5

$$\begin{aligned}
 P[N(s) = k | N(t) = n] &= \frac{P[N(s) = k, N(t) = n]}{P[N(t) = n]} = \frac{P[N(s) = k, N(t) - N(s) = n - k]}{P[N(t) = n]} \\
 &\stackrel{inc. ind.}{=} \frac{P[N(s) = k] \cdot P[N(t) - N(s) = n - k]}{P[N(t) = n]} \\
 &\stackrel{inc. est.}{=} \frac{P[N(s) = k] \cdot P[N(t - s) = n - k]}{P[N(t) = n]} \\
 &= \frac{\frac{e^{-\lambda s} \cdot (\lambda s)^k}{k!} \cdot \frac{e^{-\lambda(t-s)} \cdot [\lambda(t-s)]^{n-k}}{(n-k)!}}{\frac{e^{-\lambda t} \cdot (\lambda t)^n}{n!}} \\
 &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{e^{-\lambda s} \cdot e^{-\lambda(t-s)}}{e^{-\lambda t}} \cdot \frac{(\lambda s)^k \cdot [\lambda(t-s)]^{n-k}}{(\lambda t)^n} \\
 &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{s^k \cdot (t-s)^{n-k}}{t^n} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{s^k}{t^k} \cdot \frac{(t-s)^{n-k}}{t^{n-k}} \\
 &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \left(\frac{s}{t}\right)^k \cdot \left(\frac{t-s}{t}\right)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \left(\frac{s}{t}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k}
 \end{aligned}$$

□

Exercício 6

Vamos definir esse processo assim: $N = \{N(t); t \geq 0\}$, que é o número de carros que passam pelo pedágio da Imigrantes até o instante t . O parâmetro é $\lambda = 1$.

a) Para este item, vamos configurar $t = 20$.

$$\begin{aligned}
 P[N(20) < 3] &= \sum_{k=0}^2 P[N(20) = k] = P[N(20) = 0] + P[N(20) = 1] + P[N(20) = 2] \\
 &= \frac{e^{-1 \cdot 20} \cdot (1 \cdot 20)^0}{0!} + \frac{e^{-1 \cdot 20} \cdot (1 \cdot 20)^1}{1!} + \frac{e^{-1 \cdot 20} \cdot (1 \cdot 20)^2}{2!} \cong 4.55 \cdot 10^{-7}
 \end{aligned}$$

b) Neste item, vamos considerar $t = 5$.

$$P[N(5) = 0] = \frac{e^{-1 \cdot 5} \cdot (1 \cdot 5)^0}{0!} = e^{-5} \cong 0.007$$

c) Vamos usar partição para a resolução desse item. Cada veículo que passa pela Imigrantes é classificado como um caminhão, com probabilidade $p = 0.15$. Portanto, é possível definir dois processos independentes, que compõem o processo N já definido:

- $X = \{X(t); t \geq 0\}$, que representa o número de caminhões que passam pelo pedágio da Imigrantes. Ele possui o parâmetro $\lambda_X = 0.15$ caminhões por minuto.
- $Y = \{Y(t); t \geq 0\}$, para os outros veículos. Ele possui o parâmetro $\lambda_Y = 0.85$ caminhões por minuto.

Agora é possível calcular a probabilidade de ver mais de um caminhão durante a troca de pneus ($t = 20$).

$$P[X(20) \geq 1] = 1 - P[X(20) = 0] = 1 - \frac{e^{-0.15 \cdot 20} \cdot (0.15 \cdot 20)^0}{0!} = 1 - \frac{e^{-3} \cdot 3^0}{0!} \cong 0.9502$$

d) Queremos o valor esperado de veículos dado que passaram 3 caminhões. Portanto:

$$\begin{aligned} E[N(20)|X(20) = 3] &= E[X(20) + Y(20)|X(20) = 3] = E[3 + Y(20)] \\ &\stackrel{lin.}{=} 3 + E[Y(20)] = 3 + 0.85 \cdot 20 = 3 + 17 = 20 \end{aligned}$$

Exercício 7

Vamos definir as variáveis que vamos usar:

- A : tempo de morte de Andréa. $A \sim \text{Exponencial}(\mu_A)$.
- B : tempo de morte de Bernardo. $B \sim \text{Exponencial}(\mu_B)$
- $N = \{N(t); t \geq 0\}$: Número de rins doados até o instante t . O parâmetro é λ .
- S_k : o instante em que o k -ésimo rim é doado. $S_k \sim \Gamma(k, \lambda)$.

a) Andréa recebe um rim quanto o primeiro rim é doado antes de sua morte, ou seja, $S_1 < A$. Sabemos que S_1 é uma $\Gamma(1, \lambda)$, e portanto é uma $\text{Exponencial}(\lambda)$. Portanto, fazendo os cálculos de uma forma análoga ao item c do **Exercício 2**, temos que:

$$P(\text{Andréa receber um rim}) = P(S_1 < A) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu_A}$$

b) Existem duas maneiras para que Bernardo receba um rim. A mais feliz é quando Andréa recebe um primeiro rim e ele, o segundo, antes que venha a falecer. A outra maneira é quando o primeiro rim é doado depois da morte de Andréa e ele o recebe antes de falecer. Para saber a probabilidade de que ele receba um rim, devemos somar as probabilidades desses eventos, assumindo independência entre o tempo que cada um dos pacientes tem de vida.

$$\begin{aligned} P(\text{Bernardo receber um rim}) &= P(S_1 < A) \cdot P(S_2 < B) + P(A < S_1 < B) \\ &= P(S_1 < A) \cdot P(S_2 < B) + P(A < S_1) \cdot P(S_1 < B) \\ &\stackrel{2.c)}{=} \frac{\lambda}{\lambda + \mu_A} \cdot P(S_2 < B) + \frac{\mu_A}{\lambda + \mu_A} \cdot \frac{\lambda}{\lambda + \mu_B} \\ &\stackrel{obs.}{=} \frac{\lambda}{\lambda + \mu_A} \cdot \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu_B} \right)^2 + \frac{\mu_A}{\lambda + \mu_A} \cdot \frac{\lambda}{\lambda + \mu_B} \end{aligned}$$

Obs:

$$\begin{aligned}
P(S_2 < B) &\stackrel{ind.}{=} \int_0^\infty \int_0^v \frac{\lambda^2}{\Gamma(2)} \cdot e^{-\lambda s} \cdot s \cdot \mu_B \cdot e^{-\mu_B b} \mathrm{d}s \mathrm{d}b = \int_0^\infty \mu_B \cdot e^{-\mu_B b} \cdot \left[\int_0^v \frac{\lambda^2}{\Gamma(2)} \cdot e^{-\lambda s} \cdot s \mathrm{d}s \right] \mathrm{d}b \\
&= \int_0^\infty \mu_B \cdot e^{-\mu_B b} \cdot \left[-e^{-\lambda s} \cdot (\lambda s + 1) \Big|_0^b \right] \mathrm{d}b = \int_0^\infty \mu_B \cdot e^{-\mu_B b} \cdot \left[1 - e^{-\lambda b} \cdot (\lambda b + 1) \right] \mathrm{d}b = \\
&= \int_0^\infty \mu_B \cdot e^{-\mu_B b} \mathrm{d}b - \int_0^\infty \mu_B \cdot e^{-\mu_B b} \cdot e^{-\lambda b} \cdot (\lambda b + 1) \mathrm{d}b \\
&= \int_0^\infty \mu_B \cdot e^{-\mu_B b} \mathrm{d}b - \int_0^\infty \mu_B \cdot e^{-(\mu_B + \lambda)b} \cdot \lambda b \mathrm{d}b - \int_0^\infty \mu_B \cdot e^{-(\mu_B + \lambda)b} \mathrm{d}b \\
&= 1 - \int_0^\infty \mu_B \cdot e^{-(\mu_B + \lambda)b} \cdot \lambda b \mathrm{d}b - \int_0^\infty \mu_B \cdot e^{-(\mu_B + \lambda)b} \mathrm{d}b \\
&= 1 - \frac{\mu_B \cdot \lambda \cdot \Gamma(2)}{(\mu_B + \lambda)^2} \int_0^\infty \frac{(\mu_B + \lambda)^2}{\Gamma(2)} \cdot e^{-(\mu_B + \lambda)b} \cdot b \mathrm{d}b - \int_0^\infty \mu_B \cdot e^{-(\mu_B + \lambda)b} \mathrm{d}b \\
&= 1 - \frac{\mu_B \cdot \lambda \cdot \Gamma(2)}{(\mu_B + \lambda)^2} - \frac{\mu_B}{(\mu_B + \lambda)} \cdot \int_0^\infty (\mu_B + \lambda) \cdot e^{-(\mu_B + \lambda)b} \mathrm{d}b = 1 - \frac{\mu_B \cdot \lambda}{(\mu_B + \lambda)^2} - \frac{\mu_B}{(\mu_B + \lambda)} \\
&= \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu_B} \right)^2
\end{aligned}$$