

拉萨发现西藏鸟类新纪录——鸳鸯*

李扎西姐 罗松拉姆 李建川**

(西藏自然科学博物馆, 西藏 拉萨 850000)

摘 要 2021年11月17日,在拉萨市宗角禄康公园水域内发现一只鸳鸯(*Aix galericulata*)雌鸟,经相关书籍和文献资料查询,确认是西藏拉萨新纪录鸟类。

关键词 新纪录 鸳鸯 拉萨

鸳鸯(*Aix galericulata*)隶属于雁形目鸭科,雌雄鸟羽色差异甚大,雌鸟的体羽以灰色为主,嘴灰色、脚橙黄色,眼周白色与眼后线相连,无翼帆、无冠羽。主要栖息于溪流、湖泊等水域。在中国主要分布于东部各地,在东北繁殖,在南方越冬,少数个体在云南、浙江、贵州、台湾等地为留鸟。在西藏自治区范围内还未有发现记录。

2021年11月17日,在西藏自治区拉萨市宗角禄康公园水域内(29°38'58.8"N, 91°10'56.74"E, 海拔3655 m)观测到一只鸳鸯的雌鸟。当时鸳鸯在水中活动,因距离很近采集到清晰的多张照片,等待多时附近没有发现雄鸟,然而在其周围观测到绿头鸭(*Anas platyrhynchos*)、斑头雁(*Anser indicus*)、赤麻鸭(*Tadorna ferruginea*)和凤头䴓(*Podiceps cristatus*)等其他水鸟。推测该鸳鸯个体可能是与其它水鸟混群迁徙时到达的拉萨市。



图1 在拉萨市宗角禄康公园拍摄的鸳鸯雌鸟照片

目前,世界自然保护联盟(IUCN)(2018年 ver 3.1)濒危物种红色名录中,鸳鸯被评估为无危(LC)^[1]。在《中国脊椎动物红色名录》评定为近危(NT),在最新版的《国家重点保护野生动物名录》(2021年2月5日)中,鸳鸯被列为国家二级保护动物。经查阅《中国青藏高原鸟类》^[2]《中国观鸟观察手册》^[3]《青藏高原鸟类分类与分布》^[4]《中国鸟类生态大图鉴》^[5]《中国鸟类野外手册》^[6]《中国鸟类分类与分布名录》^[7]及相关文献资料在西藏拉萨无分布记录,因此,本次在拉萨宗角禄康公园发现的鸳鸯雌鸟属于该物种在拉萨地区的新分布记录。

*基金项目 西藏自治区自然科学基金项目“画眉科鸟类对高原环境的行为适应及其对繁殖效果的影响”(XZ202101ZR0051G)

**通讯作者

参考文献

- [1] IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species [OL]. Version, 2020 - 3. <https://www.iucnredlist.org>.
- [2] 卢欣. 中国青藏高原鸟类 [M]. 湖南科学技术出版社, 2018.
- [3] 刘阳. 中国观鸟观察手册 [M]. 湖南科学技术出版社, 2021.
- [4] 刘迺发, 包新康, 廖继承. 青藏高原鸟类分类与分布 [M]. 科学出版社, 2013.

- [5] 郭冬生, 张正旺. 中国鸟类生态大图鉴 [M]. 重庆大学出版社, 2015.
- [6] 约翰·马敬能, 卡伦·菲利普斯, 何芬. 中国鸟类野外手册 [M]. 湖南教育出版社, 2000.
- [7] 郑光美. 中国鸟类分类与分布名录 [M]. 科学出版社, 2005.

编校 洛松拉措

(上接16页)株高93.5cm、亩穗数22.4万/667m²、穗粒数46粒、千粒重42.6g、理论产量373.1kg/667m²。

实际产量居第四位的为5处理(商品有机肥25%+测土配方复混肥75%)+追肥尿素平均产量为283.6kg/667m², 平均株高92.5cm、亩穗数20.4万/667m²、穗粒数43粒、千粒重42.4g、理论产量316.1kg/667m²。

实际产量居第五位的为6处理(商品有机肥0%+测土配方复混肥100%)+追肥尿素平均产量为278.84kg/667m², 平均株高92.2cm、亩穗数20.9万/667m²、穗粒数45粒、千粒重42.8g、理论产量342.2kg/667m²。

实际产量居最后的为1处理CK无肥区平均产量为245.5kg/667m², 平均株高70.2cm、亩穗数14.1万/667m²、穗粒数40粒、千粒重34.2g、理论产量164.0kg/667m²。

本试验供试土壤有机质含量对比结果见表9。

表9 土壤化验结果

处理	播前有机质(g)	播后有机质(g)	有机质提高量(g)	有机质提高率(%)	排名
1	11.5	12.3	0.8	7	6
2	11.5	12.9	1.4	12	5
3	11.5	13.8	2.3	20	2
4	11.5	14.5	3	26	1
5	11.5	13.0	1.5	13	4
6	11.5	13.4	1.9	17	3

由表9得出有机质提高量最高的为4处理(商品有机肥50%+测土配方复混肥50%), 有机质提高率达到26%。

综上所述通过对比作物秸秆和籽粒实产分析、不同处理间方差分析及试验前后供试土壤有机质含量, 得出适宜山南市扎囊县施用商品有机肥与化肥配合施用最佳比例为商品有机肥50%+测土配方复混肥50%^[9]。

3.2 讨论

所有施用商品有机肥+测土配方复混肥的处理比及不施肥处理增产效果明显, 在株高、穗粒数、有效穗数、千粒重、秸秆及籽粒产量上均明显优于不施肥的处理, 证明试验地基础地力较差, 这与本文试验前测验的养分较低相互印证^[2]。由于本试验只是小区试验, 且样本数据较少, 有待再次试验, 进一步验证使用效果。

参考文献

- [1] 胡俊, 李芳, 李维. 加快西藏自治区商品有机肥推广应用的思考 [J]. 西藏农业科技, 2018(3): 59 - 61.
- [2] 陈初红, 袁成立, 陈雷, 等. 商品有机肥在春青稞上的应用效果 [J]. 西藏农业科技, 2019(增): 11 - 15.
- [3] 徐桂红, 徐珠, 陶有龙. 商品有机肥应用效果与施用技术研究 [J]. 金陵科技学院学报, 2012(4): 58 - 62.

编校 陈莎莎