

中国鸟类分布新记录——印度石鸻

2024年8月22日,在西藏自治区林芝市墨脱县德兴乡果果塘大拐弯附近($95^{\circ}18'E, 29^{\circ}20'N$,海拔820 m),观察到1只石鸻科Burhinidae鸟类(图1)。此鸟腿长,黄色带沙棕色;喙前端黑色,基部黄色;瞳孔黑色,虹膜黄色;翅膀上有3条棕色条纹和2条白色条纹平行相间,黑色飞羽边缘清晰可见,确定为印度石鸻*Burhinus indicus*。查阅《中国鸟类观察手册》(刘阳,陈水华,2021)、《中国鸟类野外手册》(约翰·马敬能等,2022)、《中国鸟类分类与分布名录(第四版)》(郑光美,2023)、中国观鸟记录中心BirdReport(<https://www.birdreport.cn/>)、Avibase(<https://avibase.bsc-eoc.org/>)、eBird(<https://ebird.org/>)、Birds of the World(<https://birdsoftheworld.org/>)等,确认为中国鸟类分布新记录。



图1 印度石鸻*Burhinus indicus* (普布次仁 摄)

印度石鸻隶属鸻形目Charadriiformes石鸻科石鸻属*Burhinus*,与新疆西北部分布的石鸻*B. oedicnemus*相比,体型更小,下嘴基黄色较少,体色深浅色分明、背羽色纵线多出褐色和白色2道,且初级飞羽黑色羽纹更重,尾长/体长值小,显得尾部更短(Vaurie, 1963);印度石鸻主要分布在印度半岛和中南半岛西部和南部,石鸻主要分布在欧洲南部和东部、非洲北部和中亚(BirdLife International, 2016, 2018; Hoyo *et al.*, 2020; Hume & Kiwan, 2020);印度石鸻常栖息于干燥的湿地沿岸和开阔的草地(Gupta & Kaushik, 2012),而石鸻见于多种干旱环境,如开阔平坦或起伏的沙地、戈壁、干河床、荒漠草原和灌丛地区,有时也见于农区(Tucker & Heath, 1994; 王岐山等, 2006)。

此次发现地位于雅鲁藏布大峡谷低海拔河谷,年均温 $17\sim 19^{\circ}C$,年降水量2 000~2 400 mm,干湿季分明;原生植被为热带季节性雨林,现为杂草丛生的果园和院落,有溪流和鱼塘,昆虫资源丰富。该鸟的居留型有待进一步观察研究。

赵旺林^{1, 2, 3}, 王渊^{4, 5}, 普布次仁², 王新⁶, 聂晓伟^{1, 3*}

(1. 中国科学院青藏高原研究所,北京100101; 2. 中国科学院墨脱地球景观与地球系统综合观测研究中心,西藏林芝860000; 3. 西藏大学生态环境学院,拉萨850000; 4. 中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所,北京100091; 5. 西藏自治区林业调查规划研究院,拉萨850000; 6. 四川省动物学会,成都610065)

基金项目:西藏自治区重点研发项目(XZ202201ZY0015G)

作者简介:赵旺林,博士研究生,研究方向:生态学, E-mail:zhaowanglin@foxmail.com

*通信作者, E-mail:xwnie@itpcas.ac.cn