

西藏亚东发现红腹咬鹃

Ward's Trogon (*Harpactes wardi*) Found in Yadong, Tibet, China

2019 年 4 月 8 日, 在西藏自治区日喀则市亚东县境内海拔 2 150 m 亚东河岸边的沟谷常绿阔叶林中 (N27°18'37", E89°00'27") 拍摄到 1 只咬鹃目 (Trogoniformes) 咬鹃科 (Trogonidae) 鸟类。此鸟前额两侧及眉纹为橙黄色, 眼周蓝灰色, 头至背部橄榄褐色, 中央尾羽黑色, 外侧尾羽具白斑, 初级飞羽黑褐色具白色外缘, 初级覆羽黑色, 次级覆羽褐色有细碎的黑斑纹, 喉至胸部灰褐色, 腹部柠檬黄色 (封面及图 1)。经鉴定, 此鸟为红腹咬鹃 (*Harpactes wardi*) 的雌鸟。



图 1 红腹咬鹃雌鸟, 拍摄地点西藏亚东县, 海拔 2 150 m

Fig. 1 Female Ward's Trogon, Yadong, Tibet, altitude 2 150 m

红腹咬鹃分布于亚洲喜马拉雅山脉东段南坡, 从不丹经我国藏南地区、印度东北部、缅甸的北部和东部至我国云南西部的高黎贡山 (杨岚 1995, Grimmer et al. 1999, de Hoyo et al. 2001, 2014)。此次发现不但证实了我国西藏亚东县境内确有红腹咬鹃分布, 而且也是红腹咬鹃新发现的最西分布地点。目前, 西藏境内已知有红腹咬鹃和红头咬鹃 (*H. erythrocephalus*) 分布, 在墨脱县海拔 1 000 m 的阔叶林中曾采集到红头咬鹃标本 (郑作新等 1983)。红头咬鹃的分布范围比红腹咬鹃更广, 而红腹咬鹃的数量更稀少 (Hoyo et al. 2001, 谭耀匡等 2003)。这两种咬鹃在西藏的分布和生态关系需要进一步关注。

封面动物 红腹咬鹃雌鸟, 2019 年 4 月 8 日罗平钊拍摄于西藏亚东县。

王宁^① 罗平钊^② 西洛次仁^③ 拉巴次仁^③

① 北京师范大学生命科学学院 北京 100875; ② 西南山地 成都 610000; ③ 西藏亚东县林业和草原局 亚东 857600

基金项目 国家林业和草原局“全国第二次陆生野生动物专项调查”项目;

* 通讯作者, E-mail: wangning@bnu.edu.cn;

第一作者介绍 王宁, 男, 博士; 研究方向: 鸟类生态学; E-mail: wangning@bnu.edu.cn。

收稿日期: 2019-06-18, 修回日期: 2020-01-21 DOI: 10.13859/j.cjz.202003017