

西藏及云南鸟类的国内新纪录

NEW RECORDS OF CHINESE BIRDS FROM YUNNAN AND TIBET

我们最近从云南及西藏所采集的大量标本中,发现下列鸟类是我国以往未曾纪录过的,现简报如下。

1. 红喉山鹧鸪 *Arborophila rufogularis intermedia* Blyth 亚种新纪录

1♂, 5♀♀: 云南路西勐旺、盈江大南俄、雪梨, 1965. III. 11-19, IV. 13, 18。体重* ♂340, 5♀♀ 256(202-300), 翅长* ♂140, 5♀♀ 131(125-138)。

与指名亚种 *Arborophila r. rufogularis* 的区别在于颈及上喉黑色,下喉棕色,在棕色部分后面不具黑缘;两胁的白色羽干斑呈水滴状。产自云南蒙自的 *A. r. euroa* 亚种,体形较大(翅长 2♂♂ 160),两胁的白色羽干纹成线状(据 Bangs et Phillips, 1914)。

2. 白颊山鹧鸪 *Arborophila atrogularis* Blyth 种的新纪录

1♀: 云南盈江大南俄, 1965. IV. 19, 体重 220, 翅长 127。

体形与红喉山鹧鸪 *A. rufogularis* 相似,但背部羽端具狭小黑色横斑,颊和耳羽均乳白,胁部不具栗色,喉无棕色,上胸灰色,具黑色条纹。

3. 黑鹇 *Lophura leucomelana leucomelana* (Latham) 亚种新纪录

1♂: 西藏南部聂木拉县樟木(海拔 2,200 米), 1966. V. 9, 体重 770, 翅长 220。

下背、腰及上部尾上覆羽均黑闪紫,而具 3 毫米宽的白缘,较窄于 *L. l. hamiltoni* 的白缘(达 5 毫米);翅亦较后者(225-250 毫米)为短。胸羽矛状,而具污白色端部,不似 *L. l. lathamii* 的胸全黑,而沾金属蓝紫色。

4. 栗腹鹇 *Sitta castanea tonkinensis* Kinnear 亚种新纪录

6♂♂, 4♀♀: 云南思茅、小勐养、勐阿、勐遮、勐腊; 1957-59, I-II, X-XII (原误定为 *S. c. cinnamoventris* 亚种;见本学报, 1962, 14:88)。翅长 6♂♂ 84.5(83-88), 4♀♀ 84-90。

翅较滇西盈江地区所采的 *S. c. cinnamoventris* (2♂♂ 82, 83, 2♀♀ 81, 84) 显著为长,白色颊羽的羽基黑色亦较多些。

沈耀华、彭燕章、王子玉、杨鳳、郑作新 (中国科学院动物研究所,云南省动物研究所)

* 衡度以克、量度以毫米为单位,以下同。