

西藏墨脱县发现灰喉山椒鸟

2016 年 3 月 9 日,在西藏自治区墨脱县德兴乡那尔东村(29°21'16.84"N,95°8'39.98"E,海拔 1 874 m)观察到雌、雄山椒鸟各 1 只,该鸟体长 18~25 cm,雄鸟、雌鸟头部均为灰色。雄鸟背部亮黑色,腰、尾、胸部覆羽及下体呈朱红色,翅黑色,具一大一小 2 道“7”字形朱红色翼斑;中央尾羽黑色,外侧尾羽基部黑色,端部红色。雌鸟胸部及整个下体均为黄色,腰和尾上覆羽亦为黄色,翅和尾为黄色,颜色分布与雄鸟大致相似(图 1),经鉴定为灰喉山椒鸟 *Pericocotus solaris*。虽然 MacKinnon 等(2000)认为该鸟指名亚种分布于西藏东南部,但查阅众多文献(中国科学院青藏高原综合科学考察队,1983;郑光美,2011;刘迺发等,2013;曲利明,2014)后均未发现该鸟在西藏有分布的记载。有学者也曾记录其分布于喜马拉雅山脉中段,即珠穆朗玛峰国家级自然保护区(李晶晶等,2013),但无直接证据证明南段或南坡有无该鸟的分布。而曲利明(2014)认为该鸟国外分布于喜马拉雅山脉中段和东段,经查阅大量资料表明该鸟广泛分布于国内喜马拉雅山脉区域,此次记录也为该鸟在西藏分布提供了直接且更为广泛的证据。




图 1 灰喉山椒鸟 *Pericocotus solaris* (王渊 摄)

发现该鸟时,其在河谷半山腰的榕属 *Ficus* sp. 植物的枝头上活动,不时鸣叫。发现地气候属于热带雨林气候,周边植被以常绿阔叶林为主,海拔 1 874 m,与该鸟的其他发现地生境类似(赵正阶等,2001)。同时,该鸟雌、雄同时出现,并有较多互动行为,由于正值繁殖季节,猜测可能在进行求偶行为。另外,当地还分布有短嘴山椒鸟 *P. brevirostris*、长尾山椒鸟 *P. ethologus* 和粉红山椒鸟 *P. roseus*,且这 3 种山椒鸟的种群数量较大,可能与灰喉山椒鸟在食物和活动空间上存在竞争,会对该鸟的生存造成一定的影响。关于该鸟更多的生态学信息有待进一步的研究。

灰喉山椒鸟隶属雀形目 Passeriformes 山椒鸟科 Campephagidae 山椒鸟属 *Pericocotus*,国内分布于云南、贵州和广西等,国外分布于不丹、孟加拉国、印度东北部和缅甸等(赵正阶等,2001)。该种共分为 7 个亚种,国内已知分布有指名亚种 *P. s. solaris* 和华南亚种 *P. s. griseigularis*(赵正阶等,2001;郑光美,2011)。根据亚种分布及形态描述,推测本次在墨脱县观察到的灰喉山椒鸟为指名亚种,属留鸟。本次记录可为灰喉山椒鸟在我国分布研究提供基础资料。

王渊*, 次平, 李大江, 刘锋, 朱雪林, 李炳章*

(西藏自治区林业调查规划研究院,拉萨 850000)

基金项目: 西藏自治区第二次陆生野生动物资源调查项目

*通信作者, E-mail: wangyuan2010@163.com; 465050675@qq.com

致谢: 感谢中国科学院北京动物研究所博士研究生李娜对鸟种鉴定提供的帮助。