

西藏墨脱县发现长尾阔嘴鸟

Long-tailed Broadbill (*Psarisomus dalhousiae*) Found in Motuo County, Tibet, China

2015年10月21日,在西藏自治区墨脱县德兴乡(29°20'9.97"N, 95°19'13.20"E,海拔780 m)观察到阔嘴鸟2只,该鸟体长约25 cm,顶冠及颈背黑色,头顶具蓝色小点斑,喙呈黄绿色,脸及喉部呈黄色,眼后有一黄色点斑,体呈绿色且两翼有蓝斑,尾呈楔形(图1),经鉴定为长尾阔嘴鸟(*Psarisomus dalhousiae*)。MacKinnon等(2000)认为该鸟种分布于西藏东南部,而Bruce(2003)在《世界鸟类手册》中引用了前者的描述。然而,因缺乏实际观察记录,之后我国鸟类学者的著作中均未将长尾阔嘴鸟列为在西藏有分布的鸟类(郑光美 2011)。虽然长尾阔嘴鸟曾记录于喜马拉雅山脉东南地区(Singh 1994, Choudhury 2003),却无确切观察记录于西藏的其他地区。此次记录为该鸟类在西藏分布提供了直接证据,且是该物种在中国已知的分布最北记录。



图1 长尾阔嘴鸟 Long-tailed Broadbill

发现时,长尾阔嘴鸟栖息于山黄麻(*Trema tomentosa*)树枝上,然后飞至榕树(*Ficus* sp.)上藏匿。经观察,周围生境主要为农耕香蕉地、常绿阔叶林及灌丛。长尾阔嘴鸟通常栖息于海拔880~1500 m的常绿阔叶林中,不常见于亚热带原始林及成熟的次生山林(赵正阶 2001)。墨脱县属于喜马拉雅山脉东侧的亚热带湿润气候区,其气候和生境类型均与已报道的长尾阔嘴鸟分布区相似。

长尾阔嘴鸟隶属雀形目(Passeriformes)阔嘴鸟科(Eurylaimidae)阔嘴鸟属。国外分布于尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度东北部、缅甸、老挝、越南、泰国、马来西亚、苏门答腊和加里曼丹等地。国内分布于云南南部、

广西西南部和贵州西南部(郑光美 2011)。该种共分为5个亚种,国内已知分布为指名亚种*dalhousiae*(郑光美 2011)。根据亚种分布,推测本次在墨脱县观察到的长尾阔嘴鸟仍为指名亚种,应属当地留鸟。

致谢 感谢中山大学生命科学学院博士研究生梁丹鉴定鸟种并提供相关文献,中国科学院成都生物研究所高云东博士帮助鉴定植物物种。

王 渊 刘 锋 次 平 吴建普 李炳章 朱雪林* 刘务林*

西藏自治区林业调查规划研究院 拉萨 850000

基金项目 西藏自治区第二次陆生野生动物资源调查项目;

* 通讯作者, E-mail: zxlslxz@163.com, wulinliu01@163.com;

第一作者介绍 王渊,男,助理工程师;研究方向:野生动植物保护;E-mail: wangyuan2010@163.com。

收稿日期: 2015-11-08, 修回日期: 2016-03-04 DOI: 10.13859/j.cjz.201603020