

西藏拉萨市多地发现外来物种八哥^{*}

杨乐 周生灵 土艳丽

(西藏自治区高原生物研究所,西藏 拉萨 850000)

摘 要 笔者于 5 月 7 日至 11 日在拉萨城区周边的保护区和公园陆续发现八哥(*Acridotheres cristatellus*) 20 只以上,因为西藏尚未有发现该物种的记录,判定应为无意引入后放生或逃逸的外来物种。

关键词: 八哥 外来物种 物种分类

2017 年 5 月 7 日清晨,笔者在拉萨市城关区北部拉鲁湿地(N29°39.723',E91°05.003')进行调查时发现具明显冠羽的黑色鸟类,展翅飞行时翅上有明显的白斑,静止站立时能够观测到两翅和尾端有明显白色,虹膜为橘黄色,喙为浅黄色,鸣声大而嘹亮。经鉴定,该鸟为八哥。



图 1

在 5 月 8 - 11 日开展的调查中,陆续发现罗布林卡(N29°39.072',E91°05.663')、龙王潭公园(N29°39.375',E91°07.363')都有该物种的分布,其总数量达 20 只以上,既常见于林隙的草地,也经常在高大乔木上鸣叫,并能够聚成小群活动。

经查证,该物种在世界范围主要分布在中国及印度支那,引种至菲律宾及婆罗洲^[1],距离青藏高原最近的分布点包括云南腾冲、泸水、洱源、丽江(留鸟)等地^[2]。主要有三个亚种,亚种 *A. c. cristatellus* 主要分布在北京、山东、河南南部、陕西南部等多地;亚种 *A. c. brevipennis* 主要分布在海南;亚种 *A. c. formosanus* 主

要分布在台湾^[3]。



图 2

鉴于西藏还未有发现该物种的纪录^[4],同一时间段发现如此大的规模,其来源很有可能是无意引入的外来物种,因为放生或逃逸扩散到以城市公园为主的环境中,是否会形成稳定的入侵种群仍有待观察。

参考文献

- [1] 约翰·马敬能,卡伦·菲利普斯. 中国鸟类野外手册 [M]. 长沙: 湖南教育出版社,2000: 316.
- [2] 刘迺发,包新康,廖继承. 青藏高原鸟类分类与分布 [M]. 北京: 科学出版社,2013: 183.
- [3] 郑光美. 中国鸟类分类与分布名录 [M]. 北京: 科学出版社,2011: 202.
- [4] 西藏自治区地方志编委员会编. 西藏自治区志动物志 [M]. 北京: 中国藏学出版社,159 - 178.

编校 陈莎莎

^{*} 基金项目: 西藏自治区科技重大专项“西藏高风险区外来入侵物种及其安全性调查项目”(2015XZ01G72)