

- 王建艳, 于志刚, 甄毓, 等. 2012. 环境因子对海月水母生长发育影响的研究进展. 应用生态学报, 23(11): 3207–3217.
- 王文龙, 冷向军, 刘晔. 2009. 不同饲料对海月水母生长性能的影响. 大连水产学院学报, 24(5): 412–416.
- 徐如卫. 1992. 泥鳅 *Misgurnus anguillicaudatus* Cantor 精子寿命的初步观察. 浙江水产学院学报, 11(1): 70–71.
- 闫家强, 魏平, 姜建湖, 等. 2010. 环境因子及超低温冻存对黄姑鱼精子活力的影响. 生态科学, 29(4): 339–344.
- 郑凤英, 陈四清, 倪佳. 2010. 海月水母的生物学特性及其爆发. 海洋科学进展, 28(1): 126–132.
- 朱冬发, 成永旭, 王春琳, 等. 2005. 环境因子对大黄鱼精子活力的影响. 水产科学, 24(12): 4–6.

西藏昌都发现白鹭

Egretta garzetta Found in Changdu Area of Tibet

2013 年 9 月至 2014 年 6 月, 笔者在西藏昌都市八宿县、贡觉县、芒康县和昌都县先后观察并拍摄到白鹭 (*Egretta garzetta*), 为西藏首次发现。

2013 年 9 月 29 日, 在八宿县然乌镇政府后方的湖边 (29°30'17.28"N, 96°45'25.44"E, 海拔 3 934 m), 观察到 2 只白鹭成鸟, 其体形纤瘦, 全身羽毛白色, 头部无羽冠, 肩、背和前胸的蓑状羽也消失, 呈冬羽特征; 虹膜为黄色; 眼先黄绿; 嘴黑色, 但嘴裂处及下嘴基部显淡黄色; 胫与跗跖部黑色, 趾黄绿色。2014 年 5 月至 6 月, 在贡觉县哈加乡曲登村西边的河滩上 (30°36'27.60"N, 98°26'49.90"E, 海拔 3 810 m)、芒康县莽措湖边 (29°30'49.84"N, 98°52'30.19"E, 海拔 4 307 m) 和昌都县金河电站附近河滩 (31°06'20.11"N, 97°11'21.41"E, 海拔 4 307 m) 也发现白鹭活动, 所观察到的白鹭颜色纯白, 颈背具细长饰羽, 背及胸具蓑状羽, 呈繁殖羽特征, 脸部也略显淡粉色。发现白鹭地点主要为湖泊和河流, 湖泊周边生境以根茎禾草草甸草原和半灌木草原为主, 河流边上主要是山地旱生落叶阔叶灌丛。在各发现白鹭的地区同时还发现牛背鹭 (*Bubulcus ibis*)、斑头雁 (*Anser indicus*) 和赤麻鸭 (*Tadorna ferruginea*) 等候鸟。

白鹭在《西藏鸟类志》、《中国鸟类志》上卷、《中国鸟类野外手册》以及《中国鸟类分类与分布名录》(第二版) 均未记载分布于西藏自治区, 在据此发现地最近的青海省三江源区及青海湖流域、四川省成都、宜宾等中东部地区和云南大理均发现过白鹭的分布, 这次在西藏东南部高海拔地区的发现, 对于该鸟种的地理分布研究, 具有一定的参考价值。

赵冬冬^① 郭克疾^② 熊嘉武^② 刘务林^③ 邓学建^{①*}

① 湖南师范大学生命科学学院 长沙 410081; ② 国家林业局中南林业调查规划设计院 长沙 410014;

③ 西藏自治区林业调查规划研究院 拉萨 850030

* 通讯作者, E-mail: dxj8871922@163.com;

第一作者介绍 赵冬冬, 男, 硕士研究生; 研究方向: 野生动物保育与利用; E-mail: zdd2008574239@163.com.

收稿日期: 2014-08-14, 修回日期: 2014-11-24 DOI: 10.13859/j.cjz.201501023