

西藏自治区鸟类新记录——仓鸮

2020 年 8 月 2 日西藏自治区墨脱县达木乡(95°27′48.39″E, 29°29′39.22″N, 海拔 1 577 m), 护林员扎西在例行巡护时, 听到一阵阵类似小孩的叫声, 走进后发现是 1 只翅膀受伤的鸟类躲避在老百姓的柴垛旁, 待其状态稳定后, 护林员将其救护到笼中, 并移交墨脱县林业和草原局进行救护, 同时墨脱县林业和草原局拍照委托西藏自治区林业调查规划研究院司法鉴定中心鉴定并进行现场探查。

该鸟体型中等, 头大而圆, 面庞显著, 呈心脏型, 白色; 皱领橙黄色; 无耳状羽簇; 上体羽毛为斑驳的灰色渲染橙黄色, 具较小的黑白点斑, 飞羽和尾部深色斑纹, 下体白色具深色小斑点(图 1)。符合仓鸮 *Tyto alba* 的鉴定特征(König & Weick, 2008, Grimmett *et al.*, 2011), 鉴定为仓鸮。此前尚无仓鸮分布于西藏自治区的研究报道(郑作新等, 1983; 约翰·马敬能等, 2000; Grimmett *et al.*, 2011; 刘迺发等, 2013; 郑光美等, 2017), 此次救护记录为仓鸮在西藏自治区的首次记录, 属于西藏自治区的鸟类新记录。

仓鸮隶属鸮形目 Strigiformes 草鸮科 Tytonidae 草鸮属(König & Weick, 2008)。国外主要分布于欧洲、非洲和中亚地区, 在印度、孟加拉国、泰国、缅甸、马来西亚以及中南半岛等地亦有分布(赵正阶, 2001; König & Weick, 2008)。关于仓鸮的种下分类存在诸多争议(Christidis *et al.*, 2014; Clements *et al.*, 2020; Gill *et al.*, 2020)。通常认为我国分布有 2 个亚种, 即 *T. a. javanica* 和 *T. a. stertens*, 其中 *T. a. javanica* 仅分布于云南南部, 而 *T. a. stertens* 分布于云南中部、贵州和广西(赵正阶, 2001; 郑光美, 2017), 近年来仓鸮在海南亦有记录(梁斌等, 2019); 但杨岚等(1995)认为中国只有 *T. a. stertens* 亚种。本次记录的仓鸮属于 *T. a. stertens* 亚种。

在此之前, 仓鸮在西藏并无自然分布或人工饲养的报道, 加之当地对野生动物的严格管理, 可以排除该个体由其他地区运输而来的可能性。另一方面, 仓鸮在与墨脱县邻近的印度阿萨姆邦为留鸟(Rasmussen & Anderton, 2012), 加之记录地点达木乡属于视野开阔的低山、农田区域, 周边有大面积的原始森林, 属于山地亚热带半湿润气候带(海拔 1 000 ~ 2 400 m), 符合仓鸮的栖息地特征。因此, 此次救助的仓鸮应属于自然分布, 其居留状况有待进一步研究。



图 1 仓鸮 *Tyto alba* (张鹏飞 摄)

刘锋¹, 张鹏飞², 普布顿珠¹, 范丽卿³, 刘震², 刘务林^{1*}, 王渊^{1*}

- (1. 西藏自治区林业调查规划研究院, 拉萨 850000; 2. 墨脱县林业和草原局, 西藏林芝 860700;
3. 西藏农牧学院高原生态研究所西藏高原森林生态教育部重点实验室, 西藏林芝 860000)

基金项目: 西藏自治区第二次陆生野生动物资源调查项目

作者简介: 刘锋, 工程师, 研究方向: 野生动物与自然保护区, E-mail: crazymonkey@aliyun.com

* 通信作者, E-mail: wulinliu01@163.com; 271694082@qq.com

致谢: 感谢西藏自治区墨脱县达木乡护林员及时对仓鸮进行救护, 并且感谢他们在野外巡护工作中的付出;
感谢四川省林业科学研究院刘少英研究员和成都大熊猫繁育研究基地阚品甲博士对该物种分布及写作的指导。