

DOI:10.12356/j.2096-8884.2024-0063

· 研究简报 ·

西藏鸟类分布新纪录——黄喉鹀

曾 卫¹, 张小鹏¹, 朱高凡^{1,2}, 肖义发¹, 张天星^{1*}

1. 国家林业和草原局西南调查规划院, 昆明 650216; 2. 云南省林业调查规划院, 昆明 650051

摘要: 2023年5月29日于林芝市察隅县察瓦龙乡梦扎村(98°17'37.94" E, 28°33'39.47" N, 海拔2448 m)记录到3只鹀类, 眉纹和上喉亮黄色, 头顶黑色, 下喉纯白, 下体余部近白, 经鉴定为黄喉鹀(*Emberiza elegans*)。查阅相关文献和数据库后, 确定该种是西藏鸟类分布新纪录。

关键词: 黄喉鹀; 西藏; 新纪录

中图分类号: Q959 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-8884(2024)04-0085-02

A New Distribution Record of Yellow-throated Bunting (*Emberiza elegans*) in Tibet

Zeng Wei¹, Zhang Xiaopeng¹, Zhu Gaofan^{1,2}, Xiao Yifa¹, Zhang Tianxing^{1*}

1. Southwest Survey and Planning Institute of the National Forestry and Grassland Administration, Kunming 650216, China;

2. Yunnan Institute of Forest Inventory and Planning, Kunming 650051, China

Abstract: On May 29, 2023, three buntings were recorded at Mengzha Village, Chawalong Township, Chayu County, Linzhi City (98°17'37.94" E, 28°33'39.47" N, altitude 2448 m), with bright yellow brow stripe and upper throat, black head, pure white lower throat, and near-white rest of the lower body. Based on these features, these birds were identified as yellow-throated buntings. By referring to relevant literature and databases, it was determined that this species is a new distribution record of birds in Tibet.

Key words: Yellow-throated bunting; Tibet; New record

2023年5月29日, 在西藏伯舒拉岭区域开展动植物监测工作时, 于林芝市察隅县察瓦龙乡梦扎村(98°17'37.94" E, 28°33'39.47" N, 海拔2448 m)观测到3只雀形目(PASSERIFORMES)鹀科(Emberizidae)鸟类。此鸟体型中等, 眉纹鲜黄, 向后渐宽, 头顶黑色, 形成短羽冠; 眼先和头侧及颊黑色; 上喉亮黄, 下喉纯白, 胸具黑色半圆形宽斑, 下体余部近白, 两胁浅棕具栗褐色条纹(图1), 经鉴定为黄喉鹀(*Emberiza elegans*)。通过查阅相关文献(郑光美, 2023; 卢欣, 2018)及中国观鸟记录中心(<https://www.birdreport.cn/>)和eBird(<https://ebird.org/explore>)等数据库, 暂无黄喉鹀在西藏分布的相关报道, 确定该种为西藏鸟类分布新纪录。

根据相关文献(刘阳和陈水华, 2021; 段文科

和张正旺, 2017; 刘迺发等, 2013), 黄喉鹀主要繁殖于开阔、干燥的落叶林或混交林及灌木林, 活动于林缘、草坡、路边和农田地区, 通常近溪流。其后笔者又于2023年5月30日、2023年10月17日和2024年6月25日在梦扎村附近各记录到3次, 共5只个体(表1), 记录到黄喉鹀分布于落叶阔叶林、针阔混交林和灌丛生境, 位于庄通曲和让舍曲河流两侧, 与文献记载生境类型一致。2023年5月29日第一次发现黄喉鹀时, 3只个体中有1只为幼鸟, 雄鸟在枝头鸣唱, 同域活动的鸟类有红胸啄花鸟(*Dicaeum ignipectus*)、黑眉长尾山雀(*Aegithalos bonvaloti*)、栗臀鹀(*Sitta nagaensis*)、短嘴山椒鸟(*Pericrocotus brevirostris*)等。

察瓦龙乡地处藏东南山区, 发现地点植被与以

收稿日期: 2024-07-17; 接受日期: 2024-08-27

基金项目: 高黎贡山(西藏段)动植物监测项目(2022-155)

第一作者 The first author. E-mail: zengwei1014@163.com; *通讯作者 Author for correspondence. E-mail: 460103153@qq.com



图 1 西藏察隅县拍摄到的黄喉鹀(曾卫 摄)
Fig. 1 Yellow-throated Bunting photographed in Chayu County, Tibet (Photographed by Zeng Wei)

表 1 黄喉鹀记录点信息

Table 1 Site information of new distribution record of Yellow-throated Bunting

序号 No.	时间 Time	数量 Number	地点 Site	东经 East longitude/E	北纬 North latitude/N	海拔 Elevation/m
1	2023-5-29	3	察瓦龙乡梦扎村附近	98°17'37.94"	28°33'39.47"	2448
2	2023-5-30	1	察瓦龙乡梦扎村扎哈组	98°14'34.95"	28°32'01.82"	2946
3	2023-10-17	2	察瓦龙乡梦扎村附近	98°17'40.60"	28°33'27.03"	2427
4	2024-6-25	2	察瓦龙乡梦扎村附近	98°17'52.17"	28°33'27.67"	2455

往黄喉鹀报道分布生境相似，且位于滇藏交界地带。因此，证实黄喉鹀已经扩散至西藏境内，在该区域居留型应为夏候鸟或留鸟。

致 谢

野外调查过程中得到调查队员侯自强、陈可欣和邓涛的帮助，在此一并致谢！

参考文献

刘迺发, 包新康, 廖继承, 2013. 青藏高原鸟类分类与分布 [M]. 北京: 科学出版社.
卢欣, 2018. 中国青藏高原鸟类 [M]. 长沙: 湖南科学技术出版社.
郑光美, 2023. 中国鸟类分类与分布名录 [M]. 4 版. 北京: 科学出版社.
段文科, 张正旺, 2017. 中国鸟类图志: 下卷: 雀形目 [M]. 北京: 中国林业出版社.
刘阳, 陈水华, 2021. 中国鸟类观察手册 [M]. 长沙: 湖南科学技术出版社.