



DOI:10.19711/j.cnki.issn2310-1490.2019.02.040

西藏鸟类新发现——绿鹭

陈越¹ 舒服² 吴建普¹ 王渊¹ 刘锋^{1*} 李大江^{1*}

(1. 西藏自治区林业调查规划研究院, 拉萨, 850000;
2. 国家林业局中南林业调查规划设计院环发新技术公司, 长沙, 410014)

稿件运行过程

收稿日期: 2018–10–16
修回日期: 2018–11–20
发表日期: 2019–05–10

关键词: 绿鹭;
新发现;
察隅

Key words: *Butorides striatus*;
New record;
Chayu county

中图分类号: Q958

文献标识码: A

文章编号:

2310–1490 (2019) 02–519–02

摘要:

2016年6月18–19日,在西藏自治区察隅县观察到2只鹭科鸟类,经鉴定该鸟为绿鹭(*Butorides striatus*),确认该鸟为西藏鸟类新纪录。根据国内已知亚种的分布,该鸟可能通过横断山区的峡谷到达发现地,并初步判断本次发现的绿鹭为*B. s. actophilus*亚种。初步推测本次发现的绿鹭居留型属当地夏候鸟。

New Birds Records in Tibet, China:

Striated Heron (*Butorides striata*)

CHEN Yue¹ SHU Fu² WU Jianpu¹ WANG Yuan¹
LIU Feng^{1*} LI Dajiang^{1*}

(1. Forest Inventory and Planning Institute of Tibet, Lhasa, 850000, China;
2. Environmental Development & New Technologies Company of Central South
Forest Inventory and Planning Institute, National Forestry and Grassland
Administration, Changsha, 410014, China)

Abstract: Two birds of the family Ardeidae were recorded in Chayu County, Tibet, on 18–19 June 2016, they were identified as striated heron (*Butorides striatus*). This is a new bird record for the Tibet Autonomous Region. According to the distribution of known subspecies in China, the two striated herons might have arrived there through the Hengduan mountain area. We assume that the two striated herons represented the subspecies *Butorides striata actophilus* and we presume that striated heron is a summer visitor to Tibet.

2016年6月18–19日,在西藏自治区察隅县竹瓦根镇(28°39′11.40″N, 97°27′16.43″E,海拔2300 m)调查时发现2只鹭科(*Ardeidae*)鸟类,该鸟全身深灰色,不同于白鹭(*Egretta garzetta*)、中白鹭

(*Egretta intermedia*)、牛背鹭(*Bubulcus ibis*)等白色型鹭科鸟类,体型较小于其他鹭科鸟类,但又明显不同于池鹭(*Ardeola bacchus*)、鸊鷉等小型鹭科鸟类。具体鉴别特征为:头顶绿黑色,枕冠亦绿黑色,颊和颏

基金项目: 西藏自治区第二次陆生野生动物资源调查项目

第一作者简介: 陈越,女,28岁,工程师;主要从事野生动植物保护与自然保护区管理研究。E-mail: 675670755@qq.com

* 通讯作者: 刘锋, E-mail: crazymonkey@aliyun.com; 李大江, E-mail: jiangailoving@qq.com

白色, 嘴基一道黑色线过眼向后延伸, 颈和上体灰蓝色, 下体两侧银灰色, 翅及尾青蓝色(图1)。经鉴定该鸟为绿鹭(*Butorides striatus*)^[1-3], 通过查阅相关文献^[4-9], 确认该鸟为西藏鸟类新纪录。

发现时其中1只绿鹭飞于江面上, 并降落于江中搁浅的浮木上, 停留约5 min后飞走。待笔者继续前行时, 从另一方向飞来另1只绿鹭, 该绿鹭在另一侧的水塘边石滩上停留约1 min后飞入水塘旁的灌木丛中, 等待较长时间仍未出现。该绿鹭栖息于有树木和灌丛的河流岸边。周围还生活着池鹭和牛背鹭。

绿鹭隶属鹳形目(Ciconiiformes)鹭科绿鹭属。绿鹭广泛分布于全温带, 主要是亚洲、非洲、美洲和澳洲等热带和亚热带水域和湿地; 我国主要分布于东北东南部、华东、华南、台湾和海南岛^[4]。本次发现的绿鹭可能通过横断山区的峡谷, 如丙中洛—察瓦龙—察隅, 飞到发现地。该鸟共有37个亚种, 国内已知分布为*B. s. actophilus*亚种、*B. s. amurensis*亚种和*B. s. javanicus*亚种^[2,9]。根据国内已知亚种的分布, 初步判断本次发现的绿鹭为*B. s. actophilus*亚种, 另外, 察隅县气候冬冷夏暖, 推测本次发现的绿鹭居留

型属当地夏候鸟。

参考文献:

- [1] 约翰·马敬能, 卡伦·菲利普斯, 何芬奇. 中国鸟类野外手册 [M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2000.
- [2] 赵正阶. 中国鸟类志: 上卷 [M]. 长春: 吉林科学技术出版社, 2001.
- [3] 曲利明. 中国鸟类图鉴 [M]. 福州: 海峡出版发行集团, 2013.
- [4] 李晶晶, 韩联宪, 曹宏芬, 等. 珠穆朗玛峰国家级自然保护区鸟类区系及其垂直分布特征 [J]. 动物学研究, 2013, 34(6): 531–548.
- [5] GRIMMETT R, INSKIPP C, INSKIPP T. Birds of the Indian sub-continent [M]. China: C&C Offset Printing Co Ltd, 2014.
- [6] 刘迺发, 包新康, 廖继承. 青藏高原鸟类分类与分布 [M]. 北京: 科学出版社, 2013.
- [7] 中国科学院青藏高原综合科学考察队. 西藏鸟类志 [M]. 北京: 科学出版社, 1983.
- [8] 郑光美. 中国鸟类分类与分布名录 [M]. 3版, 北京: 科学出版社, 2017.
- [9] 聂延秋. 中国鸟类识别手册 [M]. 北京: 中国林业出版社, 2018.



图1 绿鹭(刘锋摄影)

Fig. 1 *Butorides striatus* (Photo by LIU Feng)