

西藏鸟类的国内亚种新纪录

NEW RECORDS OF SUBSPECIES OF CHINESE BIRDS FROM XIZANG

在整理西藏的标本时,发现下列鸟类是我国过去未曾纪录过的,现简报于后。

1. 红喉山鹧鸪 *Arborophila r. rufogularis* Blyth

1♂。墨脱县,背崩(海拔 850 米); 1977. 7. 25。翅长 122*。

本亚种体形较小,颈和上喉几白色,下喉棕色;棕色后面具明显的黑缘,形成一个完整的黑带,与胸部相界,明显有别于 *A. r. intermedia* 和 *A. r. euroa* 亚种。

2. 姬啄木鸟 *Picumnus i. innominatus* Burton

1♂。墨脱县,背崩(海拔 850 米); 1977. 8. 10。翅长 55。

上体辉亮,渲染橙色,头部较淡沾绿色色彩。而相近的 *P. i. malayorum* 亚种上体暗,头部亦暗,富于灰色。

3. 棕啄木鸟 *Sasia o. ochracea* Hodson

1♂。墨脱县,背崩(海拔 850 米); 1977. 8. 17。翅长 50。

与 *S. o. reichenowi* 亚种相较,此亚种上体羽色较暗,下体呈深的赤褐色,而非橙棕色。

4. 黑枕缘啄木鸟 *Picus canus gyldenstolpei* Baker

1♀。墨脱县,墨脱(海拔 1,300 米); 1977. 8. 18。翅长 137。

上体呈辉亮的金黄色光泽,特别是内侧飞羽表面;体较小;据国外资料翅长为 140—146。而与之近似的亚种 *P. c. hessei* 的翅长为 142—154,上体的光泽亦较弱,多橄榄绿。

5. 赤胸啄木鸟 *Dendrocopos c. cathapharius* Blyth

1♂。错那县,勒布(海拔 2,500 米); 1977. 6. 24。

与西藏分布的 *D. c. ludlowi* 亚种区别在于胸部的赤色不成斑块状,而呈不明显的弥散状。

6. 黑卷尾 *Dicrurus macrocercus albicinctus* Hodgson

1♂, 2♀♀。错那县,勒布(海拔 2,500 米); 1977. 6. 24—30。翅长 1♂ 151, 2♀♀

* 量度以毫米为单位,下同。

138, 140; 尾长 1♂ 176, 2 ♀♀ 149, 158。

这个亚种体形较广布于我国南部和东南部各省的 *D. m. cathoecus* 亚种为大, 翅长为 145—165, 最外侧尾羽特形延长, 尾长 150—180 毫米。*D. m. cathoecus* 翅长(♂)平均 144, 最外侧尾羽(♂) 145.4(140—154)。

6 月 25 日在一栋科植物的侧枝上得一巢, 侧枝垂于公路上方, 距地 10 米左右。巢的外层由地衣和细松枝盘成, 内层垫以细的干草茎, 巢显得很坚实, 细致。巢高 55, 深 38, 外径 130, 内径 80, 巢内有卵一枚, 呈浅红色, 上布褐色斑点, 钝端较密; 另有已孵出的雏鸟一只, 全裸无羽, 未睁眼, 重 6 克。

7. 褐喉旋木雀 *Certhia d. discolor* Blyth

1 ♂。亚东县, 阿桑村(海拔 2,800 米); 1977. 6. 11。翅长 71。

与分布于云南西部的 *C. d. shanensis* 亚种相较, 上体淡, 前胁和腹部带暗黄色, 而非土褐色。

8. 红嘴钩嘴鹛 *Pomatorhinus f. ferruginosus* Blyth

1 ♂, 1 ♀。墨脱县, 背崩(海拔 850 米); 1977. 8. 7—19。翅长 89、84。

与国内分布于云南的 *P. f. orientalis* 亚种比较, 嘴橘红色; 白眉特著; 头黑, 胸和腹部中央纯锈红色。*P. f. orientalis* 亚种头橄榄褐色, 胸和腹部呈浅皮黄色。

9. 黑头穗鹛 *Stachyris nigriceps coei* Ripley

1 ♀。墨脱县, 背崩(海拔 850 米); 1977. 8. 11。翅长 58。

与分布于国内的 *S. n. colarti* 和 *S. n. yunnanensis* 亚种比较, 头部羽色呈黑色, 耳羽暗褐, 上体暗橄榄褐, 喉斑后羽缘呈黑色。而后两个亚种头部均灰黑, 上体羽橄榄褐色, 喉斑后羽缘一为灰褐, 另一呈黑灰色。

李德浩 王祖祥

(青海省生物研究所) 1978 年 2 月 20 日

中国蟋类昆虫鉴定手册(半翅目异翅亚目)第一册

萧采瑜 等编著

本书计划分四册出版, 包括在我国已有记载的和新发现的半翅目异翅亚目种类。第一册论述了 9 个科, 共 742 种, 其中包括 6 新属、1 新亚属、93 新种、1 新亚种和 72 种在我国的首次记录。

本书按分类系统编排, 科、属、种各阶元均用检索表区分, 并附特征简图和形态描述, 绝大多数的种类都附有整体图版。

科学出版社 1977 年