

西藏鸟类的国内亚种新纪录

NEW RECORDS OF CHINESE BIRDS FROM XIZANG

1974年中国登山队科考察队,在珠穆朗玛峰附近聂拉木地区,采集了鸟类标本,发现下列鸟类,系国内亚种新纪录,简报如下。

1. 大拟啄木鸟 *Megalaima virens marshallorum* (Swinhoe)

3♂♂, 1♀。樟木,友谊桥(海拔2,000米); 1974. V. 4—30。体重3♂♂ 160—190, 1♀ 144。翅长3♂♂ 133—145, 1♀ 137¹⁾。

头顶辉蓝色,咽喉及上胸呈蓝色,后颈及上背间黄绿羽轴条纹甚显著。指名亚种(*M. v. virens*)头顶为铜绿色;滇西亚种(*M. v. clamator*)体型较大,翅长♂♀ 147—153 (Mayr);后颈和背间黄白羽轴条纹甚稀或无。滇南亚种(*M. v. magnifica*)头顶辉绿蓝色,后颈和背间黄白羽轴条纹甚稀少而不明显。

2. [黑枕]绿啄木鸟 *Picus canus gyldenstoepei* Baker

1♂, 1♀。樟木,立新乡(海拔2,800米); 1974. V. 8—12。体重1♂ 148, 1♀ 164。翅长1♂ 145, 1♀ 149。

头枕部具黑色斑块,上体暗绿,腰及尾上覆羽辉黄绿色,翅上覆羽及飞羽沾黄褐色甚显著,下体羽橄榄绿而明显沾黄色。与分布于尼泊尔的西部(*P. c. sanguiniceps*)比较,后者体羽纯暗绿,体型较大,翅长♂♂ 160.6 (157—165),而本亚种翅长为143.2 (140—149) (Greenway 1940),体型较小。青海亚种(*P. c. kogo*)羽色灰灰绿,体型较大,翅长8♂♂ 151.5 (149—155) (郑作新, 1973)。西南亚种(*P. c. sordidior*)下体淡灰橄榄绿色,易于识别。

3. 黄颈啄木鸟 *Dendrocopos darjellensis darjellensis* (Blyth)

1♀。樟木,立新乡(海拔2,800米); 1974. V. 15。体重76。翅长127。嘴长33.5。

颈侧黄褐色斑块甚明显。西南亚种(*D. d. desmursi*)嘴比较短(郑作新, 1962),嘴长2♀♀ 29.5, 30 (Vaurie, 1959)。嘴长3♀♀ 26.5、28、29;而指名亚种(*D. d. darjellensis*)嘴显著较长(Vaurie, 1959),嘴长13♀♀ 34.7 (33—37)。

4. 斑背燕尾 *Enicurus maculatus maculatus* Vigor

1(性别不明)。樟木, 1974. V. 6。体重42, 翅长100。

与云南亚种(*E. m. guttatus*)的区别,在于胸部具黑羽,指名亚种具清晰的白色端斑,背部白斑亦较大,呈新月形,而非圆形斑点。

5. 条纹噪鹛 *Garrulax striatus vibex* Ripley

4♂♂ 2♀♀。樟木,立新乡; 1974. IV. 18—V. 15; 体重4♂♂ 134.5 (130—140), 2♀♀ 140, 142。翅长4♂♂ 133.2 (137—140), 2♀♀ 133, 135。

头顶及头侧暗栗褐色,上体橄榄褐色,下体橄榄灰沾褐色,全身羽毛密布白色纵羽轴条纹甚著(Vaurie, 1959)。指名亚种(*G. s. striatus*)羽色较浅,体型较大,翅长155 (149—160)。而本亚种羽色较暗些,体型亦较小,翅长138 (131—150)。锡金亚种(*G. s. sikkimensis*)羽色最深,背部呈明显的红褐色。而藏南亚种(*G. s. cranbrookii*)头部具宽的黑色侧冠纹,易于识别。

蔡其侃, 曹俊和 (北京自然博物馆) 李德浩, 王祖祥 (青海生物研究所)

1) 衡度以克为单位,量度以毫米为单位,下同。