

研究简报

——西藏鸟类的国内新纪录

NEW RECORDS OF CHINESE BIRDS FROM XIZANG (TIBET)

我们在整理西藏鸟类标本中,发现下列种和亚种为国内新纪录,现作扼要报道。

雉科 Phasianidae

1. 高原山鹑 *Perdix hodgsoniae caraganae* R. et Meinertzhage, 西藏亚种 亚种新纪录

8♂♂, 5♀♀。吉隆(海拔3,000米), 1975 VIII 10—16; 昂仁(海拔4,500米), 1975 VIII 16; 扎达(海拔4,300米), 1976 VI 12—18; 噶尔(海拔4,350米), 1976 VII 27—30。体重340—457¹⁾(♂), 290—320(♀); 翅长146—154*(♂), 140—150(♀)。

上体羽色较指名亚种 *P. h. hodgsoniae* 为淡; 颈圈较窄, 栗黄色亦较淡。下胸黑色羽具白色羽缘, 当白色羽缘磨损后, 这些羽毛几成一片黑色。

2. 血雉 *Ithaginis cruentus affinis* Beebe, 亚东亚种 亚种新纪录

1♂。定日卡玛河谷(海拔3,800米)。1959 VI 16。体重60, 翅长190。

额及头顶前部无红色; 胸部红羽很少, 最外侧二对尾羽无红色, 但第二对尾羽的内翮边缘有少许红色渲染。指名亚种仅最外侧一对尾羽无红色, 胸部红色羽毛亦较多。

鸱鸃科 Strigidae

3. 斑头鸱鸃 *Glaucidium cuculoides austerum* Ripley, 藏南亚种 亚种新纪录

1♂, 1♀。墨脱背崩(海拔900—950)。1977 VIII 13、19。体重164(♂), 186(♀); 翅长159(♂), 153(♀)。

胸部呈灰和暗褐相间的横斑状; 上腹及两胁为浅棕白和棕褐相间的横斑状, 但不如胸部清晰; 下腹及肛周具宽阔的棕褐色纵纹, 并杂以横斑。

燕科 Hirundinidae

4. 黑喉毛脚燕 *Delichon nipalensis nipalensis* Horsfield et Moore, 指名亚种 亚种新纪录

2♂♂, 5♀♀。聂拉木县樟木乡(海拔2,000米)。1976 VI 21—29。体重12(♂), 11—12(♀); 翅长89(♂), 85—90(♀)。

这一种毛脚燕, 迄今所知, 仅有二个亚种。采自云南西部贡山的 *D. n. cuttingi* 亚种体形较大, 翅长93—95(4♂♂), 93(♀)(据彭燕章等, 1979); 喉部黑色部分也较扩大。

鹟科 Muscicapidae 画眉亚科 Timaliinae

5. 白冠噪鹛 *Garrulax l. leucolophus* (Hardwicke), 指名亚种 亚种新纪录

3♂♂。墨脱背崩(海拔980米)。1977 VII 8、31, VIII 7。体重112—119; 翅长123—124。

与滇西亚种 *G. l. parkasi* 对比, 后一亚种的颈圈较淡, 为棕红色; 下体余部的橄榄褐色也较淡, 羽冠几乎纯白。

本文于1979年9月收到。

1) 衡度以克、量度以毫米为单位。

6. 黑顶噪鹛 *Garrulax affinis bethelae* Rand et Fleming, 亚东亚种 亚种新纪录

7♂♂, 2♀♀。亚东(海拔2,500—2,800米)。1975 VI 1—VII 23。体重70—76(♂), 68(♀); 翅长98—105(♂), 98—101(♀)。

与聂拉木、吉隆等地的指名亚种相较, 胸羽的羽缘大都深灰, 因而使此部的棕褐色显得较暗浓些; 下体余部的棕褐色也较深。

7. 白眉雀鹛 *Alcippe vinipectus vinipectus* Hodgson, 指名亚种 亚种新纪录

5♂♂, 6♀♀。聂拉木(海拔2,200—3,300米)。1975 IV 2—VI 4。体重10—12(♂), 10—13(♀); 翅长56.3—57.8(♂), 54—57(♀)。

颊、喉及上胸近白。采自亚东的藏南亚种 *A. v. chumbiensis* 喉与上胸均具暗色纵纹。

8. 白眶雀鹛 *Alcippe nipalensis commoda* Ripley 墨脱亚种 新纪录

1♀。墨脱背崩(海拔900米)。1977 VIII 1。体重13; 翅长57。

与指名亚种对比, 头顶较暗, 上体较棕褐, 下体较黄, 尾较翹为短(Ali 等, 1972)。

这一种雀鹛的眼眶为白色, 与国内已往所采得的灰眶雀鹛 (*A. morrisonia*) 不同。

9. 黑头奇鹛 *Heterophasia capistrata nigriceps* (Hodgson), 珠峰亚种 亚种新纪录

5♂♂, 4♀♀, 1♀。聂拉木(海拔2,200—2,600米)。1966—1975 IV 16—VII 4。体重36—45(♂), 32—40(♀); 翅长89—98(♂), 89—95(♀)。

与错那县勒所采得的藏南亚种 *H. c. bayloni* 对比, 二者均具黑色头顶和羽冠, 但本亚种背部中央棕褐, 而藏南亚种的背部中央却为灰褐色。

郑作新 江智华 王子玉

(中国科学院动物研究所)

王祖祥 李德浩

(中国科学院西北高原生物研究所)