

DOI:10.12356/j.2096-8884.2025-0026

· 研究简报 ·

西藏鸟类分布新纪录——灰白喉林莺

刘善思¹, 曾 晨², 杨永炳³, 魏 聪^{3*}

1. 西藏自然科学博物馆, 拉萨 850000; 2. 中山大学生态学院, 深圳 518107; 3. 西藏自治区高原生物研究所, 拉萨 850000

摘要: 2024年9月19日, 在西藏亚东县下亚东乡庞达新村附近康布麻曲河岸开阔地带的灌木丛中拍摄到一只雀形目鸟类个体, 经鉴定其为灰白喉林莺 (*Curruca communis*), 为西藏鸟类分布新纪录。

关键词: 灰白喉林莺; 新纪录; 西藏

中图分类号: Q959 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-8884 (2025) 02-0095-02

A New Distribution Record of Common Whitethroat (*Curruca communis*) in Xizang

Liu Shansi¹, Zeng Chen², Yang Yongbing³, Wei Cong^{3*}

1. Xizang Museum of Natural Science, Lhasa 850000, China; 2. School of Ecology, Sun Yat-sen University, Shenzhen 518107, China;
3. Institute of Plateau Biology of Xizang Autonomous Region, Lhasa 850000, China

Abstract: On September 19, 2024, an individual Passeriformes bird was photographed in the open bush of Kangbumaqu River near Pangda New Village, Lower Yatung Township, Yatung County, Xizang. It was identified as Common Whitethroat (*Curruca communis*), a new record species of bird distribution in Xizang.

Key words: Common Whitethroat; new record; Xizang

2024年9月19日, 在西藏自治区日喀则市亚东县下亚东乡庞达新村附近的康布麻曲河岸 (27°19'22.2" N, 89°0'28.75" E, 海拔2268 m) 开阔地带的灌木丛中, 发现并拍摄到一只比柳莺略大的雀形目鸟类个体 (图1)。该个体头部及上体灰色, 翅上覆羽灰褐色, 羽缘浅棕色, 下体偏白, 喉羽白色且较蓬松, 具有白色的眼圈。根据现场观察及照片, 对比文献中 (约翰·马敬能, 2022; 刘阳等, 2021) 对相关物种的特征描述, 鉴定其为灰白喉林莺 (*Curruca communis*)。经查阅相关文献 (郑光美, 2023; 约翰·马敬能, 2022; 刘阳, 2021; 赵正阶, 2001; 郑作新等, 1983) 及中国观鸟记录中心 (<http://www.birdreport.cn/>) 数据库等, 均未有灰白喉林莺在西藏的分布纪录, 由此确定此次发现的灰白喉林莺为西藏鸟类分布新纪录。

灰白喉林莺是雀形目 (Passeriformes) 莺鹟科 (Sylviidae) 鸟类, 主要栖息于林缘、河边、湖岸、荒坡等开阔地带的灌木丛中, 常单独或成对活动, 多在灌丛枝叶间跳跃、觅食, 以昆虫为食, 也吃少

量浆果、种子等植物性食物。关于本种亚种的说法不一。郑光美 (2023) 认为中国仅有1个亚种 *C. c. icterops*, 分布于内蒙古西部、新疆和青海西北部。赵正阶 (2001) 认为本种 (书中的拉丁名为 *Sylvia communis*, 为 *Sylvia* 属) 共有3个亚种, 在中国分布有2个亚种, 即北疆亚种 *S. c. rubicola* 和南疆亚种 *S. c. icterops*。郑作新的《中国鸟类系统检索 第3版》也记录有2个亚种的检索特征 (郑作新, 2002)。刘阳等 (2021) 也认为中国有2个亚种, *S. c. rubicola* 为新疆北部地方性常见的繁殖鸟, 亦见于内蒙古西部; *S. c. icterops* 为新疆南部少见的繁殖鸟。Birds of the World 网站认为分布于新疆的亚种为 *C. c. rubicola* (<https://birdsoftheworld.org/bow/species/grewhi1/cur/introduction>), 其外形特征为整体颜色更浅、上方颜色更灰、腹部颜色更白, 在冬季进行完全换羽; 在迁徙方面, 所有种群都在撒哈拉以南的非洲度过非繁殖季, 其中2个东部种群 (*icterops* 和 *rubicola*) 在8—9月通过中东到达苏丹、厄立特里亚和埃塞俄

收稿日期: 2025-04-03; 接受日期: 2025-04-24

基金项目: 西藏自治区重点研发计划项目 (XZ202301ZY0019G); 日喀则市自然科学基金项目 (RKZ2024ZR-008)

第一作者 The first author. E-mail: 2513559807@qq.com; *通讯作者 Author for correspondence. E-mail: weicong1991@qq.com



图1 灰白喉林莺(刘善思 摄)

Fig. 1 Common Whitethroat (Photographed by Liu Shansi)

比亚, 11—12月继续向南迁徙, 11月中旬—12月下旬到达南非。据此, 推测本次发现的灰白喉林莺为亚种 *C. c. rubicola*, 在我国新疆一带繁殖, 迁徙途经西藏亚东, 经南亚后至非洲越冬。

参考文献

- 郑光美, 2023. 中国鸟类分类与分布名录 [M]. 4版. 北京: 科学出版社, 275.
- 约翰·马敬能, 2022. 中国鸟类野外手册 (马敬能新编版: 上下册) [M]. 北京: 商务印书馆, 322.
- 刘阳, 陈水华, 2021. 中国鸟类观察手册 [M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 470-471.
- 赵正阶, 2001. 中国鸟类志: 下卷 (非雀形目) [M]. 长春: 吉林科学技术出版社, 563-564.
- 郑作新, 李德浩, 王祖祥, 等, 1983. 西藏鸟类志 [M]. 北京: 科学出版社.
- 郑作新, 2002. 中国鸟类系统检索 [M]. 3版. 北京: 科学出版社, 245.