

- testosterone and cortisol metabolites in male giant pandas *Ailuropoda melanoleuca* in relation to breeding, housing, and season. *Acta Zoologica Sinica*, 52(2): 242–249.
- Migaud M, Chemineau P, Malpoux B. 2001. Biology of mammalian photoperiodism and the critical role of the pineal gland and melatonin. *Journal of Biological Rhythms*, 16(4): 336–347.
- Schaller G B, Hu J C, Pan W S, et al. 1985. *The Giant Pandas of Wolong*. Chicago: The University of Chicago Press, 211–223.
- Tamarkin L, Baird C J, Almeida O F. 1985. Melatonin: a coordinating signal for mammalian reproduction? *Science*, 227(4688): 714–720.
- White D J, Berardinelli J G, Aune K E. 2005. Seasonal differences in spermatogenesis, testicular mass and serum testosterone concentrations in the grizzly bear. *Ursus*, 16(2): 198–207.
- Yoshimura T, Yasuo S, Watanabe M, et al. 2003. Light-induced hormone conversion of T4 to T3 regulates photoperiodic response of gonads in birds. *Nature*, 426(6963): 178–181.
- 蒋辉, 古晓东, 黄雁楠, 等. 2012. 四川与秦岭野生大熊猫在形态和生态习性上的差异. *西华师范大学学报: 自然科学版*, 33(1): 12–18.
- 罗婵, 李键, 张志和, 等. 2011. 产仔大熊猫孕激素变化规律研究. *西南民族大学学报*, 37(5): 752–756.
- 张志和, 魏辅文. 2006. *大熊猫迁地保护理论与实践*. 北京: 科学出版社, 175.

西藏墨脱发现栗苇鸕

Ixobrychus cinnamomeus Discovered in Medog County, Tibet, China

2016年5月2日在墨脱县县城附近湿地(29°19'43.18" N, 95°20'03.40" E, 海拔1035 m), 观察记录到苇鸕属(*Ixobrychus*)鸟类1只。发现时, 该鸟位于草丛中的一条小溪边, 短暂停留, 然后迅速藏匿于草丛中。5月3日再次到该位置观察, 发现该鸟仍在该区域活动, 并由草丛飞至蕨类植物上做短暂停留后, 飞至草丛中藏匿。该鸟上体从头项至尾包括两翅飞羽和覆羽全为同一的栗红色, 胸侧缀有黑白两色斑点(图1)。经鉴定为栗苇鸕(*Ixobrychus cinnamomeus*)。Choudhury(2006)和Surya(2018)在藏南地区记录到栗苇鸕。此外, 在西藏其他地区再无栗苇鸕的确切观察记录(刘迺发等 2013, 郑光美等 2017)。此次记录为该鸟种在西藏藏南地区外的首次记录。其居留状况有待进一步研究。



图1 栗苇鸕(王渊摄)

Fig. 1 *Ixobrychus cinnamomeus*
(Photo by WANG Yuan)

刘锋 李炳章 徐磊 王渊* 陈越*

西藏自治区林业调查规划研究院 拉萨 850000

基金项目 西藏自治区第二次陆生野生动物资源调查项目;

* 通讯作者, E-mail: 465050675@qq.com, 675670755@qq.com;

第一作者介绍 刘锋, 男, 工程师; 研究方向: 野生动物与自然保护区; E-mail: crazymonkey@aliyun.com。

收稿日期: 2019-10-22, 修回日期: 2020-04-07 DOI: 10.13859/j.cjz.202201017