

西藏墨脱厚嘴苇莺的分布新记录

西藏自治区林芝市墨脱县位于喜马拉雅山南麓,受山体走向以及印度洋暖湿气流影响,气候垂直带完整,海拔由低到高包含热带雨林到寒带高山草甸等多种山地植被类型,生物多样性复杂丰富,属全球 36 个生物多样性热点地区之一的喜马拉雅山地(郑作新等,1983; Myers *et al.*, 2000; 王恺,2003)。近年来由于调查的不断深入,很多西藏自治区乃至中国的分布新记录在墨脱被发现(梁丹等,2014; 赵超等,2015; 林植,何芬奇,2016; 罗伟雄等,2016; 阙品甲等,2019; 刘锋等,2020)。2018 年 10 月在墨脱发现厚嘴苇莺 *Arundinax aedon*,经查阅《中国鸟类分类与分布名录(第三版)》(郑光美,2017)、《中国青藏高原鸟类》(卢欣,2018)等相关资料,确认其为西藏自治区新记录。

2018 年 10 月 28 日,在墨脱县达木乡卡布村附近(95°27'18.28"E, 29°28'26.17"N, 海拔 1 435 m)采用网捕

法调查时捕获到 1 只厚嘴苇莺(图 1),体型较大(体长约 20 cm),上体橄榄褐多沾棕色,下体淡皮黄色,喉白色,无眉纹,嘴较粗短,上嘴色深,下嘴色浅。

厚嘴苇莺隶属于雀形目 Passeriformes 苇莺科 Acrocephalidae,共包括 2 个亚种(杨岚等,2004; Billerman *et al.*, 2020; Gill *et al.*, 2021)。指名亚种 *A. a. aedon* 在国外分布于西伯利亚中南部、蒙古西北部以及尼泊尔、印度东部至缅甸、泰国等地,国内分布于内蒙古中部和北部、新疆北部、云南西部和南部等地,*A. a. rufescens* 亚种在国外分布于东西伯利亚、蒙古东北至日本海等地,国内分布于华南等地区(郑光美,2017; Billerman *et al.*, 2020; Gill *et al.*, 2021)。2 个亚种形态相似,主要区别为翅长(Kennerley & Pearson, 2010),但本次采样后及时放归,未做相关测量,因此无法确定其亚种型。



图 1 厚嘴苇莺 *Arundinax aedon* (岩道 摄)

单鹏飞, 岩道, 高建云, 吴飞, 袁兴海, 杨晓君*

(中国科学院昆明动物研究所, 遗传资源与进化国家重点实验室,

云南省高黎贡山生物多样性与生态安全重点实验室, 昆明 650223)

基金项目: 第二次青藏高原综合科学考察研究项目(2019QZKK0501); 中国科学院战略性先导科技专项(XDA20050202);

国家自然科学基金面上项目(32070435); 第二次全国重点保护野生动植物资源调查项目(2018)

作者简介: 单鹏飞(1990—), 博士, 助理研究员, 主要从事鸟类生态学研究, E-mail: shanpengfeirc@163. com

* 通信作者, E-mail: yangxj@mail. kiz. ac. cn