

- 血液生化指标差异研究. 云南农业大学学报, 14(4): 345–347.
- 张云美, 吴登虎, 杨晓碧, 等. 2003. ILT 对孔雀部分血液化学指标的影响观察. 医学动物防制, 19(12): 705–707.
- 郑光美. 2015. 中国雉类. 北京: 高等教育出版社, 337–351.
- 周天林, 韩芬茹. 2006. 3 种雉科鸟类血液生理指标的比较研究. 经济动物学报, 10(2): 85–87.

西藏达孜县发现灰椋鸟

White-cheeked Starling (*Sturnus cineraceus*) Found in Dagze, Tibet

2016 年 12 月 29 日, 在拉萨河沿岸的达孜县唐嘎乡湿地 (29°50'12.68"N, 91°33' 31.74"E, 海拔 3 760 m) 发现 11 只体型中等 (体长约 22 ~ 25 cm) 的灰色椋鸟。其头黑, 头侧具有白色纵纹, 喙黄色, 尖端黑色, 跗跖和趾为暗橘黄色, 腹部比背部灰色略浅, 臀部偏白 (图 1)。经鉴定, 该鸟为雀形目 (Passeriforms) 椋鸟科 (Sturnidae) 的灰椋鸟 (*Sturnus cineraceus*)。发现时这些鸟和紫翅椋鸟 (*S. vulgaris*) 混群在拉萨河畔农田附近的草甸草原活动, 周围还有斑头雁 (*Anser indicus*)、赤麻鸭 (*Tadorna ferruginea*)、凤头麦鸡 (*Vanellus vanellus*) 等鸟类。



图 1 灰椋鸟

Fig. 1 *Sturnus cineraceus*

经查阅相关文献 (中国科学院青藏高原综合科学考察队 1983, 刘迺发等 2013, 郑光美 2017), 其在国外主要分布区包括西伯利亚、日本、菲律宾、越南北部和缅甸北部, 国内繁殖于华北、东北等地, 冬季迁徙至中国南方, 在青藏高原北部的甘肃天祝、青海西宁等地作为夏候鸟出现, 但无该物种在西藏分布的确切记录。中国鸟类记录中心有 1 笔 sheen 于 2010 年 2 月 14 日在西藏拉萨西郊罗布林卡记录到灰椋鸟 6 只的观鸟记录。本次发现在其基础上进一步证实了灰椋鸟在西藏的分布, 推测拉萨及周边温暖的河谷地带或为灰椋鸟的越冬分布区。

致谢 感谢北京师范大学阙品甲博士在物种分布资料搜集方面的帮助。

杨乐^① 周生灵^① 李继荣^② 魏聪^① 土艳丽^①

① 西藏自治区高原生物研究所 拉萨 850000; ② 西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所 拉萨 850000

基金项目 西藏自治区重大专项课题 (No. 2015XZ01G7205), 生态环境部生物多样性保护专项;

第一作者介绍 杨乐, 男, 副研究员; 研究方向: 青藏高原动物生态学; E-mail: yangletibet@126.com.

收稿日期: 2017-10-24, 修回日期: 2018-01-20 DOI: 10.13859/j.cjz.201803020