

中国鸟类新纪录——东歌林莺

在开展西藏第二次陆生野生动物资源调查工作过程中,于 2015 年 6 月 13 日在西藏自治区阿里地区普兰县普兰镇科加村(30.2108°N,81.2092°E,3750 m)观察并拍摄到 1 只小型雀形目鸟类,经查阅文献、咨询及鉴定,为东歌林莺 *Sylvia crassirostris* (图 1)。



图 1 东歌林莺 *Sylvia crassirostris* (郭克疾 摄)

形态特征: 额、头顶、枕部及耳羽黑色,颈、背、腰及尾上覆羽灰褐色,尾羽除最外侧 1 对具白色的外翮及狭窄的白色端斑外,概为褐色并具灰白色狭缘;外侧初级飞羽灰褐色,内侧初级飞羽偏棕色,覆羽灰褐色,均具灰白色的狭缘,另有 2 枚黑褐色小覆羽较为显著;颏、喉部近白,胸、腹部灰色,尾下覆羽灰白色。虹膜深色;嘴黑褐色,下嘴基部较淡;脚褐色。从整体来看,该鸟羽色略为黯淡,应为第一年亚成鸟。与近似种西歌林莺 *S. hortensis* 区别在于:东歌林莺头部较黑,嘴峰较长,上体的灰色更纯,而下体较白。

生境: 科加村位于喜马拉雅山北麓的孔雀河谷,村子周围有成片的柳树 *Salix* sp. 及沙棘 *Hippophae* sp.,当地村民还栽种有油菜 *Brassica campestris*、青稞 *Hordeum vulgare* 等作物(图 2)。

生态: 发现此鸟时,其正在柳树林的树枝间活动、觅食。

分类与分布: 过去认为东歌林莺与西歌林莺为同一物种的不同亚种,近年来研究发现二者无论是线粒体 DNA 序列,还是羽色、换羽方式、嘴的形态及叫声均存在明显差异,故而将其分为 2 个独立的物种(Shirihai *et al.*,2001; Dickinson & Christidis,2014; Clements *et al.*,2015)。东歌林莺目前已知有 3 个亚种,即: *S. c. crassirostris*, *S. c. balchanica* 和 *S. c. jerdoni*,其中 *crassirostris* 亚种繁殖于欧洲东南部的斯洛文尼亚至阿塞拜疆一带,越冬于苏丹至也门西部; *balchanica* 亚种繁殖于伊拉克西北部至伊朗及土库曼斯坦一带,越冬于伊朗南部、巴基斯坦南部及阿拉伯半岛东南部等地; *jerdoni* 亚种繁殖于哈萨克斯坦南部至巴基斯坦西部一带,越冬于印度等地(Gill & Donsker,2015)。由于发现地点最接近于 *jerdoni* 亚种的分布区,故暂定为 *jerdoni* 亚种。2015 年 6 月中、下旬,在阿里地区普兰县和札达县相似的生境中进行的后续调查中再未观察到该鸟种,故推测其在西藏西部可能为偶见过境鸟。



图 2 东歌林莺 *Sylvia crassirostris* 生境 (郭克疾 摄)

经查阅《中国鸟类分类与分布名录(第 2 版)》(郑光美,2011)及《青藏高原鸟类分类与分布》(刘迺发等,2013)等相关资料,东歌林莺为中国鸟类新纪录。

米小其¹, 郭克疾^{2*}, 朱雪林³, 邓学建⁴

(1. 铜仁学院生物与农林工程学院,贵州铜仁 554300;

2. 国家林业局中南林业调查规划设计院,长沙 410014;

3. 西藏自治区林业调查规划研究院,拉萨 850000;

4. 湖南师范大学生命科学学院,长沙 410081)

基金项目: 贵州省教育厅自然科学

研究青年项目(黔教合 KY 字 [2012] 083 号)

* 通信作者, E-mail: guokeji@126.com

致谢: 西藏自治区林业调查规划研究院刘务林和李炳章为本次调查提供帮助,湖南师范大学丛义艳博士协助鉴定植物种类,特此致谢!