

西藏札达发现印度寿带

在开展西藏第二次陆生野生动物资源调查工作过程中,于 2015 年 6 月 18、19 日在西藏自治区札达县底雅乡什布奇村(78°44'45.6"E,31°48'33.8"N,3110 m)、6 月 19 日在底雅乡底雅村(78°52'5.1"E,31°46'55.5"N,2977 m)观察并拍摄到雌性印度寿带各 1 只。经鉴定,为印度寿带印巴亚种 *Terpsiphone paradisi leucogaster*(图 1)。



图 1 印度寿带印巴亚种

Terpsiphone paradisi leucogaster(米小其 摄)

形态特征: 该鸟额、头顶、枕部及耳羽灰褐色,冠羽闪蓝黑色金属光泽,眼圈钴蓝色;肩、背、腰、尾上覆羽及尾羽呈一致的赤褐色,中央尾羽稍长于外侧尾羽;飞羽外翮赤褐色,内翮灰色;颊、喉部灰白色;胸部污白色,腹部及尾下覆羽白色。虹膜黑褐色;嘴钴蓝色,端部黑色;脚铅色。该亚种与指名亚种 *T. p. paradisi* 的区别在于:该亚种整体体色较淡,喉部灰白色,而后者喉部灰褐色。

生境与生态: 什布奇村及底雅村均位于喜马拉雅山北麓的象泉河畔,村里有成片的柳树 *Salix* sp.、杏树 *Armeniaca* sp. 等阔叶林,当地村民还栽种有青稞 *Hordeum vulgare* 等作物(图 2)。印度寿带单独在阔叶林的中下层活动,于飞行中捕食蝴蝶、蜻蜓等昆虫。

分类及分布: 最近的研究表明,寿带应分为印度寿带 *T. paradisi*, 东方寿带 *T. affinis* 和阿穆尔寿带 *T. incei* 3 个独立的种(Fabre et al., 2012; Dickinson & Christidis, 2014; Andersen et al., 2015; Clements et al., 2015; Gill & Donsker, 2015)。其中,印度寿带分布于中亚及南亚等地,可分为 4 个亚种,其中, *leucogaster* 亚种繁殖于天山西部、阿富汗、巴基斯

坦、印度中北部及尼泊尔西部一带,非繁殖鸟还见于巴基斯坦东部及印度半岛等地, *saturation* 亚种繁殖于尼泊尔东部经印度东北部、缅甸北部到我国云南西部等地,非繁殖鸟见于马来半岛一带, *paradisi* 亚种繁殖于印度中部及南部、孟加拉国、缅甸的西南部,非繁殖鸟见于斯里兰卡, *ceylonensis* 亚种分布于斯里兰卡(Gill & Donsker, 2015)。

印度寿带在西藏藏南地区曾有过记录(Aiyadurai, 2012; Mize et al., 2014),但其在西藏其他地区并无分布记载(赵正阶, 2001; 郑作新等, 2010; 郑光美, 2011; 刘迺发等, 2013)。这一记录虽未明确为哪一亚种,但从分布区来看,与 *saturation* 亚种的已知分布区一致。 *leucogaster* 亚种在札达应为夏候鸟。本次在西藏札达发现印度寿带,有利于了解该物种在我国的分布。



图 2 生境(郭克疾 摄)

米小其¹, 郭克疾^{2*}, 熊嘉武², 丹丁³, 吴建普³, 邓学建⁴

(1. 铜仁学院生物与农林工程学院, 贵州铜仁 554300;

2. 国家林业局中南林业调查规划设计院, 长沙 410014;

3. 西藏自治区林业调查规划研究院, 拉萨 850000;

4. 湖南师范大学生命科学学院, 长沙 410081)

基金项目: 贵州省教育厅自然科学研究青年项目

(黔教合 KY 字 [2012] 083 号)

* 通信作者, E-mail: guokeji@126.com

致谢: 西藏自治区林业调查规划研究院刘务林和李炳章为本次调查提供帮助, 中国科学院新疆生态与地理研究所马鸣研究员提供咨询意见, 湖南师范大学丛丛艳博士协助鉴定植物种类, 特此致谢!