

ml
http://yn.yunnan.cn/html/2012-05/30/content_2223864.htm
http://www.lincangnews.cn/news.php?pid=40342
http://finance.sina.com.cn/nongye/nygd/20120417/140211846146.shtml
http://yn.yunnan.cn/html/2012-05/10/content_2191021.htm
http://www.ynta.gov.cn/Item/13897.aspx
http://yndaily.yunnan.cn/html/2013-09/07/content_750931.htm?div=-1
http://news.bsyrb.com/content/2013-06/20/content_19821.htm

http://news.yninfo.com/yn/zhxw/201306/t20130624_2081639.htm
http://www.forestry.gov.cn/zrbh/2421/content-602301.html
http://tieba.baidu.com/p/2383890725
http://www.hh.gov.cn/info/1032/33763.htm
http://www.luoping.gov.cn/dwgk/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=328&id=2269
http://roll.sohu.com/20130507/n375059443.shtml
http://news.gzdsw.com/gz/2013/0331/21750.html
http://epaper.gywb.cn/gywb/html/2013-10/14/content_361304.htm

西藏墨脱发现林八哥

2013 年 11 月 4 日,西藏自治区林业调查规划研究院和国家林业局昆明勘察设计院在西藏自治区岗日噶布山脉南翼山脉进行全国第二次陆生野生动物资源调查的过程中,在墨脱县格挡乡兴凯村(29°28′20.45″N,95°45′19.19″E,2160 m)拍摄到 2 只林八哥 *Acridotheres grandis*,经查阅《西藏鸟类志》(郑作新等,1983)、《中国鸟类分类与分布名录(第 2 版)》(郑光美,2011)和《中国鸟类志:雀形目》(赵正阶,2001)等相关学术著作及网络数据库,确认该种为西藏鸟类新纪录。

林八哥隶属于雀形目 Passeriformes 椋鸟科 Sturnidae,通体羽毛主要呈黑色,与八哥 *Acridotheres cristatellus* 相似,但额基部的矛状冠羽较长,且尾下覆羽大部白色;与分布于南亚、东南亚的另一近似种丛林八哥 *Acridotheres fuscus* 相比,林八哥体羽黑色较重,且虹膜淡栗色,而丛林八哥虹膜黄色或者蓝白色,上体灰棕,下体暗灰,腹部浅。林八哥主要栖息于热带和南亚热带地区的开阔河谷村落附近的阔叶林、竹林以及林缘地带,常见成对或结群活动于村寨边的高大乔木上或田野。此前,在国内仅记录分布于云南西部和南部及广西西部(郑光美,2011),在台湾有小规模逃逸种群(刘小如等 2010),国外分布于印度东北部、缅甸和中南半岛(BirdLife International,2012)。



林八哥 *Acridotheres grandis* (孙国政 摄)

罗伟雄¹, 孙国政¹, 刘务林², 李炳章^{2*}

(1. 国家林业局昆明勘察设计院, 昆明 650216;

2. 西藏自治区林业调查规划研究院, 拉萨 850000)

基金项目: 西藏自治区第二次陆生野生动物资源调查项目

作者简介: 罗伟雄, 男, 工程师, 动物学硕士, 主要从事野生动物研究与保护工作, E-mail: 0578252@163.com

* 通信作者, 男, 高级工程师, 主要从事野生动物研究与保护工作, E-mail: 465050675@qq.com