

- 邓中日, 黄勃, 方再光. 2007c. 可口革囊星虫体壁形态和组织学结构. 水产科学, 26(6): 335-339.
- 邓中日, 黄勃, 方再光, 等. 2007b. 太平洋革囊星虫消化道解剖学观察. 海洋水产研究, 28(1): 65-70.
- 邓中日, 黄勃, 库文珍. 2009b. 裸体方格星虫盲肠的形态和组织结构. 湖南城市学院学报: 自然科学版, 18(2): 64-66.
- 雷世勇, 卢明明, 丁理法, 等. 2013. 可口革囊星虫消化道的形态结构特征. 生物学杂志, 30(2): 33-39.
- 龙玲利, 卢明明, 竺俊全. 2014. 可口革囊星虫肾管纤毛的分布及结构特征. 动物学杂志, 49(2): 253-260.
- 童潼, 邹杰, 蔡德建, 等. 2011. 方格星虫消化道发育与摄食研究. 广西科学院学报, 27(3): 218-220.
- 吴鹏飞, 王嫣, 顾志峰, 等. 2010. 光裸方格星虫消化道的形态和组织学观察. 渔业科学进展, 31(1): 74-79.
- 周红, 李凤鲁, 王玮. 2007. 中国动物志: 无脊椎动物 (第四十六卷). 北京: 科学出版社, 30-31.

西藏墨脱发现棕腹隼雕

Rufous-bellied Eagle (*Lophotriorchis kienerii*) Found in Motuo, Tibet, China

2019年4月15日在西藏林芝市墨脱县墨崩公路段(95°13'23" E, 29°16'02" N, 海拔800 m)、4月18日在波墨公路80k附近(95°29'28" E, 29°39'33" N, 海拔2 097 m)分别发现1只棕腹隼雕(*Lophotriorchis kienerii*)亚成体, 并拍摄到其中1只的照片(图1)。该鸟具有白色的眉纹, 深色的过眼纹向后延伸至后颈, 脸颊、颈侧和喉部白色, 翅形宽大, 初级飞羽基部腹面有较明显的深色条带, 尾黑褐色具黑色横斑。

棕腹隼雕为国家Ⅱ级重点保护野生动物, 稀有物种, 国外分布于孟加拉国、不丹、文莱、柬埔寨、印度、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、尼泊尔、菲律宾、斯里兰卡、泰国、越南和新加坡等地, 国内见于台湾、云南。棕腹隼雕在临近西藏的印度分布于其西南部和北部(Clark et al. 2019)。



图1 棕腹隼雕(韩善杰摄)

Fig. 1 *Lophotriorchis kienerii*
(Photo by HANG Shan-Jie)

范丽卿^{①②} 杨乐^③ 韩善杰^④ 于晶晶^⑤

① 西藏农牧学院高原生态研究所, 西藏高原森林生态教育部省部共建重点实验室 林芝 860000;

② 西藏林芝高山森林生态系统国家野外科学观测研究站 林芝 860000;

③ 西藏高原生物研究所 拉萨 850000; ④ 西藏农牧学院资源与环境学院 林芝 860000; ⑤ 自由职业

基金项目 西藏自治区自然科学基金项目(No. XZ2019ZRG-68), 生态环境部生物多样性保护专项, 西藏农牧学院协同创新中心-高原生态平台项目;

第一作者介绍 范丽卿, 女, 副教授; 研究方向: 动物生态学; E-mail: flqpig@163.com。

收稿日期: 2019-04-26, 修回日期: 2019-07-15 DOI: 10.13859/j.cjz.201906025