

中国鸟类种新记录——黑颈穗鹛
A New Record of Bird Species in China:
Black-chinned Babbler (*Stachyris pyrrhops*)

董江天¹, 杨晓君^{2,*}
DONG Jiang-Tian¹, YANG Xiao-Jun^{2,*}

(1. 深圳市观鸟协会, 广东 深圳 518040; 2. 中国科学院昆明动物研究所 遗传与进化国家重点实验室, 云南 昆明 650223)
(1. Shenzhen Bird Watching Society, Shenzhen 518040, China; 2. State Key Laboratory of Genetic Resources and Evolution,
Kunming Institute of Zoology, the Chinese Academy of Sciences, Kunming Yunnan 650223, China)

关键词: 黑颈穗鹛; 新记录; 鸟类; 中国

Key words: *Stachyris pyrrhops*; New record; Avian; China

中图分类号: Q959.7 文献标志码: A 文章编号: 0254-5853-(2010)03-0292-02

2010年2月12—13日,在西藏日喀则樟木镇海拔2070 m及1900 m处的公路旁分别观察并拍摄到一种鸟类。根据观察资料及所拍照片,鉴定为黑颈穗鹛(*Stachyris pyrrhops*) (图1)。经查阅文献(Zheng, 2002; Zheng, 2005)属鹛科(Turdinae)画鹛亚科(Timaliinae)穗鹛属(*Stachyris*)的中国鸟类新记录,特此报道。

1 形态特征

体长约10 cm; 眼先及颈和上喉呈黑色; 前额、头顶至后颈暗黄褐色; 头颈两侧、颊纹和腹部淡黄褐色, 上胸部沾暗黄褐色; 上体羽表面橄榄灰绿黄色; 尾较翅长, 飞羽及尾羽表面黄褐色; 嘴形较直, 除上嘴基部灰蓝色外, 其他部分为角质色; 脚浅肉



图1 黑颈穗鹛 *Stachyris pyrrhops*
Fig. 1 *Stachyris pyrrhops*

(下转第332页)

收稿日期: 2010-03-01; 接受日期: 2010-03-08

*通讯作者 (Corresponding author), E-mail: yangxj@mail.kiz.ac.cn

第一作者简介: 董江天(1970), 女, 工商管理硕士, 主要从事鸟类保护、调查及民间观鸟活动推广工作。E-mail: jt_dong_maicha@yahoo.com.cn

- 旭东, 韦力, 佘文惠, 杨凤堂. 2007. 中国 4 种蝙蝠的 G-带和 C-带. 动物学杂志, 42(5): 33-40.]
- Simmons NB. 2005. Order Chiroptera [M]//Wilson DE, Reeder DM. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 312-525.
- Tan M, Zhu GJ, Hong TY, Ye JP, Zhang LB. 2009. New records of a bat species from China, *Hipposideros cineraceus* (Blyth, 1853) [J]. Zool Res, 30(2): 204-208. [谭敏, 朱光剑, 洪体玉, 叶建平, 张礼标. 2009. 中国翼手类新记录——小蹄蝠. 动物学研究, 30(2): 204-208.]
- Wang YX. 2003. A Complete Checklist of Mammal Species and Subspecies in China: A Taxonomic and Geographic Reference [M]. Beijing: China Forestry Publishing House. [王应祥. 2003. 中国哺乳动物种和亚种分类名录与分布大全. 北京: 中国林业出版社.]
- Wang S, Xie Y. 2004. China Species Red List: Vol. 1 Red List [M]. Beijing: Higher Education Press [汪松, 解炎. 2004. 中国物种红色名录: 第一卷, 红色名录. 北京: 高等教育出版社.]
- Zhang LB, Zhang JS, Liang B, Zhang SY. 2004. New record of a bat species from China, *Myotis hasseltii* (Temminck, 1840) [J]. Zool Res, 25(6): 556-559. [张礼标, 张劲硕, 梁冰, 张树义. 2004. 中国翼手类新记录——小巨足蝠. 动物学研究, 25(6): 556-559.]

~~~~~  
(上接第 292 页)

红色。

## 2 讨论

据文献记载:“黑颈穗鹛体长约 10 cm, 属小型鹛类, 额及眼先黑色, 羽冠橄榄黄褐色, 具深色纵纹; 耳羽淡黄褐色; 上体橄榄褐色, 下体桔黄褐色, 但缺少红褐色”(Grimmett et al, 1999b)。“虹膜红色, 脚浅肉褐色, 两性相似, 幼鸟体色较暗淡, 黑色部分被灰色代替”(Hoyo et al, 2007)。与观察及照片上的特征基本相符。

黑颈穗鹛 (*Stachyris pyrrhops*) 在 Zheng (1986, 2002) 的《世界鸟类名称》及 Zheng (2002) 的《世界鸟类分类与分布名录》中, 所列中文名为“红嘴穗鹛”, 英文名为“Red-billed Babbler”; 而在 Ali & Ripley (1971)、Dickinson (2003)、Grimmett et al (1999a, b)、Hoyo et al (2007)、Inskipp et al (1996)、Sibley & Monroe (1990) 等文献中, 均将其英文名记录为 Black-chinned Babbler (黑颈穗鹛), 其中多数文献将 Red-billed Babbler 作为该种的英文曾用名。

结合其形态特征, 我们认为应将该种的中文名

定为“黑颈穗鹛”更为确切。

据 Hoyo et al (2007) 记述: 黑颈穗鹛栖息于林缘或开阔的次生林下层, 成对或 8—9 只结群活动, 常与其他鸟类一起混群, 在林中接近地面的植物上或地面上活动, 以昆虫为食, 有时也取食浆果等。繁殖期 4—8 月, 在灌丛的 0.6—1.5 m 处营巢, 通常产卵 3—4 枚。在我们的两次目击过程中, 黑颈穗鹛均以单只形式出现在由白尾鹟鸟 (*Sitta himalayensis*)、绿背山雀 (*Parus monticolus*)、金眶鸫 (*Seicercus burkii*)、灰头鸫 (*Seicercus xanthoschistos*)、红翅鸫 (*Pteruthius flaviscapis*)、黑顶奇鹛 (*Heterophasia capistrata*)、剑嘴鹛 (*Xiphirhynchus superciliaris*)、棕颈钩嘴鹛 (*Pomatorhinus ruficollis*)、白眉雀鹛 (*Alcippe vinipectus*)、栗头雀鹛 (*Alcippe castaneiceps*) 等种类组成的混群中, 活动于阔叶林缘的灌丛下层。

黑颈穗鹛为单型种, 分布于巴基斯坦、印度和尼泊尔。在中国目前仅记录于西藏自治区日喀则地区的聂拉木县樟木镇。

## 参考文献:

- Ali S, Ripley SD. 1971. Handbook of the Birds of India and Pakistan, Vol.6 [M]. London: Oxford University Press, 171.
- Dickinson EC. 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, third ed [M]. London: Princeton University Press, 606.
- Grimmett RC, Inskipp T, Inskipp. 1999a. A Guide to the Birds of India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, and the Maldives [M]. Princeton and New Jersey: Princeton University Press, 761.
- Grimmett RC, Inskipp T, Inskipp. 1999b. Birds of India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, and the Maldives [M]. Princeton and New Jersey: Princeton University Press, 310.
- Hoyo JD, Elliott A, Christie DA. 2007. Handbook of the Birds of the World, vol. 12 [M]. Lynx Edicions, Birdlife International, 179.
- Inskipp T, Lindsey N, Duckworth W. 1996. An annotated checklist of the birds of the Oriental region [M]. East Sussex: Chancellors Printers Ltd, 185.
- Sibley CG, Monroe BL Jr. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World [M]. New Haven and London: Yale University Press, 635.
- Zheng GM. 2002. A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World [M]. Beijing: Science Press, 178. [郑光美. 2002. 世界鸟类分类与分布名录. 北京: 科学出版社, 178.]
- Zheng GM. 2005. A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China [M]. Beijing: Science Press, 1-426. [郑光美. 2005. 中国鸟类分类与分布名录. 北京: 科学出版社, 1-426.]
- Zheng ZX. 1986. Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) [M]. Beijing: Science Press, 221. [郑作新. 1986. 世界鸟类名称. 北京: 科学出版社, 221.]
- Zheng ZX. 2002. Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) [M]. 2nd ed. Beijing: Science Press, 214. [郑作新. 2002. 世界鸟类名称 (第二版). 北京: 科学出版社, 214.]
- Zheng ZX. 2000. A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds [M]. Beijing: Science Press, 1-322. [郑作新. 2000. 中国鸟类种和亚种分类名录大全. 北京: 科学出版社, 1-322.]