

- Vargas M J, de Sostoa A. 1996. Life history of *Gambusia holbrooki* (Pisces, Poeciliidae) in the Ebro delta (NE Iberian peninsula). *Hydrobiologia*, 341(3): 215–224.
- 陈国柱, 林小涛, 许忠能, 等. 2008. 饥饿对食蚊鱼仔鱼摄食、生长和形态的影响. *水生生物学报*, 32(3): 314–321.
- 刘灼见, 高书堂, 邓青. 1996. 食蚊鱼的性腺发育及性周期研究. *武汉大学学报: 自然科学版*, 42(4): 487–493.
- 卢哲, 林小涛, 陈菁晶, 等. 2013. 广州地区人工湖食蚊鱼的种群特征. *生态科学*, 32(6): 784–790.
- 潘炯华, 苏炳之, 郑文彪. 1980. 食蚊鱼 (*Gambusia affinis*) 的生物学特性及其灭蚊利用的展望. *华南师范大学学报: 自然科学版*, (1): 118–138.

西藏吉隆发现靴隼雕

曹宏芬^{①②} 吴建普^③ 丁志锋^{①②*} 胡慧建^{①②*}

① 广东省昆虫研究所 广州 510260; ② 广东省野生动物保护与利用公共实验室 广州 510260;

③ 西藏自治区林业调查规划研究院 拉萨 850000

Booted Eagle (*Hieraaetus pennatus*) Found in Jilong County, Tibet

在开展全国第二次陆生野生动物资源调查——喜马拉雅南翼沟谷地理单元 (No.176) 调查期间, 于 2012 年 6 月 1 日 16:56 时, 在西藏自治区吉隆县吉隆镇江村后山 (28°18'30.819 6"N, 85°20'23.841 6"E, 海拔 2 511 m) 发现 2 只猛禽正在枯树枝上交尾, 用佳能单反相机 (Canon EOS 550D, EF 400 mm f/5.6L USM) 拍摄到照片作为证据 (图 1); 同年 8 月 4 日在新江村检查站周边 (28°22'17.288 4"N, 85°21'52.617"E, 海拔 2 522 m) 和 2013 年的 8 月 2 日在色拉村 (28°22'25.186 8"N, 85°21'3.736 8"E, 海拔 2 773 m) 各发现 1 只飞行的猛禽个体。3 次发现地点的植被以暖温带针阔混交林为主, 根据现场观察和照片辨认, 鉴定为靴隼雕 (*Hieraaetus pennatus*) 的深色型 (约翰·马敬能等 2000, Orta et al. 2015)。

(下转第 72 页)

基金项目 国家自然科学基金项目 (No. 31400361), 国家林业局和西藏林业厅全国第二次陆生野生动物资源调查项目;

* 通讯作者, E-mail: dingzhf@163.com, 13922339577@139.com;

第一作者介绍 曹宏芬, 女, 助理研究员; 研究方向: 鸟类生态学; E-mail: 1019284864@qq.com。

收稿日期: 2015-09-14, 修回日期: 2015-12-30 DOI: 10.13859/j.cjz.201601018

- 叶玉珍, 周建峰, 王忠卫, 等. 2004. 三个鲫品系 DNA 含量的比较研究. 水生生物学报, 28(1): 13–16.
- 于晓东, 罗天宏, 周红章. 2005. 长江流域鱼类物种多样性大尺度格局研究. 生物多样性, 13(6): 473–495.
- 余先觉, 周瞰, 李渝成, 等. 1989. 中国淡水鱼类染色体. 北京: 科学出版社, 2–3.
- 乐佩琦. 2000. 中国动物志: 硬骨鱼纲 下卷 鲤形目. 北京: 科学出版社, 226–228.
- 张锦霞, 刘肖芳, 王祖熊, 等. 1984. 湘华鲮(♂) × 鲮鱼(♀)杂交一代与其双亲染色体组型的比较研究. 水生生物学报, 8(3): 313–321.
- 周瞰. 1984. 鱼类染色体研究. 动物学研究, 5(增刊 1): 38–51.
- 朱成科, 黄辉, 向泉, 等. 2013. 泉水鱼肌肉营养成分分析及营养学评价. 食品科学, 34(11): 246–249.

~~~~~

(上接第 65 页)



图 1 靴隼雕的交配行为 (摄影: 李晶晶)

Fig. 1 Copulation of *Hieraaetus pennatus* when it was found (photo by LI Jing-Jing)

形态特征: 无冠羽; 胸棕色, 上体褐色并具黑色和皮黄色杂斑, 飞行时肩羽明显呈白色“车灯”状; 初级飞羽黑色, 展翅可见不明显的深色横斑; 下体棕黄色, 腿上覆羽淡黄色; 尾羽近黑色, 先端色较浅。

靴隼雕隶属于隼形目 (Falconiformes) 鹰科 (Accipitridae), 为我国国家 II 级保护野生动物, 其繁殖于非洲、欧亚大陆的西南部、印度西北部及中国北部; 冬季南迁至非洲、印度; 迷鸟至东南亚。靴隼雕在国内罕见, 曾记录于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河南、甘肃等地 (郑光美 2011, 李飏等 2012, 王小炯等 2014)。

有关该物种在西藏的分布情况, 仍存争议。《中国红色名录》(汪松等 2004)、《西藏鸟类志》(郑作新等 1983)、《青藏高原鸟类分类与分布名录》(刘迺发等 2013) 等文献资料, 于西藏均无分布记录; *Handbook of the Birds of the World* 描述了靴隼雕边缘分布于西藏 (与尼泊尔交界处), 为冬候鸟; 而《中国鸟类分类与分布名录》第二版 (郑光美 2011) 虽提到西藏有分布, 但并未指出具体分布位置和相应出处, 故西藏林业厅一直未将此物种列入保护名录中。本记录证实了靴隼雕在西藏西南部的分布, 其在吉隆沟是否为留鸟尚待进一步关注。