

西藏鸟类分布新记录——花脸鸭

2023 年 12 月 26 日,在西藏自治区拉萨市林周县边交林乡当杰村(91°25′15.80″E,29°49′37.01″N,海拔 3 730 m)观察记录到 1 只鸭科 Anatidae 鸟类(图 1)。该鸟脸部纹理分明,嘴灰黑色,头顶及额部呈褐色,头顶部与脸部上下有明显的白色细长分割线,眼周黑色且眼部向下至喉部有明显的黑色纹带,黑色纹带两边脸颊呈淡黄色,耳部至颈部绿色;胸部淡棕色且两侧有 1 条竖直的白色条纹,腹白色,上背蓝灰色;次级飞羽白色,尾下覆羽黑色。查阅《中国鸟类观察手册》(刘阳,陈水华,2021)和《中国鸟类野外手册》(约翰·马敬能等,2022)后,确定为花脸鸭 *Sibirionetta formosa*。又查阅《青藏高原鸟类分类与分布》(刘迺发等,2013)、《中国鸟类分类与分布名录(第四版)》(郑光美,2023)和中国观鸟记录中心(<http://www.birdreport.cn>),确定此次发现为西藏自治区分布新记录。



图 1 在西藏林周县记录到的花脸鸭 *Sibirionetta formosa* (次平 摄)

花脸鸭冬季常集群活动,并与其他鸭科种类混群,繁殖期主要栖息在沼泽、河口三角洲、湖泊和水塘中,非繁殖期主要栖息于各种淡水、半咸水、咸水的湖泊、江河、沼泽、水库、河湾等开阔水域,通常从傍晚开始活跃觅食,觅食地多在附近水边、原野和农田(赵正阶,2001;刘阳,陈水华,2021)。发现时,该鸟游于水塘浅水区域,与绿翅鸭 *Anas crecca* 混群活动,周边活动有普通秋沙鸭 *Mergus merganser*、针尾鸭 *Anas acuta*、赤麻鸭 *Tadorna ferruginea*、斑头雁 *Anser indicus* 等;2024 年 1 月 6 日,于距离原记录点不远处的沼泽湿地再次被发现。

花脸鸭隶属于雁形目 Anseriformes 鸭科,国家二级重点保护鸟类(国家林业和草原局,农业农村部,2021),繁殖于整个东西伯利亚地区,越冬于中国、朝鲜半岛及日本南部;国内越冬于华中、华东和华南的一些地区,包括台湾和海南;迁徙时经过东北和华北地区(赵正阶,2001;刘阳,陈水华,2021)。该鸟为单型种,无亚种分化(赵正阶,2001)。在国内,近 10 年越冬种群数量持续下降(刘阳,陈水华,2021;约翰·马敬能等,2022)。依据中国观鸟记录中心数据,近年来在北京、江苏、湖北和浙江记录到花脸鸭的次数较多。花脸鸭在我国多为冬候鸟,但在某些地区可能为旅鸟或过境鸟。本次观察记录到的花脸鸭初步判断为旅鸟,但其在西藏的居留型、分布范围、生态习性和种群数量仍需进一步监测研究。

索朗卓嘎¹, 嘎玛群宗¹, 刘锋¹, 王渊¹, 唐梓钧², 次平^{1*}, 王广龙^{1*}

(1. 西藏自治区林业调查规划研究院,拉萨 850000; 2. 国家林业和草原局中南调查规划院,长沙 410000)

基金项目:西藏自治区 2024 年冬季水鸟同步监测调查项目

作者简介:索朗卓嘎,女,助理工程师,研究方向:野生动植物与自然保护区, E-mail:2493663535@qq.com

* 通信作者, E-mail:1823905097@qq.com; 867112505@qq.com