

第十一次习题课 曲线曲面积分 3

例1 设 $D_t = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq t^2, t > 0\}$, $f(x, y)$ 在 D_t 上连续, 在 D_t 内存在连续偏导

数. $f(0,0)=1$. 若 $f(x, y)$ 在 D_t 上满足方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{1}{2}f(x, y)$. \vec{n} 为有向曲

线 ∂D_t 的外单位法向量, 求极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{1 - \cos t} \oint_{\partial D_t} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} dl =$

解: $\frac{\partial f}{\partial \vec{n}} = \nabla f \cdot \vec{n}$. 利用格林公式第二种形式得到

$$\oint_{\partial D_t} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} dl = \oint_{\partial D_t} \nabla f \cdot \vec{n} dl = \oint_{\partial D_t} (f'_x \vec{i} + f'_y \vec{j}) \cdot \vec{n} dl = \iint_{D_t} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{D_t} f(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r, \theta) \cdot r dr = \pi \int_0^t f(r, \theta) \cdot r dr$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{1 - \cos t} \oint_{\partial D_t} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} dl = \pi \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\int_0^t f(r, \theta) \cdot r dr}{1 - \cos t} = \pi. \quad (\text{洛必达法则})$$

例2 设 $Q(x, y)$ 在全平面上连续可微, 已知曲线积分 $\int_L (2xy dx + Q(x, y) dy)$ 与路径无关, 并

且对于任意的 t , 有 $\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy dx + Q(x, y) dy$. 求函数 $Q(x, y)$.

解: 根据条件得到 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y} (2xy) = 2x$, 因此 $Q(x, y) = x^2 + f(y)$.

另外算出两个曲线积分

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_0^1 2x \cdot 0 dx + \int_0^t Q(1, y) dy$$

$$= \int_0^t [1 + f(y)] dy = t + \int_0^t f(y) dy,$$

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_0^t Q(0, y) dy + \int_0^1 2x \cdot 1 dx = \int_0^1 f(y) dy + t^2,$$

令两者相等得到 $t + \int_0^t f(y) dy = \int_0^1 f(y) dy + t^2$.

关于 t 求导数得到 $f(t) = 2t - 1$, 于是 $Q(x, y) = x^2 + 2y - 1$.

例3 已知积分 $\int_L (x + xy \sin x) dx + \frac{f(x)}{x} dy$ 与路径无关, $f(x)$ 为可微函数, 且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$,

(1) 求 $f(x)$; $\frac{\partial}{\partial y} (x + xy \sin x) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{f(x)}{x} \right)$ ①

(2) 对(1)中求得的 $f(x)$, 求函数 $u = u(x, y)$ 使得 $du = (x + xy \sin x) dx + \frac{f(x)}{x} dy$;

(3) 对(1)中求得的 $f(x)$, 求上述积分, 其中积分路径为从 $A(\pi, 1)$ 到 $B(2\pi, 0)$ 的任意路径.

解: (1)
$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (x + xy \sin x)$$
$$x \sin x = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}, \quad f'(x) - \frac{1}{x} f(x) = x^2 \sin x$$

这是一阶线性微分方程. 通解为 $f(x) = x(\sin x - x \cos x + C)$, 由初始条件得

$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, C = -1$, 于是 $f(x) = x(\sin x - x \cos x - 1)$.

(2) 解法一: $(x + xy \sin x)dx + \frac{f(x)}{x}dy = (x + xy \sin x)dx + (\sin x - x \cos x - 1)dy$

$\frac{\partial u}{\partial x} = x + xy \sin x, \quad u = \frac{x^2}{2} - xy \cos x + y \sin x + \varphi(y)$

$\frac{\partial u}{\partial y} = -x \cos x + \sin x + \varphi'(y) = \sin x - x \cos x - 1$

$\varphi'(y) = -1, \quad \varphi(y) = -y + C$

$u = \frac{x^2}{2} - xy \cos x + y \sin x - y + C$

其中 C 为任意常数.

$u = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x + xy \sin x)dx + (\sin x - x \cos x - 1)dy + C$

解法二: $= \int_0^x x dx + \int_0^y (\sin x - x \cos x - 1)dy + C$

$= \frac{x^2}{2} - xy \cos x + y \sin x - y + C$

(3) 解法一: 积分与路径无关, 由 A 到 B 取平行与坐标轴的两条路径,

$I = \int_1^0 (-\pi \cos \pi - 1)dy + \int_\pi^{2\pi} x dx = (1 - \pi) + \frac{3\pi^2}{2}$

解法二: $I = u(x, y)|_A^B = u(B) - u(A) = (1 - \pi) + \frac{3\pi^2}{2}$.

例4 计算积分: $\int_{(1,\pi)}^{(2,\pi)} \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x} \right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} \right) dy$

路径为沿任一条不与轴相交的曲线.

解: 由于 $\frac{\partial X}{\partial y} = -\frac{2y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^3} \sin \frac{y}{x} = \frac{\partial Y}{\partial x}$,

$\left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x} \right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} \right) dy = dx + y \cos \frac{y}{x} \left(-\frac{y}{x^2} dx + \frac{1}{x} dy \right) + \sin \frac{y}{x} dy$
$$= dx + y \cos \frac{y}{x} d\left(\frac{y}{x}\right) + \sin \frac{y}{x} dy = dx + y d\left(\sin \frac{y}{x}\right) + \sin \frac{y}{x} dy = d\left(x + y \sin \frac{y}{x}\right)$$

$\int_{(1,\pi)}^{(2,\pi)} \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x} \right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} \right) dy$

$$= \int_{(1,\pi)}^{(2,\pi)} d\left(x + y \sin \frac{y}{x}\right) = \left(x + y \sin \frac{y}{x}\right) \Big|_{(1,\pi)}^{(2,\pi)} = \pi + 1$$

例5 设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$

都有 $f(tx, ty) = t^{-2} f(x, y)$, 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都

有 $\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$ 。

解: 由 $f(tx, ty) = t^{-2} f(x, y)$ 两边对 t 求导得:

$$xf'_x(tx, ty) + yf'_y(tx, ty) = -2tf(x, y)$$

令 $t = 1$, 则 $xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = -2f(x, y)$

记 $X = yf(x, y), Y = -xf(x, y)$

$$\frac{\partial X}{\partial y} = f(x, y) + yf'_y(x, y); \quad \frac{\partial Y}{\partial x} = -f(x, y) - xf'_x(x, y)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial Y}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial y} &= -f(x, y) - xf'_x(x, y) - [f(x, y) + yf'_y(x, y)] \\ &= -2f(x, y) - [xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y)] = 0, \end{aligned}$$

由于是单连通域, 又有满足 $\frac{\partial Y}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial y} = 0$, 这样, 于是对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭

曲线 L , 都有 $\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$ 。

例6 设 Ω 为由圆锥面 $S: x^2 + y^2 = z^2$ 和平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 所围成的圆锥体。

(i) 证明设此圆锥体的体积 V 可以表示为 $V = \frac{1}{3} \iint_{\partial\Omega} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}^0) dS$, 其中 $\partial\Omega$ 为 Ω 区域的边界曲

面, \mathbf{n}^0 为其单位外法向量, $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 。

(ii) 圆锥体的体积 V 也可以表示为 $V = \frac{Ah}{3}$, 其中 A 为圆锥的底面积, h 为圆锥的高。

证明: (i) 根据 Gauss 公式得 $\iint_{\partial\Omega} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}^0) dS = \iint_{\partial\Omega^+} (x, y, z) \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} 3dx dy dz = 3V$

$$V = \frac{1}{3} (x, y, z)$$

$$^3 \operatorname{div} V = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

故 $V = \frac{1}{3} \iint_{\partial\Omega} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}^0) dS$ 。(注：这个结论不仅仅对圆锥体成立，而是一个一般性结论：任何

有界立体 Ω ，其体积均可以表为 $|\Omega| = \frac{1}{3} \iint_{\partial\Omega} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}^0) dS$ ，其中 \mathbf{n}^0 为 $\partial\Omega$ 单位外法向量。)

(ii) 由于 $\partial\Omega = S_1 \cup S_2$ ，其中 S_1 记锥面部分， S_2 记底面部分。因为锥面的顶点在原点，其

上每一点的法向量与径向垂直，故 $\iint_{S_1} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}^0) dS = 0$ 。 S_2 为平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的 (x, y, z) S_1 在 $\frac{D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ $n_1 \perp (x, y, z)$ 一部分，其单位法向量为 $\frac{\pm(A, B, C)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ 。注意到在 S_2 上，点的位置向量与正法向成锐角。
 (x, y, z)

因此

$$\begin{aligned} \iint_{S_2} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}^0) dS &= \iint_{S_2} \left| (x, y, z) \cdot \frac{(A, B, C)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right| dS \\ &= \iint_{S_2} \left| \frac{Ax + By + Cz}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right| dS = \iint_{S_2} \left| \frac{-D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right| dS \\ &= \left| \frac{-D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right| \left[\iint_{S_2} dS \right] = Ah \end{aligned}$$

其中 $A = \iint_{S_2} dS$ 为圆锥的底面积，而 $h = \left| \frac{-D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$ 为原点到平面

$Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离，也就是圆锥的高。故

$$V = \frac{1}{3} \iint_{\partial\Omega} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}^0) dS = \frac{1}{3} \left(\iint_{S_1} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}^0) dS + \iint_{S_2} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}^0) dS \right) = \frac{1}{3} \iint_{S_2} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}^0) dS = \frac{Ah}{3}。解答完毕。$$

例7 设一元函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导，且对于任何位于半空间

$$R_x^+ = \{(x, y, z), x > 0\} \text{ 中}$$

的光滑有向封闭曲面 $S \subset R_x^+$ ，有 $\oiint_S xf(x) dydz - xyf(x) dzdx - e^{2x} z dx dy = 0$ 。进一步假设

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ 。求 $f(x)$ 。

解：对于 $\forall (x_0, y_0, z_0) \in R_x^+$ 。作以 (x_0, y_0, z_0) 为球心，以 $r > 0$ 为半径的闭球 B_r 。取 $r > 0$ 充分小，可以使得 $B_r \subset R_x^+$ 。于是由假设得

$$\begin{aligned} \oiint_{\partial B_r} xf(x) dydz - xyf(x) dzdx - e^{2x} z dx dy &\equiv 0。根据 Gauss 公式有 \\ \iiint_{B_r} [(xf(x))_x + (-xyf(x))_y + (-e^{2x} z)_z] dx dy dz &= 0，即 \end{aligned}$$

div V

$$\iiint_{B_r} [xf'(x) + (1-x)f(x) - e^{2x}] dx dy dz = 0.$$

再根据三重积分的中值定理可知存在 $\xi \in [x_0 - r, x_0 + r]$, 使得

$$\xi f'(\xi) + (1-\xi)f(\xi) - e^{2\xi} = 0. \text{ 令 } r \rightarrow 0^+ \text{ 即得}$$

$$x_0 f'(x_0) + (1-x_0)f(x_0) - e^{2x_0} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x (c + e^x)}{x} = 1$$

由于 $x_0 > 0$ 是任意的, 故 $xf'(x) + (1-x)f(x) - e^{2x} = 0, \forall x > 0$.

这是一阶线性常微分方程, 根据求解公式得可知其通解为 $f(x) = \frac{e^x}{x}(c + e^x)$. 进一步由假设

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 可以确定 $c = -1$. 因此 $f(x) = \frac{e^x}{x}(e^x - 1)$. 解答完毕。

例8 利用 Stokes 公式计算积分 $I = \oint_{L^+} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中 L^+ 为圆周

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ y = x \tan \alpha \quad \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

从 Ox 轴的正向看去, 圆周的正向为逆时针方向.

解: 前面 (见第一部分题 1) 我们利用 L^+ 的参数方程直接计算出了积分. 利用 Stokes 公式计算则更简单. 记 S^+ 为由圆周 L^+ 在平面 $y = x \tan \alpha$ 上所围的部分 (闭圆盘), 其正法向与 x 轴正向成锐角. 由 Stokes 公式得

$$\begin{aligned} I &= \oint_{L^+} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz = \iint_{S^+} \text{rot}(y-z, z-x, x-y) \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_S \text{rot}(y-z, z-x, x-y) \cdot \mathbf{n}^0 dS \end{aligned}$$

其中 \mathbf{n}^0 为 S^+ 的单位正法向. 由假设知 $\mathbf{n}^0 = (\sin \alpha, -\cos \alpha, 0)$. 简单计算知 $\text{rot}(y-z, z-x, x-y) = -2(1, 1, 1)$

$$\begin{aligned} \text{于是 } I &= \iint_S \text{rot}(y-z, z-x, x-y) \cdot \mathbf{n}^0 dS = -2 \iint_S (1, 1, 1) \cdot (\sin \alpha, -\cos \alpha, 0) dS \\ &= 2(\cos \alpha - \sin \alpha) \iint_S dS = 2\pi a^2 (\cos \alpha - \sin \alpha) \end{aligned}$$

其中 $\iint_S dS = \pi a^2$ 为平面 $y = x \tan \alpha$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 部分内的面积. 解答完毕.

例9 设有向曲线 L^+ 是平面 $x + y + z = 0$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去

$$\text{为逆时针为正向. 求第二类曲线积分 } I = \oint_{L^+} \frac{(y+1)dx + (z+2)dy + (x+3)dz}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

解: 首先注意 $I = \oint_{L^+} (y+1)dx + (z+2)dy + (x+3)dz$.

记 S^+ 为平面 $x + y + z = 0$ 上包含于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 内的部分, 规定 S^+ 的正法向与 z

轴的正向成锐角。记 $\vec{F} = (y+1, z+2, x+3)$ 。则积分 I 可写作 $I = \int_{L^+} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$ 。简单计算得 $\text{rot } \vec{F} = (-1, 1, -1)$ 。根据 Stokes 公式得 $I = -\iint_{S^+} dydz + dzdx + dxdy$ 。注意到 S 的单位正法向 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 。于是 $I = -\iint_S (1, 1, 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) dS = -\sqrt{3} \iint_S dS = -\sqrt{3}\pi$ 。解答完毕。

例10 设 Σ^+ 是锥面的一个部分: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, 规定其正法线向下, 求面积分

$$I = \iint_{\Sigma^+} xdydz + 2ydzdx + 3(z-1)dxdy.$$

解: 为了用 Gauss 公式来计算上述积分。我们关于锥面 Σ^+ 补上一单位圆盘 Σ_1^+ : $x^2 + y^2 \leq 1$,

$z=1$, 正法线向上。记由锥面 Σ^+ 和圆盘 Σ_1^+ 所围成的立体为 Ω 。于是应用 Gauss 公式得

$$\left(\iint_{\Sigma^+} \right) + \left(\iint_{\Sigma_1^+} \right) = \iiint_{\Omega} \text{div} F = \iiint_{\Omega} 6dxdydz = 6|\Omega| = 2\pi.$$

而积分 $\iint_{\Sigma_1^+} xdydz + 2ydzdx + 3(z-1)dxdy = 0$ 。 $z=1, x^2+y^2 \leq 1$

因此原积分 $I = \iint_{\Sigma^+} xdydz + 2ydzdx + 3(z-1)dxdy = 2\pi$ 。解答完毕。

例11 计算高斯积分 $I = \iint_S \frac{\cos(\vec{r}, \vec{n})}{r^2} dS$, 其中 S 为一个不经过原点的光滑封闭曲面, 其中 \vec{n} 为

S 上点 (x, y, z) 处的单位外法线向量, $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 。 $\frac{\vec{r}}{r^3} dS$


解: 记 $\vec{V} = \vec{r}/r^3 = (x, y, z)/r^3$ 。则 $\iint_S \frac{\cos(\vec{r}, \vec{n})}{r^2} dS = \iint_S \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \vec{n} dS = \iint_S \vec{V} \cdot \vec{n} dS$ 。简单计算表

明, 证向量场 V 的散度恒为零, 即 $\text{div} V = 0$ 。因此当 S 不包围原点时, 向量场 V 在由 S $\vec{V} = \frac{(x, y, z)}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ 所包围的闭区域内连续可微。因此利用 Gauss 公式立知面积分 $\iint_S \vec{V} \cdot \vec{n} dS = 0$ 。

当 S 包含围原点时, 原积分等于向量场 \vec{V} 关于球面 $\Sigma^+: x^2 + y^2 + z^2 = \delta^2$ (外侧) 上的第二型面积分。于是

$$I = \iint_S \frac{\cos(\vec{r}, \vec{n})}{r^2} dS = \iint_{\Sigma^+} \vec{V} \cdot \vec{n} dS = \iint_{\Sigma^+} \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \frac{\vec{r}}{r} dS = \frac{1}{\delta^2} \iint_{\Sigma} dS = 4\pi.$$

解答完毕。



$$\int x^2 + 4y^2$$

例12 确定常数 α ，使得积分 $\int_A^B (x^4 + 4xy^\alpha)dx + (6x^{\alpha-1}y^2 - 5y^4)dy$ 与路径无关，并求原

函数 $\varphi(x, y)$ ，使得 $d\varphi = (x^4 + 4xy^\alpha)dx + (6x^{\alpha-1}y^2 - 5y^4)dy$ 。

$$\frac{\partial X}{\partial y} = \frac{\partial Y}{\partial x} \Rightarrow \alpha = 3$$

解：记 $P(x, y) = x^4 + 4xy^\alpha$ ， $Q(x, y) = 6x^{\alpha-1}y^2 - 5y^4$ 。令 $P_y = Q_x$ ，得

$$4\alpha xy^{\alpha-1} = 6(\alpha-1)x^{\alpha-2}y^2。由此解得\alpha-2=1，且4\alpha=6(\alpha-1)，\alpha-1=2，所以\alpha=3。$$

当 $\alpha=3$ 时，对微分形式 $(x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy$ 作适当组合得

$$(x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy = x^4dx - 5y^4dy + (4xy^3dx + 6x^2y^2dy)$$

$$= d\left(\frac{x^5}{5} - y^5 + 2x^2y^3\right)。由此可得所求原函数为\varphi(x, y) = \frac{x^5}{5} - y^5 + 2x^2y^3 + C。解答完毕。$$

例13 (P.229 9) 设 $D \subset R^2$ 为开集， $u(x, y)$ 为调和函数 $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, (x, y) \in D\right)$ ，证明

(1) $u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} - \ln r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dl$ ，其中 $(x_0, y_0) \in D$ ， $r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$ ， \mathbf{n} 为 D 的外法向量；

(2) $u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi R} \int_L u(x, y) dl$ ，其中 L 为以 (x_0, y_0) 为圆心， R 为半径的圆。

$$\text{证明：(1) } \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} - \ln r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dl = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial x} - \ln r \frac{\partial u}{\partial x}, u \frac{\partial \ln r}{\partial y} - \ln r \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \mathbf{n}^0 dl。$$

$$\text{而 } \frac{\partial}{\partial x} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial x} - \ln r \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial y} - \ln r \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0, (x, y) \neq (x_0, y_0), \quad \textcircled{1} \frac{\partial X}{\partial y} = \frac{\partial Y}{\partial x}$$

所以令 $L_\varepsilon: (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = \varepsilon^2$ ，

$$\int_{\partial D} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial x} - \ln r \frac{\partial u}{\partial x}, u \frac{\partial \ln r}{\partial y} - \ln r \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \mathbf{n}^0 dl = \int_{L_\varepsilon} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial x} - \ln r \frac{\partial u}{\partial x}, u \frac{\partial \ln r}{\partial y} - \ln r \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \mathbf{n}^0 dl$$

$$= \int_{L_\varepsilon} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial x}, u \frac{\partial \ln r}{\partial y} \right) \cdot \mathbf{n}^0 dl - \int_{L_\varepsilon} \left(\ln r \frac{\partial u}{\partial x}, \ln r \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \mathbf{n}^0 dl \rightarrow 0$$

$$\int_{L_\varepsilon} \left(\ln r \frac{\partial u}{\partial x}, \ln r \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \mathbf{n}^0 dl = \ln \varepsilon \int_{L_\varepsilon} \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \mathbf{n}^0 dl = \ln \varepsilon \iint_{D_\varepsilon} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy = 0$$

因为 $\frac{\partial \ln r}{\partial x} = \frac{x-x_0}{\varepsilon^2}$ ， $\frac{\partial \ln r}{\partial y} = \frac{y-y_0}{\varepsilon^2}$ ，所以

第二类

第一类

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_L u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} dl = \frac{1}{2\pi} \int_L u(x, y) dl$$

$$\int_{L_\varepsilon} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial x}, u \frac{\partial \ln r}{\partial y} \right) \cdot \mathbf{n}^0 dl = \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{L_\varepsilon} u \cdot (x - x_0, y - y_0) \cdot \mathbf{n}^0 dl$$

$\xi \rightarrow 0$ $u(x_0, y_0)$

$$= \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{L_\varepsilon} u \cdot (x - x_0, y - y_0) \cdot \frac{(x - x_0, y - y_0)}{\varepsilon} dl = \frac{1}{\varepsilon} \int_{L_\varepsilon} u(x, y) dl = \frac{1}{\varepsilon} u(\xi, \eta) \int_{L_\varepsilon} dl = 2\pi u(\xi, \eta)$$

$$\varepsilon \rightarrow 0, \quad u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial D} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} - \ln r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dl.$$

(2) 略