

第二次习题课:

方向导数,链式法则(高阶导),隐函数偏导

方向导数,链式法则

例1. 求函数 $f(x, y) = x^2 - y^2$ 在 $P(1, 1)$ 点沿与 x 轴成 $\frac{\pi}{3}$ 角方向的方向导数。

例2. 求函数 $f(x, y) = 1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)$ 在 $P\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ 点沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在该点的内法方向的方向导数。

例3. 设函数 $z = \arctan \frac{x-y}{x+y}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, dz , $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

例4. 若函数 $f(u)$ 有二阶导数, 设函数 $z = \frac{1}{x} f(xy) + yf(x+y)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

例5. 已知 $y = \left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

例6. 设 $f(x, y)$ 定义在 R^2 上, 若它对 x 连续, 对 y 的偏导数在 R^2 上有界, 证明 $f(x, y)$ 连续.

例7. 设 $g(x) = f(x, \varphi(x^2, x^2))$, 其中函数 f 与 φ 的二阶偏导数连续, 求 $\frac{d^2 g(x)}{dx^2}$

例8. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y})$, f 二阶连续可微, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

例9. 设 $z = z(x, y)$ 二阶连续可微, 并且满足方程

$$A \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

若令 $\begin{cases} u = x + \alpha y \\ v = x + \beta y \end{cases}$, 试确定 α, β 为何值时能变原方程为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$.

例10. 设 $u(x, y) \in C^2$, 又 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, $u(x, 2x) = x$, $u'_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u''_{xx}(x, 2x)$,

$$u''_{xy}(x, 2x), u''_{yy}(x, 2x).$$

隐函数的求导法

隐函数 若函数 $y = y(x)$, 由方程 $F(x, y) = 0$ 确定, 求导函数?

按隐函数定义有恒等式: $F(x, y(x)) \equiv 0 \Rightarrow \frac{d}{dx} F(x, y(x)) = 0$,

$$\Rightarrow F'_x(x, y(x)) + F'_y(x, y(x)) \cdot y'(x) = 0 \Rightarrow y'(x) = -\frac{F'_x(x, y(x))}{F'_y(x, y(x))}.$$

由此可见: 函数 $y = y(x)$ 可导有一个充分条件是, $F'_y(x, y) \neq 0$.

例11. 已知函数 $y = f(x)$ 由方程 $ax + by = f(x^2 + y^2)$, a, b 是常数, $f'(x^2 + y^2)$ 已知, 求 $\frac{dy}{dx}$.

例12. 设 $F \in C^{(1)}$, 证明: 方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 满足

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy.$$

例13. 设函数 $x = x(z)$, $y = y(z)$ 由方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ x^2 + 2y^2 - z^2 - 1 = 0 \end{cases}$ 确定, 求

$$\frac{dx}{dz}, \frac{dy}{dz}.$$

例14. 已知函数 $z = z(x, y)$ 由参数方程: $\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = uv \end{cases}$ 给定, 试求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ (用 u, v 表示).

例15. 函数 $u = u(x, y)$ 由方程 $\begin{cases} u = f(x, y, z, t) \\ g(y, z, t) = 0 \\ h(z, t) = 0 \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$