

Fontes principais

1. Cormen T. H.; Leiserson C. E.; Rivest R.; Stein C.. *Introduction to Algorithms*, 3^a edição, MIT Press, 2009
2. Análise de algoritmo - IME/USP (prof. Paulo Feofiloff)
http://www.ime.usp.br/~pf/analise_de_algoritmos

Programação dinâmica

Programação dinâmica

"Recursão com apoio de uma tabela"

Programação dinâmica \neq programação de computadores

Aplicável a problemas de otimização

Combina solução de subproblemas que **não são independentes**

Programação dinâmica

Relação problema - subproblema geralmente expressa em termos de uma fórmula recursiva.

"Não existe" prova de corretude

Estratégia bottom-up (diferente de divisão e conquista que é top down) e possui muitas sequências de decisões.

Cálculo fatorial

Cálculo fatorial

solução recursiva natural

fatorial(n)

```
1  se  $n = 0$   
2      então retorne 1  
3      senão  
4          retorne  $n * \text{fatorial}(n - 1)$ 
```

Como é uma solução com programação dinâmica?

Cálculo fatorial (PD)

fatorial(n)

```
1  se  $n = 0$ 
2      então retorne 1
3      senão
4          se ( $fat[n] \neq 0$ )  $\triangleright$  caso já calculado
5              então retorne  $fat[n]$ 
6              senão
7                  retorne  $fat[n] = n * \text{fatorial}(n - 1)$ 
```

Multiplicação de matrizes

Multiplicação de matrizes

Problema: Multiplicar n matrizes realizando o número mínimo de operações.

$$M = M_1 \times M_2 \times \dots M_n$$

Multiplicação de matrizes

Exemplo: $(A_1)_{10 \times 100}$, $(A_2)_{100 \times 5}$ e $(A_3)_{5 \times 50}$

Quantas multiplicações são realizadas nas sequencias abaixo?

$$A = (A_1 \times A_2) \times A_3$$

$$A = A_1 \times (A_2 \times A_3)$$

Multiplicação de matrizes

Exemplo: $(A_1)_{10 \times 100}$, $(A_2)_{100 \times 5}$ e $(A_3)_{5 \times 50}$

Número de multiplicações:

$$\begin{aligned} A &= (A_1 \times A_2) \times A_3 \\ &= (10 \times 100 \times 5) + (10 \times 5 \times 50) \\ &= 7500 \text{ operações} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= A_1 \times (A_2 \times A_3) \\ &= (100 \times 5 \times 50) + (10 \times 100 \times 50) \\ &= 75000 \text{ operações} \end{aligned}$$

Multiplicação de matrizes

Exemplo: $(A_1)_{10 \times 100}$, $(A_2)_{100 \times 5}$ e $(A_3)_{5 \times 50}$

Número de multiplicações:

$$\begin{aligned} A &= (A_1 \times A_2) \times A_3 \\ &= 7500 \text{ operações} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= A_1 \times (A_2 \times A_3) \\ &= 75000 \text{ operações} \end{aligned}$$

Conclusão: A ordem das multiplicações faz **muita** diferença

Multiplicação de matrizes

Como determinar a sequência ótima de multiplicação?

Multiplicação de matrizes

Como determinar a sequência ótima de multiplicação?

▷ Algoritmo força bruta é "impraticável": existem $\Omega(2^n)$ possibilidades (número de Catalão)

Aplicando programação dinâmica:

▷ É possível determinar uma sequência ótima eficiente (polinomial)

Multiplicação de matrizes

Para resolver este problema, tudo que precisamos é saber qual o melhor índice k tal que

$$A = (A_1 \times A_2 \times \cdots A_k) \cdot (A_{k+1} \times A_{k+2} \times \cdots A_n)$$

onde k varia de 1 a $n - 1$.


Multiplicação de matrizes

Denotemos por $m[i, j]$ o número mínimo de multiplicações necessárias para multiplicar $A_i \cdots A_j$, $i \leq j$. Temos que:

$$m[i, j] = \begin{cases} 0 & , \text{ se } i = j \\ \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\} & , \text{ se } i < j \end{cases}$$

onde p_0, p_1, \cdots, p_n determinam as dimensões das matrizes: cada A_i tem dimensão $p_{i-1} \times p_i$.

Multiplicação de matrizes



O algoritmo recursivo para calcular $m[i, j]$ por esta fórmula seria excessivamente lenta (exponencial)

Multiplicação de matrizes

Com a programação dinâmica é possível construir uma tabela para armazenar os valores de $m[i, j]$ de forma *bottom-up*, usando memoização.

1. $m[i, i] = 0$, para $1 \leq i \leq n$.
2. $m[i, i + 1]$ são calculados, para $1 \leq i \leq n - 1$.
3. $m[i, i + 2]$ são calculados, para $1 \leq i \leq n - 2$.
4. e assim por diante

Multiplicação de matrizes

Exemplo: $A = A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ com $p = \{200, 2, 30, 20, 5\}$

$$A = A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$$

Multiplicação de matrizes

Exemplo: $A = A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ com $p = \{200, 2, 30, 20, 5\}$

$$A = A_1 \quad \times A_2 \quad \times A_3 \quad \times A_4 \\ (200 \times 2)(2 \times 30)(30 \times 20)(20 \times 5)$$

Multiplicação de matrizes

Exemplo: $A = A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ com $p = \{200, 2, 30, 20, 5\}$

$$\begin{aligned} A &= A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \\ &\quad (200 \times 2)(2 \times 30)(30 \times 20)(20 \times 5) \\ &\quad (p_0 \times p_1)(p_1 \times p_2)(p_2 \times p_3)(p_3 \times p_4) \end{aligned}$$

Multiplicação de matrizes

Exemplo: $A = A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ com $p = \{200, 2, 30, 20, 5\}$

$$\begin{aligned} A &= A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \\ &\quad (200 \times 2)(2 \times 30)(30 \times 20)(20 \times 5) \\ &\quad (p_0 \times p_1)(p_1 \times p_2)(p_2 \times p_3)(p_3 \times p_4) \end{aligned}$$

$$m[1, 1] = m[2, 2] = m[3, 3] = m[4, 4] = 0$$

Multiplicação de matrizes

Exemplo: $A = A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ com $p = \{200, 2, 30, 20, 5\}$

$$\begin{aligned} A &= A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \\ &\quad (200 \times 2)(2 \times 30)(30 \times 20)(20 \times 5) \\ &\quad (p_0 \times p_1)(p_1 \times p_2)(p_2 \times p_3)(p_3 \times p_4) \end{aligned}$$

$$m[1, 1] = m[2, 2] = m[3, 3] = m[4, 4] = 0$$

$$m[1, 2] = 12000, \quad m[2, 3] = 1200, \quad m[3, 4] = 3000$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, \text{ para } i \cdots j - 1$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, k = i \cdots j - 1$$

$$m[1, 3] = \min\{m[1, k] + m[k + 1, 3] + p_0p_kp_3\}, k = 1, 2$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, k = i \cdots j - 1$$

$$m[1, 3] = \min\{m[1, k] + m[k + 1, 3] + p_0p_kp_3\}, k = 1, 2$$

$$m[1, 3] = \min\{m[1, 1] + m[2, 3] + p_0p_1p_3, m[1, 2] + m[3, 3] + p_0p_2p_3\}$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, k = i \cdots j - 1$$

$$m[1, 3] = \min\{m[1, k] + m[k + 1, 3] + p_0p_kp_3\}, k = 1, 2$$

$$\begin{aligned} m[1, 3] &= \min\{m[1, 1] + m[2, 3] + p_0p_1p_3, m[1, 2] + m[3, 3] + p_0p_2p_3\} \\ &= \min\{0 + 1200 + 8000, 12000 + 0 + 120000\} \end{aligned}$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, k = i \cdots j - 1$$

$$m[1, 3] = \min\{m[1, k] + m[k + 1, 3] + p_0p_kp_3\}, k = 1, 2$$

$$\begin{aligned} m[1, 3] &= \min\{m[1, 1] + m[2, 3] + p_0p_1p_3, m[1, 2] + m[3, 3] + p_0p_2p_3\} \\ &= \min\{0 + 1200 + 8000, 12000 + 0 + 120000\} \\ &= 9200 \quad (A_1 \times (A_2 \times A_3)) \end{aligned}$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, \text{ para } i \cdots j - 1$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, k = i \cdots j - 1$$

$$m[2, 4] = \min\{m[2, k] + m[k + 1, 4] + p_1p_kp_4\}, k = 2, 3$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, k = i \cdots j - 1$$

$$m[2, 4] = \min\{m[2, k] + m[k + 1, 4] + p_1p_kp_4\}, k = 2, 3$$

$$\begin{aligned} m[2, 4] &= \min\{m[2, 2] + m[3, 4] + p_1p_2p_4, m[2, 3] + m[4, 4] + p_1p_3p_4\} \\ &= \min\{0 + 3000 + 300, 1200 + 0 + 200\} \\ &= 1400 \quad ((A_2 \times A_3) \times A_4) \end{aligned}$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, \text{ para } i \cdots j - 1$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, k = i \cdots j - 1$$

$$m[1, 4] = \min\{m[1, k] + m[k + 1, 4] + p_0p_kp_4\}, k = 1, 2, 3$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, k = i \cdots j - 1$$

$$m[1, 4] = \min\{m[1, k] + m[k + 1, 4] + p_0p_kp_4\}, k = 1, 2, 3$$

$$\begin{aligned} m[1, 4] &= \min\{m[1, 1] + m[2, 4] + p_0p_1p_4, \\ &\quad m[1, 2] + m[3, 4] + p_0p_2p_4, \\ &\quad m[1, 3] + m[4, 4] + p_0p_3p_4\} \\ &= \min\{0 + 1400 + 2000, \\ &\quad 12000 + 3000 + 30000, \\ &\quad 9200 + 0 + 20000\} \\ &= 3400 \quad (A_1 \times ((A_2 \times A_3) \times A_4)) \end{aligned}$$

Multiplicação de matrizes

$$m[i, j] = \min\{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}, k = i \cdots j - 1$$

$$m[1, 4] = \min\{m[1, k] + m[k + 1, 4] + p_0p_kp_4\}, k = 1, 2, 3$$

$$\begin{aligned} m[1, 4] &= \min\{m[1, 1] + m[2, 4] + p_0p_1p_4, \\ &\quad m[1, 2] + m[3, 4] + p_0p_2p_4, \\ &\quad m[1, 3] + m[4, 4] + p_0p_3p_4\} \\ &= \min\{0 + 1400 + 2000, \\ &\quad 12000 + 3000 + 30000, \\ &\quad 9200 + 0 + 20000\} \\ &= 3400 \quad (A_1 \times ((A_2 \times A_3) \times A_4)) \end{aligned}$$

Solução ótima: $(A_1 \times ((A_2 \times A_3) \times A_4))$

Exercícios

- 1) Aplique o algoritmo para multiplicar 5 matrizes, onde $p = \{30, 35, 15, 5, 10, 20\}$
- 2) Apresente uma solução para a variante do problema de multiplicação de matrizes em que o objetivo é maximizar o número de operações.

Multiplicação de matrizes

$m[i,j]$

	1	2	3		n	
1	0	X	X	X	X	1.(n-1)
2		0	X	X	X	2.(n-2)
3			0	X	X	3.(n-3)
					X	
					X	(n-1).1
n					0	

$$\sum_{i=1}^{n-1} i \cdot (n - i) = O(n^3)$$

Multiplicação de matrizes

algoritmo: `ordem-cadeia-matriz()`

entrada: um vetor $p[0..n]$ das dimensões das matrizes, e n o número de matrizes

saída: $m[1, n]$ (solução ótima)

Multiplicação de matrizes

ordem-cadeia-matriz(p, n)

```
1  para  $i = 1$  até  $n$  faça  $m[i, i] = 0$ 
2  para  $l = 2$  até  $n$  faça
3      para  $i = 1$  até  $n - l + 1$  faça
4           $j = i + l - 1$ 
5           $m[i, j] = \infty$ 
6          para  $k = i$  até  $j - 1$  faça
7               $q = m[i, k] + m[k + 1, j] + p[i - 1]p[k]p[j]$ 
8              se  $q < m[i, j]$  então
9                   $m[i, j] = q$ 
10                  $s[i, j] = k$   $\triangleright$  usado para recuperar a
11                      $\triangleright$  parentização ótima
```

Multiplicação de matrizes

imprime-parenteses-otimo(A, s, i, j)

```
1  se  $i = j$ 
2      então imprime  $A_i$ 
3      senão
4          imprime "("
5          imprime-parenteses-otimo( $A, s, i, s[i, j]$ )
6          imprime-parenteses-otimo( $A, s, s[i, j] + 1, j$ )
7          imprime ")"
```


Multiplicação de matrizes

calcula-produto(A, s, i, j)

```
1  se  $i = j$ 
2      então retorne  $A_i$ 
3      senão
4           $X = \text{calcula-produto}(A, s, i, s[i, j])$ 
5           $Y = \text{calcula-produto}(A, s, s[i, j] + 1, j)$ 
6      retorne multiplica( $X, Y$ )
```

Obrigado