

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

- Faculdade de Computação e Informática -

Curso: Ciência da Computação Disciplina:Teoria dos Grafos - Turma 6N Atividade Prova 2 --- jnovembro de 2020




Nome: Samuel Kenji		T.I.A.: 31817106
Nota:	Visto:	


OBSERVAÇÃO: Em nenhuma questão desta prova será aceita resposta manuscrita. Use um editor de textos para acrescentar suas respostas nos espaços reservados para cada questão. No caso de figuras, elabore-as com o uso de algum software para desenho e inclua cada uma das figuras no espaço correspondente à resposta da questão. Será descontada nota para cada resposta e/ou figura que violar esta restrição.

Questão 01. Considere o grafo H apresentado ao lado.

- a) (1,0 ponto) Apresente a árvore e busca construída pelo algoritmo de busca em profundidade a partir do vértice v_5 .
- b) (1,0 ponto) Apresente a árvore e busca construída pelo algoritmo de busca em largura a partir do vértice v_5 .

Obs.: nas simulações dos algoritmos, considere que, quando houver mais de uma opção de vértices a escolher, sempre será escolhido primeiro o vértice de menor índice.







Questão 02. Considere o grafo H apresentado ao lado.

a) (1,0 ponto) Qual é o valor de $\chi(G)$? Justifique. Resp:


Segundo o Teorema $\chi(G) \le \Delta(G) + 1$, sendo $\Delta(G) = 3$



$$\chi(G) = 2$$




Segundo o Teorema $\Delta(G) \le \chi'(G) \le \Delta(G) + 1$, sendo $\Delta(G) = 3$




Portanto, $\chi'(G)=3$.


Questão 03. (2,0 pontos) Sejam G um grafo e $x, y \in VG$. Descreva como o algoritmo de busca em profundidade pode ser utilizado para resolver o problema de se encontrar o caminho mais curto de x até y.



Questão 04. Considerando a rede R desenhada abaixo:



a) (1,5 ponto) Apresente, exclusivamente no espaço abaixo, um fluxo em R que seja máximo. Qual é o valor do fluxo obtido?



b) (1,5 ponto) Apresente, exclusivamente no espaço abaixo, um corte em R que seja mínimo. Qual é a capacidade do corte obtido?

Capacidade mínima de corte

encontrada = 4

Resp: $K_1 = \{xv1, xv3\} = 3+1 = 4$

 $K_2 = \{xv3, v1v3, v1v2\} = 1+2+2 = 5$

 $K_3 = \{xv1, xv3, v2y\} = 3+1+2=6$

 $K_4 = \{xv1, v3v4\} = 3+3 = 6$

 $K_5 = \{xv1, xv3, v4v2, v4v\} = 3+1+2+3 = 9$

 $K_6 = \{xv3, v1v3, v2y\} = 1+2+2=5$

 $K_7 = \{v1v2, v3v4\} = 2+3 = 5$

 $K_8 = \{xv3, v1v2, v1v3, v4v2, v4y\} = 1+2+2+2+3 = 10$

 $K_9 = \{xv1, v2y, v3v4\} = 3+2+3 = 8$

 $K_{10} = \{xv1, xv3, v2y, v4y\} = 3+1+2+3 = 9$

 $K_{11} = \{xv1, v4v2, v4y\} = 3+2+3 = 8$

 $K_{12} = \{v2y, v3v4\} = 2+3 = 5$

 $K_{13} = \{xv3, v2y, v4y\} = 2+2+3 = 7$

 $K_{14} = \{v1v2, v4v2, v4y\} = 2+2+3 = 7$

 $K_{15} = \{xv1, v2y, v4y\} = 3+2+3 = 8$

 $K_{16} = \{v2y, v4y\} = 2+3 = 5$

c) (1,0 ponto) Justifique, detalhadamente e exclusivamente no espaço abaixo, a maximalidade do fluxo obtido em b) e a minimalidade do corte obtido em c)

Resp:

Segundo um dos teoremas, o valor de um fluxo máximo é igual à capacidade de um corte mínimo. Dessa forma, o valor do fluxo sendo 4 e a capacidade mínima de corte encontrada tendo o mesmo valor, prova que o fluxo é realmente máximo.