認識異位性皮膚炎

蔡宗儒醫師 編撰

1. 什麼是異位性皮膚炎（異膚）？是怎麼造成的？

異位性皮膚炎是一種慢性且會反覆發作的過敏性皮膚疾病，常與遺傳有關，是嬰幼兒最常見的皮膚疾病之一，約占小兒人口的 3～5%，其中 60% 的患者會在一歲內發病，隨著年紀漸增大多也隨之改善。除了皮膚會出現乾燥搔癢之外，有時會合併不同症狀，如紅疹、脫皮、滲出組織液、結痂或苔癬化等。異膚的成因與基因遺傳、免疫反應、以及環境誘發三大因素相互作用而導致皮膚屏障功能受損。

2. 異位性皮膚炎要如何診斷？

異膚診斷以臨床表現為主。診斷標準依 Hanifin-Rajka 準則，符合三項或以上即可診斷。

- 皮膚搔癢
- 典型的皮膚症狀（濕疹樣皮膚炎或苔癬化皮膚炎）及位置
- 慢性持續性或反覆發作皮膚炎超過 6 個月以上
- 個人或家族成員有異位性體質，如過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎或蕁麻疹等

3. 異位性皮膚炎要如何保護？

異位性皮膚炎的預防及保護中，「清潔」及「保濕」是最重要的。

- 清潔：一天一次，不可只用清水洗（應選用「非皂類」清潔產品）。
- 保濕：一天至少兩次，其中一次建議在洗完澡稍微擦拭後，還殘留部分濕氣時進行。（應選用「乳霜」潤膚劑，可有效增加皮膚角質層的含水力，幫助修復皮膚屏障功能。規律使用潤膚劑能夠減低藥膏的使用量及症狀嚴重程度。）

4. 異位性皮膚炎注意事項

- 出門帶濕、乾毛巾，用濕毛巾擦汗水（汗水會刺激皮膚導致抓癢）（不可用濕紙巾）。
- 室溫維持 22～24℃、濕度維持 50～60%。
- 洗澡時間少於 15 分鐘，水溫低於 40℃。

5. 異位性皮膚炎要如何治療？類固醇藥膏選擇？

- 口服：抗組織胺、抗生素、類固醇
- 外用：類固醇類藥膏（TCSs）、局部免疫調節藥膏（TCIs）（醫立妥：3 個月以上嬰兒）

【擦藥膏方式：藥膏應該油油亮亮的覆蓋上去（薄薄來回搓抹是錯誤擦法）】

常用類固醇藥膏依等級分成 7 級，應依醫師評估皮膚狀況，決定適合的藥膏種類及使用期間，錯誤的使用方式不但達不到治療效果，更會增加不必要副作用產生。

部位	期間	擦法
臉	__/__ ~ __/__	每天早晚擦（_ _ _ _ _ _）
	__/__ ~ __/__	週二、四、六擦（_ _ _ _ _ _）＋週一、三、五擦醫立妥
	__/__ ~ __/__	週六、日擦（_ _ _ _ _ _）＋週一、三、五擦醫立妥
身體（含耳朵、頭皮、脖子）	__/__ ~ __/__	每天早晚擦（_ _ _ _ _ _）
	__/__ ~ __/__	週二、四、六擦（_ _ _ _ _ _）＋週一、三、五擦醫立妥
	__/__ ~ __/__	週六、日擦（_ _ _ _ _ _）＋週一、三、五擦醫立妥

～～～早期預防，早期治療～別讓過敏誤了您的孩子～蔡宗儒醫師 關心您的健康～～～

立欣診所｜台南市北區育德路467號｜電話 06-2516086｜LINE @lhpedclinic