

HYGIENERICHTLINIE

Kontakt-Isolation

10.05.2021




Abbildung 1: Türschild Kontakt-Isolation

Erstellt von	S. Riess
Erstelldatum	14.08.2020
Gültigkeitsbereich	KSGR
Titel	Kontakt-Isolation
Version	1.0
Ablageort	Hygienerichtlinien
Freigabe durch	Hygienekommission
Freigabe am	18.09.2020
Gültig ab	10.05.2021

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis	2
1. Schutzmassnahmen	3
1.1 Standardhygienemassnahmen	
1.2 Personal / Besucher:innen	
1.3 Patient:in	
2. Patientenzimmerreinigung und Schlussdesinfektion	3
3. Bettendesinfektion (Bettenzentrale)	3
4. Mitgeltende Dokumente	4

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Türschild Kontakt-Isolation.....	1
---	---

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schutzmassnahmen für Personal und Besucher:innen.....	3
Tabelle 2: Schutzmassnahmen für Patient:in ausserhalb des Zimmers.....	3

1. Schutzmassnahmen

1.1 Standardhygienemassnahmen

Grundsätzlich gilt eine korrekte Anwendung der [Standardhygienemassnahmen](#).

Die Händedesinfektion bleibt der beste Schutz vor Übertragungen. Arbeitsabläufe sollen gut geplant durchgeführt werden, um eine Keimverschleppung auf Flächen und Medizinprodukte zu verhindern.

1.2 Personal / Besucher:innen

Die Instruktion der Massnahmen für die Besucher:innen erfolgt durch die Pflege.

Tabelle 1: Schutzmassnahmen für Personal und Besucher:innen



Schutzkittel

Personal: Bei direktem Patientenkontakt Schutzkittel

Besucher:innen: Nur bei Mithilfe in der Pflege notwendig

KiJuMed: Eltern tragen keinen Schutzkittel



Händedesinfektion vor Verlassen des Zimmers durchführen.

1.3 Patient:in

Gilt für Transport zu Untersuchungen/Interventionen. Spaziergänge/Gehtrainings sind nur in Rücksprache mit der Spitalhygiene erlaubt! Die Instruktion der Massnahmen für Patient:in erfolgt durch die Pflege.

Tabelle 2: Schutzmassnahmen für Patient:in ausserhalb des Zimmers



Trägt frische Kleidung, Patientenhemd, oder Bademantel.

Händedesinfektion vor Verlassen des Zimmers durchführen..

2. Patientenzimmerreinigung und Schlussdesinfektion

Bei Clostridioides difficile (vormals Clostridium difficile) (inkl. Ribotyp 027) sowie Candida auris wird wie folgt desinfizierend gereinigt:

- Tägliche Desinfektion mit Terralin® PAA 2%,
Flächendesinfektion nach dem Toilettengang und Desinfektion stuhlkontaminierter Oberflächen mit Mikrocid PAA Wipes.
- Schlussdesinfektion und bei Isolationsaufhebung mit Terralin® PAA 2%

Damit die Mitarbeitenden der Reinigungsfirma das korrekte Desinfektionsmittel bei der täglichen Desinfektion, sowie Schlussdesinfektion, Austritt oder Isolationsaufhebung einsetzen können, muss die Pflege den Room Service über die obengenannten Erreger informieren.

Auf den Stationen ohne Room Service erfolgt dies direkt auf die Tel. Nr. 6789.

3. Bettendesinfektion (Bettzentrale)

Das Bett für den Transport in die Bettzentrale vorbereiten → siehe [Isolationsmassnahmen im Detail](#).

Die Dose mit den Mikrocid PAA-Wipes aufs Bett legen und mit in die Bettenzentrale geben. Nach der Reinigung bringt der/die Mitarbeiter:in der Bettenzentrale die angefangene Dose auf die Abteilung zurück.

4. Mitgeltende Dokumente

- [Isolationsmassnahmen im Detail](#)
- [Erreger und Infektionen](#)
- [Clostridioides difficile](#) (vormals Clostridium difficile)
- [Clostridioides difficile Ribotyp 027](#) (vormals Clostridium difficile Ribotyp 027)
- [Candida auris](#)