

Massnahmen bei isolierten Patienten im OPS / Übersichtstabelle

Grundsatz: Es gelten die Standardhygienemassnahmen https://net.ksgr.ch/departement/D7PflegeundFachsupport/Hygienerichtlinien Und werden je nach Übertragungsweg mit den Isolationsmassnahmen ergänzt.

Erkrankung / Erreger	Besiedelung / Infektiöses Material / Risikofaktoren	Übertragungsweg / Isolationsmassnahmen	 Massnahmen gelten: während Lagerung, Ein-Ausleitung, Operation (direkter Patientenkontakt) für alle beteiligten Berufsgruppen
CJD (Creutzfeld Jakob Disease)	Blut, Liquor, Hirngewebe	Kontakt-Isolation The Management of the Managem	siehe HR "CJD"
COVID-19 (SARS-CoV-2)	Respiratorisches Sekret	Tröpfchen- und strikte Kontakt-Isolation PLUS Tröpfchen- und strikte Ko	 FFP2 Atemschutzmaske Schutzkittel Unsterile Handschuhe Schutzbrille

Erstellt von: Spitalhygiene	28.10.2011	Titel: Massnahmen bei isolierten Patienten im OPS / Übersichtstabelle	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 24.09.2021	Gültig ab: 24.09.2021	ЦВ
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 8.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: S. Petric, S. Riess	Revision am: 20.08.2021	Seite(n): 1/4	



Erkrankung / Erreger	Besiedelung / Infektiöses Material / Risikofaktoren	Übertragungsweg / Isolationsmassnahmen	 Massnahmen gelten: während Lagerung, Ein- Ausleitung, Operation (direkter Patientenkontakt) für alle beteiligten Berufsgruppen
MRE * (Multiresistente Erreger) Zum Beispiel: • MRSA • VRE	Rachen / Nase, Haut, Wundesekret Stuhl, Urin (Urin- Stuhl- inkontinenz, Durchfall, OP am Urogenital- Darmtrakt)	Kontakt-isolation **The Control of the Control of	 Schutzkittel Unsterile Handschuhe gemäss Standard Mund-Nasenschutz
CPE Candida auris	Respiratorisches Sekret (Bei respiratorischer Besiedelung und Husten oder Tracheostoma)	Zusätzlich Tröpfchen bei respiratorischer Besiedelung Tröpfchen- und Kontakt-Isolation Tröpfchen bei respiratorischen Besiedelung	 Mund-Nasenschutz Schutzkittel Unsterile Handschuhe

^{*}Siehe HR: Multiresistente und panresistente gramnegative Erreger

Erstellt von: Spitalhygiene	28.10.2011	Titel: Massnahmen bei isolierten Patienten im OPS / Übersichtstabelle	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 24.09.2021	Gültig ab: 24.09.2021	ЦВ
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 8.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: S. Petric, S. Riess	Revision am: 20.08.2021	Seite(n): 2/4	



Erkrankung / Erreger	Besiedelung / Infektiöses Material / Risikofaktoren	Übertragungsweg / Isolationsmassnahmen	Massnahmen gelten: während Lagerung, Ein- Ausleitung, Operation (direkter Patientenkontakt) für alle beteiligten Berufsgruppen
MRE * (Multiresistente Erreger) Zum Beispiel:	Stuhl, Urin (Urin-Stuhlinkontinenz, Durchfall und <u>keine</u> OP am Urogenital- Darmtrakt)	Standardhygiene	
gramnegative Erreger z.B. ESBL	Stuhl, Urin (Urin-Stuhlinkontinenz, Durchfall und OP am Urogenital- Darmtrakt)	Kontakt-Isolation **The Market State of the Contact State of the Contac	 Schutzkittel Unsterile Handschuhe gemäss Standard Mund-Nasenschutz
	Respiratorisches Sekret (Bei respiratorischer Besiedelung und Husten oder Tracheostoma, während Intubation)	Zusätzlich Tröpfchen bei respiratorischer Besiedelung Tröpfchen- und Kontakt-Isolation	 Mund-Nasenschutz Schutzkittel Unsterile Handschuhe

^{*}Siehe HR: Multiresistente und panresistente gramnegative Erreger

Erstellt von: Spitalhygiene	28.10.2011	Titel: Massnahmen bei isolierten Patienten im OPS / Übersichtstabelle	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 24.09.2021	Gültig ab: 24.09.2021	ЦВ
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 8.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: S. Petric, S. Riess	Revision am: 20.08.2021	Seite(n): 3/4	



Erkrankung / Erreger	Besiedelung / Infektiöses Material / Risikofaktoren	Übertragungsweg / Isolationsmassnahmen	Massnahmen gelten: während Lagerung, Ein-Ausleitung, Operation (direkter Patientenkontakt) für alle beteiligten Berufsgruppen
Norovirus	Stuhl, Erbrochenes	Tröpfchen- und strikte Kontakt-Isolation Tröpfchen- und strikte Kontakt-Isolation Tröpfchen- und strikte Kontakt-Isolation	Mund-NasenschutzSchutzkittelUnsterile Handschuhe
Norovirus - Dauerausscheider	Stuhl, Erbrochenes Wenn keine akuten Symptome (Durchfall, Erbrechen) vorliegen	Standardhygiene	
Tbc Offene Lungentuberkulose	Respiratorisches Sekret	Aerogene Isolation Military Aerogene Isolation Aerogene Isolation All Aerogene Isolation Aero	 FFP2 Atemschutzmaske Gemäss Standard Schutzkittel Unsterile Handschuhe Bei Multiresistenz tragen die Mitarbeitenden FFP3 Atemschutzmaske mit Ausatemventil und darüber Mund-Nasenschutz**
Tbc Extrapulmonale Organtuberkulose	Wundsekret, Eiter	Kontakt-Isolation **Contakt-Isolation **Contakt-I	 Schutzkittel Unsterile Handschuhe gemäss Standard Mund-Nasenschutz

^{**} Aufgrund des Ausatmeventils ist zusätzlich ein chirurgischer Mund-Nasenschutz zu tragen gemäss HR: Hygienevorschriften in der Operationsabteilung Punkt "Tragen des Mund-Nasenschutzes".

Erstellt von: Spitalhygiene	28.10.2011	Titel: Massnahmen bei isolierten Patienten im OPS / Übersichtstabelle	Freigabe durch: Hygienekommission	Freigabe am: 24.09.2021	Gültig ab: 24.09.2021	ЦВ
Gültigkeitsbereich: KSGR	Version: 8.0	Ablageort: Hygienerichtlinien	Revision durch: S. Petric, S. Riess	Revision am: 20.08.2021	Seite(n): 4/4	