

HYGIENERICHTLINIE

Strikte Kontakt-Isolation



Abbildung 1: Türschild Strikte Kontakt-Isolation

Erstellt von	S. Riess
Erstelldatum	02.11.2023
Gültigkeitsbereich	KSGR
Titel	Strikte Kontakt-Isolation
Version	1.0
Ablageort	Hygienerichtlinien
Revision durch	S. Riess
Revision am	
Freigabe durch	Hygienekommission
Freigabe am	02.11.2023
Gültig ab	02.11.2023

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis	2
1. Schutzmassnahmen	3
1.1 Standardhygienemassnahmen	
1.2 Personal / Besucher:innen	
1.3 Patient:in	
2. Patientenzimmerreinigung und Schlussdesinfektion	3
3. Mitgeltende Dokumente	3

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Türschild Strikte Kontakt-Isolation.....	1
---	---

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schutzmassnahmen für Personal und Besucher:innen.....	3
Tabelle 2: Schutzmassnahmen für Patient:in ausserhalb des Zimmers.....	3

1. Schutzmassnahmen

1.1 Standardhygienemassnahmen

Grundsätzlich gilt eine korrekte Anwendung der [Standardhygienemassnahmen](#).

Die Händedesinfektion bleibt der beste Schutz vor Übertragungen. Arbeitsabläufe sollen gut geplant durchgeführt werden, um eine Keimverschleppung auf Flächen und Medizinprodukte zu verhindern.

1.2 Personal / Besucher:innen

Die Instruktion der Massnahmen für die Besucher:innen erfolgt durch die Pflege.

Wenn möglich während der akuten Phase (Norovirus-Infektion ist hoch kontagiös) keinen Besuch.

Tabelle 1: Schutzmassnahmen für Personal und Besucher:innen



Einweg-Schutzkittel bei Betreten des Zimmers anziehen



Unsterile Handschuhe bei Betreten des Zimmers anziehen



Vor Verlassen des Zimmers eine Händedesinfektion durchführen.

1.3 Patient:in

Gilt für Transport zu Untersuchungen/Interventionen. Spaziergänge/Gehtrainings sind nicht erlaubt! Die Instruktion der Massnahmen für Patient:in erfolgt durch die Pflege.

Tabelle 2: Schutzmassnahmen für Patient:in ausserhalb des Zimmers



Trägt frisches Patientenhemd, oder Bademantel.



Händedesinfektion vor Verlassen des Zimmers durchführen.

2. Patientenzimmerreinigung und Schlussdesinfektion

Tägliche desinfizierend und Schlussdesinfektion (zu verwenden: Terralin® protect 0,5% oder Terralin PAA 1%)

3. Mitgeltende Dokumente

- [Isolationsmassnahmen im Detail](#)
- [Erreger und Infektionen](#)
- [Norovirus - Infektion](#)