

Mappa 11: P97 delle celle — almeno 147 asteroidi/cella
246,171 traiettorie distinte · 588,872 istanze a ETD diverse · 3732 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 288/9376 occupate
(3.07%) · 2.88% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione







Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 11: P99 delle celle — almeno 165 asteroidi/cella
114,960 traiettorie distinte · 197,382 istanze a ETD diverse · 3131 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 98/9376 occupate
(1.05%) · 0.98% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 11: P99.5 delle celle — almeno 175 asteroidi/cella
68,810 traiettorie distinte · 101,937 istanze a ETD diverse · 2422 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico, assi ECLIPJ2000

Geocentrico — ω del catalogo

Asteroidi per cella — mappa 11

Celle sopra soglia: 48/9376 occupate
(0.51%) · 0.48% della griglia totale

Colore: celle selezionate · grigio: altre celle occupate

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella

Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 11: P99.75 delle celle — almeno 183 asteroidi/cella
44,375 traiettorie distinte · 60,497 istanze a ETD diverse · 1604 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico, assi ECLIPJ2000

Geocentrico — ω del catalogo

Asteroidi per cella — mappa 11

Celle sopra soglia: 26/9376 occupate
(0.28%) · 0.26% della griglia totale

Colore: celle selezionate · grigio: altre celle occupate

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella

Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.