

Mappa 12: P97 delle celle — almeno 67 asteroidi/cella
162,717 traiettorie distinte · 266,489 istanze a ETD diverse · 2816 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 299/9881 occupate
(3.03%) · 2.99% della griglia totale




Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione






Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.


Mappa 12: P99 delle celle — almeno 76 asteroidi/cella
73,583 traiettorie distinte · 108,702 istanze a ETD diverse · 1614 asteroidi · 201 punti per curva






Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.


Mappa 12: P99.5 delle celle — almeno 81 asteroidi/cella
41,755 traiettorie distinte · 60,455 istanze a ETD diverse · 1078 asteroidi · 201 punti per curva






Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 12: P99.75 delle celle — almeno 87 asteroidi/cella
19,758 traiettorie distinte · 29,844 istanze a ETD diverse · 610 asteroidi · 201 punti per curva





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.