Mappa 11: P97 delle celle — almeno 147 asteroidi/cella
246,171 traiettorie distinte · 588,872 istanze a ETD diverse · 3732 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle sopra soglia: 288/9376 occupate
(3.07%) · 2.88% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 11: P99 delle celle — almeno 165 asteroidi/cella
114,960 traiettorie distinte · 197,382 istanze a ETD diverse · 3131 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle sopra soglia: 98/9376 occupate
(1.05%) · 0.98% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 11: P99.5 delle celle — almeno 175 asteroidi/cella
68,810 traiettorie distinte · 101,937 istanze a ETD diverse · 2422 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle sopra soglia: 48/9376 occupate
(0.51%) · 0.48% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 11: P99.75 delle celle — almeno 183 asteroidi/cella
44,375 traiettorie distinte · 60,497 istanze a ETD diverse · 1604 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico, assi ECLIPJ2000

Geocentrico — ω del catalogo

Asteroidi per cella — mappa 11

Celle sopra soglia: 26/9376 occupate
(0.28%) · 0.26% della griglia totale

Colore: celle selezionate · grigio: altre celle occupate

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella

Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 11: P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 asteroidi per cluster

2,413 traiettorie distinte · 173,762 istanze a ETD diverse · 3413 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico, assi ECLIPJ2000

Geocentrico — ω del catalogo

Terra

Luna

Luna a ETD

y [km]

x [km]

1e5

Asteroidi il cui minimo DV sceglie il cluster della traiettoria

Celle con traiettorie selezionate: 3176/9376 occupate
(33.87%) · 31.76% della griglia totale

Colore: copertura dei membri selezionati nelle rispettive epoche

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

ϕ_p ECLIPJ2000 [deg]

ε al perigeo [km^2/s^2]

Asteroidi distinti nella cella

Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 11: P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 145,737 istanze a ETD diverse · 3241 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle con traiettorie selezionate: 2497/9376 occupate
(26.63%) · 24.97% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell’orbita osculatrice, che può essere distinto dall’evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all’uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all’ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 11: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle con traiettorie selezionate: 2025/9376 occupate
(21.60%) · 20.25% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 12: P97 delle celle — almeno 67 asteroidi/cella
162,717 traiettorie distinte · 266,489 istanze a ETD diverse · 2816 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle sopra soglia: 299/9881 occupate
(3.03%) · 2.99% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 12: P99 delle celle — almeno 76 asteroidi/cella
73,583 traiettorie distinte · 108,702 istanze a ETD diverse · 1614 asteroidi · 201 punti per curva





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 12: P99.5 delle celle — almeno 81 asteroidi/cella
41,755 traiettorie distinte · 60,455 istanze a ETD diverse · 1078 asteroidi · 201 punti per curva



Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 12: P99.75 delle celle — almeno 87 asteroidi/cella
19,758 traiettorie distinte · 29,844 istanze a ETD diverse · 610 asteroidi · 201 punti per curva





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 12: P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 173,762 istanze a ETD diverse · 3413 asteroidi · 201 punti per curva





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 12: P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 145,737 istanze a ETD diverse · 3241 asteroidi · 201 punti per curva















Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell’orbita osculatrice, che può essere distinto dall’evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all’uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all’ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 12: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle con traiettorie selezionate: 4024/9881 occupate
(40.72%) · 40.24% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.