Mappa 06: P97 delle celle — almeno 168 asteroidi/cella

203,987 traiettorie distinte · 838,066 istanze a ETD diverse · 4302 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle sopra soglia: 179/5914 occupate
(3.03%) · 1.79% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 06: P99 delle celle — almeno 671 asteroidi/cella

60,337 traiettorie distinte · 302,336 istanze a ETD diverse · 3332 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 06: P99.5 delle celle — almeno 1083 asteroidi/cella

36,547 traiettorie distinte · 177,420 istanze a ETD diverse · 3175 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 06: P99.75 delle celle — almeno 1384 asteroidi/cella

22,459 traiettorie distinte · 108,901 istanze a ETD diverse · 3125 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 06: P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 asteroidi per cluster

2,413 traiettorie distinte · 173,762 istanze a ETD diverse · 3413 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 06: P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 145,737 istanze a ETD diverse · 3241 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle con traiettorie selezionate: 223/5914 occupate
(3.77%) · 2.23% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 06: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle con traiettorie selezionate: 121/5914 occupate
(2.05%) · 1.21% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.